

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR VER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ons générales :

cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux,
traction multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi
que pour tous les actes effectués en série.

en cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.
Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.
Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.
Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

N° P19- 063131

ND: 324 S6

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10523 Société : R.A.M.

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : ELHAFID AbdELKARIM

Date de naissance : 1/1/64

Adresse : H 182 LOT ELHAFID DAROU BISKRA

Tél. : 0677622394 Total des frais engagés : 120 + 272,10 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr IKIOUCH AZIZ
Médecin Généraliste
Lotissement EL WAHDA 1
N°69 B. Derc
522615753

Cachet du médecin :

Date de consultation : 18 MAI 2020

Nom et prénom du malade : HAFID BRAHIM

Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Th du cycle

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : / /

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18 MAI 2020	• •	8	1200	 DOUCH AZIZA Médecin Généraliste Lotissement EL WAHDA 1 N° 69 D Dercy

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<p>PHARMACIE HAY ESSALAM Lot Hay Essalam 26 Derouba - Béchar SABOUR Micham Tél : 05 20 05 30 14 Ref : 26917h</p>	<p>18/05/20</p>	<p>272.40</p>

ANALYSES - RADIOPHARMACIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

- 8 -

VISA ET CACHET DE MONTANTS
DES RECETTES
PPAS gr
Adhésion et Cr
Prise en charge
DéclamatioN
Mails uti

Docteur Aziza IKIOUCH
Médecine Générale

Diplômé en médecine générale de la Faculté
de Médecine et de Pharmacie de Rabat
Ancien médecin interne au CHU IBN SINA
Ancien médecin interne au CHPERRAZI de
Berrechid

Tél: 05.22.51.57.51

الدكتورة إكيوش عزيزة

الطب العام

حاصلة على دكتوراه الطب العام من كلية الطب و الصيدلة
بالرباط

طبيبة داخلية سابقة بالمستشفى الجامعي ابن سينا
طبيبة داخلية سابقة بمستشفى الرازي ببريشيد

الهاتف: 05.22.51.57.51

ORDONNANCE

Deroua Le :

18 MAI 2020

الدروة في:

HAFDI

BRAHIM



9080 f3

Aphtosis 10

1cp x2/j d 16 e

au qt/j dr cycle

III

3més



Lotissement Elouahda 1, N°69D – Premier Etage – DEROUA

تجزئة الوحدة 1 الرقم 69 د، الطابق الاول - الدروة (قرب المركز الصحي الدروة)

• 05.22.51.57.51 ✉ aziza.ikiouch@gmail.com

Si vous avez une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire due à l'utilisation de THS, vous devez immédiatement arrêter de prendre le THS. Consultez immédiatement votre médecin à propos de tous les symptômes qui peuvent indiquer une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire, tels qu'un gonflement douloureux dans une de vos jambes, une douleur soudaine dans la poitrine ou des difficultés à respirer.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine. Votre médecin sera particulièrement attentif aux bénéfices et aux risques du THS.

Intervention chirurgicale Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre chirurgien que vous prenez un THS bien avant l'opération. Il sera peut-être nécessaire d'arrêter le traitement THS quelques semaines avant l'opération. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre votre THS.

THS et troubles coronariens Deux grandes études portant sur un type spécifique de THS (œstrogènes conjugués combinés avec de l'acétate de mèdroxyprogesterone) ont montré que le risque de maladies cardiovasculaires pouvait être plus élevé au cours de la première année de THS. Il n'est pas encore clair si cela s'applique également à d'autres types de THS. Si vous avez une douleur dans la poitrine qui s'étend à votre bras ou à votre cou : - consultez votre médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cette douleur peut être le signe d'une crise cardiaque.

THS et crise cardiaque Le risque d'accident vasculaire cérébral est d'environ 1,5 fois plus élevé chez les femmes prenant un THS que chez les femmes qui n'en prennent pas. Le nombre de cas supplémentaires d'accident vasculaire cérébral à la suite d'un traitement par THS augmente avec l'âge.

Comparaison

Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui n'utilisent pas de THS, en moyenne 8 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral. Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui utilisent le THS, 11 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral (c'est-à-dire 3 cas supplémentaires pour 1000 femmes).

Si vous avez des maux de tête sévères inexplicables ou une migraine (qui peut s'accompagner de troubles de la vision) : - consultez un médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cela peut être un signe d'alerte précoce d'un accident vasculaire cérébral.

Enfants et adolescents

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé n'est pas destiné aux enfants qui n'ont pas encore eu leurs premières règles.

Autres médicaments et Duphaston 10 mg comprimé pelliculé

Si vous prenez ou avez pris récemment ou pourraut prendre un autre médicament. Cela comprend les médicaments obtenus sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Vous devez informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants. Ces médicaments peuvent réduire l'effet de Duphaston et conduire à un saignement irrégulier. - préparations à base de plantes contenant du millepertuis (Hypericumperforatum), - médicaments anticonvulsivants (tels que phénobarbital, phénitoïne, carbamazépine, primidon), - médicaments anti-infectifs (tels que la rifampicine), - médicaments pour traiter les infections par VIH (SIDA) (tels que ritonavir, névirapine, éfavirenz), - médicaments contre le virus de l'hépatite C.

Si l'un des points ci-dessus s'applique à vous(ou en cas de doute), il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre Duphaston 10 mg comprimé pelliculé.

DUPHASTON 10 mg comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons
Duphaston 10 mg comprimé pelliculé peut être pris avec ou sans nourriture.

pelliculé utilisé en association avec un estrogène incluent un épaisseissement abnormal ou un cancer de l'utérus et un cancer de l'ovaire.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez ou votre pharmacien seraient pas ment effets indésirables En signalant le d'informations sur

حصة رقم /
Date .Fab صنع في/
Date .Exp صالح إلى /

559828
06 2019
05 2024



5. Comment

Tenir hors de la

Ne pas utiliser à boîte et la plaque (mois et année). La mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Que contient ce médicament

- La substance active dans ce médicament est : la dydrogéstérone. Chaque comprimé contient 10 mg de dydrogéstérone.
- Noyau du comprimé, les autres composants sont : lactose monohydraté, hypromellose, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.
- Pelliculage du comprimé, les autres composants sont : hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane (E171).

Qu'est-ce que Duphaston 10 et contenu de l'emballage extérieur

- Comprimé pelliculé scellé blanc, rond et biconvexe, avec une ligne de sécabilité et un diamètre de 6 mm.
- Portant l'inscription "155" sur les deux côtés de la ligne de sécabilité. La ligne de sécabilité du comprimé n'est là que pour faciliter la prise du comprimé en facilitant la division. (voir aussi la section 3 de cette notice)
- Les comprimés sont conditionnés dans des sachets en aluminium / PVC.
 - Duphaston 10 mg est contenu dans une boîte contenant chacune 10 comprimés.
 - Duphaston est sous forme de comprimé pelliculé.

Titulaire de l'Autorisation d'importation et de vente Maphar Km 10, route côtière 111, Quartier industriel, Zenata, Ain Sebaâ Casablanca - Maroc
Fabricant DUPHASTON 10MG CP PEL B20 PPV - 90HB0104
Rachid LAMRINI - Pharmacien Responsable

Titulaire de l'Autorisation d'importation et de vente Laboratoires Maphar

Km 10, route côtière 111

Quartier industriel

Zenata-Ain Sebaâ

Maroc

Rachid LAMRINI - Pharmacien Responsable

Fabricant

Abbott Biologicals B.V.
Veerweg 12, 8121 AA Olst
Pays-Bas

Dernière révision : selon le RCP Pays bas 08/2017



Si vous avez une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire due à l'utilisation de THS, vous devez immédiatement arrêter de prendre le THS. Consultez immédiatement votre médecin à propos de tous les symptômes qui peuvent indiquer une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire, tels qu'un gonflement douloureux dans une de vos jambes, une douleur soudaine dans la poitrine ou des difficultés à respirer.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine. Votre médecin sera particulièrement attentif aux bénéfices et aux risques du THS.

Intervention chirurgicale Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre chirurgien que vous prenez un THS bien avant l'opération. Il sera peut-être nécessaire d'arrêter le traitement THS quelques semaines avant l'opération. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre votre THS.

THS et troubles coronariens Deux grandes études portant sur un type spécifique de THS (œstrogènes conjugués combinés avec de l'acétate de mèdroxyprogesterone) ont montré que le risque de maladies cardiovasculaires pouvait être plus élevé au cours de la première année de THS. Il n'est pas encore clair si cela s'applique également à d'autres types de THS. Si vous avez une douleur dans la poitrine qui s'étend à votre bras ou à votre cou : - consultez votre médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cette douleur peut être le signe d'une crise cardiaque.

THS et crise cardiaque Le risque d'accident vasculaire cérébral est d'environ 1,5 fois plus élevé chez les femmes prenant un THS que chez les femmes qui n'en prennent pas. Le nombre de cas supplémentaires d'accident vasculaire cérébral à la suite d'un traitement par THS augmente avec l'âge.

Comparaison

Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui n'utilisent pas de THS, en moyenne 8 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral. Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui utilisent le THS, 11 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral (c'est-à-dire 3 cas supplémentaires pour 1000 femmes).

Si vous avez des maux de tête sévères inexplicables ou une migraine (qui peut s'accompagner de troubles de la vision) : - consultez un médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cela peut être un signe d'alerte précoce d'un accident vasculaire cérébral.

Enfants et adolescents

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé n'est pas destiné aux enfants qui n'ont pas encore eu leurs premières règles.

Autres médicaments et Duphaston 10 mg comprimé pelliculé

Si vous prenez ou avez pris récemment ou pourraut prendre un autre médicament. Cela comprend les médicaments obtenus sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Vous devez informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants. Ces médicaments peuvent réduire l'effet de Duphaston et conduire à un saignement irrégulier. - préparations à base de plantes contenant du millepertuis (Hypericumperforatum), - médicaments anticonvulsivants (tels que phénobarbital, phénitoïne, carbamazépine, primidon), - médicaments anti-infectifs (tels que la rifampicine), - médicaments pour traiter les infections par VIH (SIDA) (tels que ritonavir, névirapine, éfavirenz), - médicaments contre le virus de l'hépatite C.

Si l'un des points ci-dessus s'applique à vous(ou en cas de doute), il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre Duphaston 10 mg comprimé pelliculé.

DUPHASTON 10 mg comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons
Duphaston 10 mg comprimé pelliculé peut être pris avec ou sans nourriture.

pelliculé utilisé en association avec un estrogene incluent un épaisseissement abnormal ou un cancer de l'utérus et un cancer de l'ovaire.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez ou votre pharmacien seraient pas ment effets indésirables En signalant le d'informations sur

حصة رقم /
Date .Fab صنع في/
Date .Exp صالح إلى /

559828
06 2019
05 2024



5. Comment

Tenir hors de la

Ne pas utiliser à boîte et la plaque (mois et année). La mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Que contient ce médicament

- La substance active dans ce médicament est : la dydrogéstérone. Chaque comprimé contient 10 mg de dydrogéstérone.
- Noyau du comprimé, les autres composants sont : lactose monohydraté, hypromellose, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.
- Pelliculage du comprimé, les autres composants sont : hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane (E171).

Qu'est-ce que Duphaston 10 et contenu de l'emballage extérieur

- Comprimé pelliculé scellé blanc, rond et biconvexe, avec une ligne de sécabilité et un diamètre de 6 mm.
- Portant l'inscription "155" sur les deux côtés de la ligne de sécabilité. La ligne de sécabilité du comprimé n'est là que pour faciliter la prise du comprimé en facilitant la division. (voir aussi la section 3 de cette notice)
- Les comprimés sont conditionnés dans des sachets en aluminium / PVC.
 - Duphaston 10 mg est contenu dans une boîte contenant chacune 10 comprimés.
 - Duphaston est sous forme de comprimé pelliculé.

Titulaire de l'Autorisation d'importation et de vente Maphar Km 10, route côtière 111, Quartier industriel de Zénata, Ain Sebaâ Casablanca - Maroc
DUPHASTON 10MG CP PEL B20 PPV. 90D80 12/2014
Rachid LAMRINI - Pharmacien Responsable

Titulaire de l'Autorisation d'importation et de vente Laboratoires Maphar

Km 10, route côtière 111

Quartier industriel

Zénata-Ain Sebaâ

Maroc

Rachid LAMRINI - Pharmacien Responsable

Fabricant

Abbott Biologicals B.V.
Veerweg 12, 8121 AA Olst
Pays-Bas

Dernière révision : selon le RCP Pays bas 08/2017



Si vous avez une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire lors de l'utilisation de THS, vous devez immédiatement arrêter de prendre le THS. Consultez immédiatement votre médecin à propos de tous les symptômes qui peuvent indiquer une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire, tels qu'un gonflement douloureux dans une de vos jambes, une douleur soudaine dans la poitrine ou des difficultés à respirer.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine. Votre médecin sera particulièrement attentif aux bénéfices et aux risques du THS.

Intervention chirurgicale Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre chirurgien que vous prenez un THS bien avant l'opération. Il sera peut-être nécessaire d'arrêter le traitement THS quelques semaines avant l'opération. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre votre THS.

THS et troubles coronariens Deux grandes études portant sur un type spécifique de THS (œstrogènes conjugués combinés avec de l'acétate de médroxyprogesterone) ont montré que le risque de maladies cardiovasculaires pouvait être plus élevé au cours de la première année de THS. Il n'est pas encore clair si cela s'applique également à d'autres types de THS. Si vous avez une douleur dans la poitrine qui s'étend à votre bras ou à votre cou : - consultez votre médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cette douleur peut être le signe d'une crise cardiaque.

THS et crise cardiaque Le risque d'accident vasculaire cérébral est d'environ 1,5 fois plus élevé chez les femmes prenant un THS que chez les femmes qui n'en prennent pas. Le nombre de cas supplémentaires d'accident vasculaire cérébral à la suite d'un traitement par THS augmente avec l'âge.

Comparison

Comparaison.
Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui n'utilisent pas de THS, en moyenne 8 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral. Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui utilisent le THS, 11 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral (c'est-à-dire 3 fois plus fréquentes que pour 1000 femmes).

Si vous avez des maux de tête sévères inexplicables ou une migraine (qui peut s'accompagner de troubles de la vision) : - consultez un médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cela peut être un signe d'alerte précoce

— 2 —

Enfants et adolescents
Duphaston 10 mg comprimé pelliculé n'est pas destiné aux enfants qui n'ont

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 35, No. 4, December 2010
DOI 10.1215/03616878-35-4 © 2010 by The University of Chicago

Autres médicaments et Duphalac 10 mg comprimé pelliculé
Si vous prenez ou avez pris récemment ou pourraient prendre un autre médicament. Cela comprend les médicaments obtenus sans ordonnance, dans d'autres endroits ou à votre pharmacie.

Vous devez informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants. Ces médicaments peuvent réduire l'effet de Duphaston et conduire à un saignement irrégulier. - préparations à base de plantes contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*) , - médicaments anticonvulsivants (tels que phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, primidon) , - médicaments anti-infectieux (tels que la rifampicine) , - médicaments pour traiter les infections par VIH (SIDA) (tels que ritonavir, névirapine, éfavirenz) , - médicaments contre

Si l'un des points ci-dessus s'applique à vous (ou en cas de doute), il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

DUPHASSTON 10 mg comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons

pelliculé utilisé en association avec un estrogène incluent un épaississement anormal ou un cancer de l'utérus et un cancer de l'ovaire.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez ou votre pharmacien serait pas mentionné. En signalant les effets indésirables d'informations supplémentaires.

رقم / حصة Lot N°
نوع في / Date .Fab
نهاية / Date Exp

539828
06 2019
05 2024

5. Comment

3. Commentaires

Ne pas utiliser
boîte et la plaque
(mois et année)
mais

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces substances entraînent des dégâts sur l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

© 2013 Pearson Education, Inc.

- Que contient ce médicament**

 - La substance active dans ce médicament est : la hydrogestérone. Chaque comprimé contient 10 mg de hydrogestérone.
 - Noyau du comprimé, les autres composants sont : lactose monohydraté, hypromellose, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.
 - Pelliclage du comprimé, les autres composants sont : hypromellose, manioc-400, dioxyde de titane (E171).

Ouest de rue Buxhester 10 et secteur de Lamballeau au 16

Titulaire de l'Autorisation d'Importation et de Distribution

Littoral de l'Automobile
Laboratoires Maphar
Km 10, route côtière 111
Quartier industriel
Zenata-Aïn Sébaâ
Maroc
Rabéah LAMRINI, Pharmacien Responsable

Fabricant
Abbott Biologicals B.V.
Veerweg 12 ,8121 AA Oldebroek
The Netherlands

Dernière révision : selon le RCR Bays bas 08/201

