

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 0 Réclamation | contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | adhésion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-512263

ND.32483

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 2847 Société : R.A.M.

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : DOUNIA CHAÏSSADHA

Date de naissance : 06/10/1953


Adresse : 59 Bd ZERKTOUNI RESIDENCE LES FLEURS

9^e ETAGE APP 88 CASA MAROC

Tél. : 06 51 98 96 87 Total des frais engagés : 1128,90 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 03 JUIN 2020

Nom et prénom du malade : DOUNIA CHAÏSSADHA Age:

Lien de parenté : Lui-même

Nature de la maladie : Conjoint

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 03/06/2020

Signature de l'adhérent(e) : 13/06/2020

VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie

N° W19-512263

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 2847

Nom de l'adhérent(e) : DOUNIA

Total des frais engagés : 1128,90 Dhs

Date de dépôt : 24/06/2020

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
20/07/2019	C2		300.-DH	INP : <input type="checkbox"/> Docteur Mohamed des Maladies mentales 7 Bd. Raphaël Meekin 12231 Casablanca
20/07/2019	Z40		450.-DH	SPF : <input type="checkbox"/> Digital : <input type="checkbox"/> Bd. Raphaël Meekin 12231 Casablanca

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	03/06/2020	378,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000	B 35533411 11433553	MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel Therapeutique nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Mohamed BENNANI

Diplômé de Besançon - France

Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif

(Foie - Estomac - Intestins)

Fibroscopie Digestive

Diplômé d'Echographie de Strasbourg

Attestation de Proctologie de Paris

(Hémorroïdes - Fissures - Fistules Anales)

Ancien Attaché des Hôpitaux de France

Membre de la Société Nationale Française de Gastro-Entérologie SNFGE

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive SFED

Membre de la Société Européenne d'Endoscopie Digestive ESGE

Membre de la Société Nationale Française de Colo-proctologie SNFCP

الدكتور محمد بناني

خريج كلية الطب ببوردو فرنسا

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي - التنظير الداخلي

حاصل على شهادة الفحص بالأشعة ما فوق الصوتية

بكالوريوس في طب بسترايسبرغ

حاائز على شهادة أمراض البواسير بباريس

ملحق سابقاً بمستشفيات فرنسا

عضو في الجمعية الفرنسية لأمراض الجهاز الهضمي

عضو في الجمعية الفرنسية للتنظير الباطني

عضو في الجمعية الأوروبية للتنظير الباطني

عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية لطب المستقيم

03 JUIN 2008

Q constat

Reurit

24.70

1) TANAXET ep

0.0.13

sur cache

87 - -

2) Relexin 200

1.0.1

sur cache

113.90

3) Remphe 20

1.0.0

sur cache

54.00

4) Duspablin 100

1.1-1.8

sur cache

64.90

5) Transfibre gel

2 - 2 - 2

sur cache

40.80

47, Bd Rahal El Meskini - Casablanca - Tél/Fax : 05 22 31 47 42

47، شارع رحال المسكيني - الدار البيضاء - الهاتف / الفاكس : 05 22 31 47 42

6) Motilium

1.1-1.6

sur cache

Pharmacie LAMORCIERE
33 Rue Tarabulus Casablanca
Tél: 0522 27 94 56
INPE 09-039536

Pharmacie LAMORCIERE
33 Rue Tarabulus Casablanca
Tél: 0522 27 94 56
INPE 09-039536

Pharmacie LAMORCIERE

33 Rue Tarabulus Casablanca

Tél: 0522 27 94 56

INPE 09-039536

Pharmacie LAMORCIERE

33 Rue Tarabulus Casablanca

Tél: 0522 27 94 56

INPE 09-039536

Pharmacie LAMORCIERE

33 Rue Tarabulus Casablanca

Tél: 0522 27 94 56

INPE 09-039536

Pharmacie LAMORCIERE

33 Rue Tarabulus Casablanca

Tél: 0522 27 94 56

INPE 09-039536

Pharmacie LAMORCIERE

33 Rue Tarabulus Casablanca

Tél: 0522 27 94 56

INPE 09-039536

Pharmacie LAMORCIERE

33 Rue Tarabulus Casablanca

Tél: 0522 27 94 56

INPE 09-039536

TARAXET 25 mg, comprimé pelliculé Hydroxyzine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre médecin ou votre pharmacien.



Si vous remarquez un effet secondaire, contactez votre médecin ou à votre pharmacien.

24,70

Si vous remarquez un effet secondaire, contactez votre médecin ou à votre pharmacien.

rendre TARAXET ?



DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le groupe de médicaments appelé anti-histamines (pour rhinites), il est indiqué :
- pour la cause de l'urticaire (éruption cutanée) et la dermatite et l'enfant,
- pour l'anesthésie générale,
- l'anxiété chez les adultes.

DES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE

Si vous êtes sucreux, contactez-le avant de prendre ce médicament. Si vous avez une malabsorption du glucose-galactose vous ne devrez pas prendre ce médicament.

TARAXET® 25 mg
SOTHEMA
Hydroxyzine

30 Comprimés pelliculés
Film-coatés 25 mg



6 118000 022954

des médicaments et TARAXET),

- si quelqu'un dans votre famille est décédé subitement à cause de problèmes cardiaques,
- si vous êtes un asthmatique ayant souffert dans le passé d'une réaction grave due à un antihistaminique,
- si vous avez une porphyrie (une maladie qui cause des douleurs d'estomac, constipation, changement de la couleur des urines, éruption cutanées, trouble de comportement),
- si vous êtes enceinte, vous envisagez une grossesse ou vous alliez,
- si vous avez un glaucome (augmentation de la pression dans l'œil),
- si vous avez une difficulté pour uriner due à un problème de prostate.

SI L'UN DE CES CAS S'APPLIQUE À VOUS, OU SI VOUS N'ETES PAS SURE, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TARAXET.

Mises en garde et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARAXET.

TARAXET peut être associé à un risque accru de trouble du rythme cardiaque pouvant mettre en danger le pronostic vital. Par conséquent, si vous avez un problème cardiaque ou vous prenez d'autres médicaments, y compris des

médicaments obtenus sans prescription, parlez-en à votre médecin. Pendant la prise de TARAXET, consultez immédiatement un médecin en cas de survenue de problèmes cardiaques comme des palpitations, problème de respiration, perte de connaissance. Le traitement par l'hydroxyzine doit être arrêté. Parler à votre médecin avant de prendre TARAXET si vous souffrez de :

- maladie de reins ou en dialyse,
- maladie du foie, TARAXET ne convient pas aux patients souffrant de maladie grave du foie ou d'insuffisance hépatique,
- problèmes digestifs ou d'estomac,
- myasthénie grave (maladie entraînant une faiblesse musculaire),
- démenage,
- troubles épileptiques incluant l'épilepsie (crises),
- problèmes respiratoires,
- obstruction des voies urinaires,
- hyperthyroïdisme (souvent appelé "thyroïde hyperactive"),
- hypertension artérielle.

Votre médecin pourra ajuster votre dose si vous êtes âgés.

TARAXET peut modifier les résultats de certains tests d'allergie ou d'asthme. Le traitement doit être arrêté 5 jours (7 jours pour les patients âgés) avant la réalisation d'un test cutané d'allergie ou avant le test à la méthacholamine. Informez toujours votre médecin ou votre infirmière que vous avez récemment pris TARAXET.

SI L'UN DE CES CAS S'APPLIQUE À VOUS, OU SI VOUS N'ETES PAS SURE, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TARAXET.

Autres médicaments et TARAXET

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Cela inclut les médicaments obtenus sans ordonnance. TARAXET peut affecter ou être affecté par d'autres médicaments.

Ne prenez pas TARAXET si vous prenez un médicament pour traiter :
- des infections bactériennes (par ex. les antibiotiques érythromycine, moxifloxacine et levofloxacin),
- des infections fongiques (par ex. pentamidine),
- des problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par ex. amiodarone, quinidine, disopyramide, sotalol),
- une psychose (par ex. halopéridol),
- une dépression (par ex. citalopram, escitalopram),
- des troubles gastro-intestinaux (par ex. prucalopride),
- une allergie,

- un paludisme (par ex. méléquine),
- un cancer (par ex. toremifène, vandetanib),
- un abus de drogues ou des douleurs sévères (méthadone). Il est important d'informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants :
 - adrénaline ou épinephrine,
 - barbiturates (pour les troubles de sommeil et l'épilepsie),
 - cimétidine (pour les ulcères et brûlures d'estomac),
 - antiémétiques (médicaments pour traiter les vomissements et les nausées),
 - betahistine (pour traiter une maladie appelée maladie de Ménière),
 - anesthésiques,
 - myorelaxants,

- opioïdes (médicaments pour soulager la douleur sévère) médicaments anti-cholinergiques, ceci inclus certains médicaments utilisé pour le syndrome de l'intestin irritable, asthme ou l'incontinence,
- aminophylline (pour les troubles de respiration),
- sels du benzylpenicillate et succinate de sodium chloramphénicol (antibiotiques),
- chlorhydrate de doxorubicin (médicament de la chimiothérapie),
- antidépresseurs, incluant les inhibiteurs des monoamines oxydases (IMAO) (tel que l'isocarbazoxide ou le moclobémide) et les tricycliques (tel que l'amitriptyline) médicaments pour traiter l'anxiété,
- somnifères,
- benzodiazépines,

- médicaments anticholinesterase (tel que l'edrophonium et la neostigmine),
- médicaments antimuscariniques (tel que l'atropine),
- médicaments antipalpitaires,
- autres antihistaminiques,
- les médicaments qui ont un effet sur le cerveau interagissent avec les antihistaminiques. L'hydroxyzine est un inhibiteur du CYP2D6 (une enzyme qui métabolise certains médicaments) et peut causer des interactions avec les substrats du CYP2D6. La cétirizine n'interagit pas avec d'autres médicaments via cytochrome P450 (une famille de protéines qui interviennent dans le métabolisme).

Relaxium

B6



ULATIFITÉ ET QUANTITATIVE

vitamine B6	260 mg
silium	150 mg
e magnésium	1 mg

magnéum, malodextrine, dioxyde de silicium.

vitamine B6	520 mg
silium	300 mg
e magnésium	2 mg

magnéum, malodextrine, dioxyde de silicium.

vitamine B6	650 mg
silium	375 mg
e magnésium	2 mg

magnéum, malodextrine, dioxyde de silicium.

NTATIONS

ule. Boîte de 20 et 60
ule. Boîte de 15 et 30
ule. Boîte de 30, 45, 60 et 90

magnésium et de la vitamine B6.
t dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité,
culaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de
l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

ITION ET UTILISATIONS

vitamine B6

VOIE ORALE
30 GÉLULES

avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.
EMENT
en cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre
en avant d'utiliser un produit.

à votre médecin ou

INPRIMEPEL 10/19



JUCAVI
JUCAVI
JUCAVI

COMPLEXE RELAXANT



146-147 ZI. Tit Mellil - Casablanca

Laboratoires Deva Pharmaceutique
J.OUAIDI Pharmacien Responsable

LOT: 200111
DLUO: 03/2023
87, 00DH

رانسيفيكس® 20 ملغ

ريبارازول الصودي

RANCIPHEX® 20 mg

28 comprimés gastro-résistant

Voie orale



6 118 001 300808

العلكة الفموية
لечение
مدة 30 يوماً

20 ملغ

موضع الاستعمال:
أفواه الماء بالدыхان
و مجرى الأنف.
لا تتدفق 25 درجة مئوية.

PPV: 113 DH 70

0 mg
je
à l'intérieur.
enfants.
passant pas
du harnais des enfants.

الشكل: ميلادي
شكل الفراش مقاومة لحموضة المعدة. على من 14، 28 و 56 فرسماً.

وندي، التي تتضمن لمجموعة الأدوية
كمية العاملين التي تتوجهها المعدة.

يحدث الإرجاع المعدى-المريئي

لك.

إصلية هذه الفرج بيكثيرها تسمى

استعمال الفراش رانسيفيكس®

سيتيح الشفاء من الفرجة. هذا سينع

أكثر من اللازم.

6. نظرية وطريقة الاستعمال

نظرة على الاستعمال المرضي

8. الآثار الغير المرغوب فيها المحتملة
كباقي الأدوية، قد يحدث رانسيفيكس®, بعض الآثار الجانبية عند بعض الأشخاص مع أنها
تحصل لدى الجميع.

الآثار الجانبية عادة متعددة وتتضمن دون الحاجة للتوقف عنأخذ الدواء.
توفقاً عنأخذ رانسيفيكس® واتصلوا فوراً بالطبيب إذا لاحظتم أحد الآعراض الجانبية
التالية - قد تكون في حاجة لعلاج مستجد:

- ردود فعل حساسية: يمكن للأعراض أن يتضمن: انتفاخ مفامي للوجه، صعوبة في
التنفس أو ضيق ثدي منخفض يمكنكم أن يزيدوا بالإصاء أو السقوط
- علامات متكررة للإصابة، مثل آلم بالحنجرة، حرارة مرتفعة (حمى) أو فرحة داخل
القام أو الحنجرة.
- مشكلة الكبد أو التزيف.

هذه الآثار الجانبية نادرة (تؤثر على مستعمل 1 من بين 1000).

- ضيق حويصلب، آلم أو فرحة بالقام أو بالحنجرة.

هذه الآثار الجانبية نادرة جداً (تؤثر على مستعمل 1 من بين 10000).

آثار جانبية أخرى ممكنة:

شقيقة (تؤثر على مستعمل 1 من بين 10)

- تخفقات.

- صعوبة النوم.

- صداع، دوران.

- سعال، سيلان الأنف أو آلم بالحنجرة (التهاب البلغم).

- تآثرات على المعدة أو على المعنى كalam بالبلط، إسهال، انتفاخ البطن، غثيان، قيء،
أو إمساك.

- أوجاع أو آلم الظهر.

- ضعف أو أعراض شبيهة بالأنفلونزا.

أقل شيوعاً (تؤثر على مستعمل 1 من بين 100)

- تؤثر أو تتعارض.

- إصابة على مستوى الرئتين (التهاب الشعب الهوائية).

- آلم بالجحوب الأنفية وانتسادها (التهاب الجحوب الأنفية).

- جفاف الماء.

- عسر النفاس أو جفاف (تشد).

- ضيق جاهي أو احتقان الجلد.

- آلام على مستوى المضلات، الساقين أو المفاصل.

- تغير المثانة (تغير المسالك البولية).

- آلام في الصدر.

TRANSIFLORE®

L'association unique de plantes et de charbon activé en fait le complément idéal pour lutter contre les ballonnements et les flatulences.

La présence de charbon activé aide également à en adsorbant les gaz.

COMPOSITION

Extrait sec de fenouil semence.....	100 mg
Extrait sec d'anis vert semence	50 mg
Carvi noir	50 mg
Charbon activé	30 mg

FENOUIL :

- Aide à la digestion grâce aux fibres qu'il contient
- Action carminative qui favorise l'expulsion des gaz intestinaux et réduit leur production

ANIS VERT :

- Carminatif
- Aide à améliorer l'aérophagie
- Permet de diminuer les sensations de mauvaise haleine

CARVI NOIR :

- Stimulant des sécrétions salivaires, gastriques et hépatiques permettant ainsi de faciliter la digestion

CHARBON ACTIVE :

- Purifie l'organisme par l'adsorption des toxines et des bactéries
- Régule le transit
- Limite les flatulences et l'aérophagie

Notre
TRANSI-FLORE

FENOUIL - ANIS VERT - CARVI NOIR
CHARBON VÉGÉTAL ACTIVÉ

- Facilite le transit
- Améliore la digestion
- Effet ventre plat

No
30 Gélules

Poids net : 10 g

Lot : T281C
Dlvo : 10/2021
P.P.C : 64.90 Dh

Motilium® 10 mg

dompéridone
comprimés pelliculés

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observerez en utilisant la rubrique 4 comment déclarer les



3430

Motilium® 10 mg

احترم المقدار الموصوفة
Respecter les doses prescrites

Uniquement sur ordonnance - Liste II
بصرف فقط بموجب وصفة طبية . لاتحة II

Lire la notice avant utilisation.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

يرجى الاطلاع على النشرة قبل الاستعمال
تحفظ بعيدا عن مرأى و متناول الأطفال

JANSSEN-CILAG

Fabriqué sous licence par :

maphar, Km 10, route côtière 111.

Q-Zenata, Ain Sebaâ, Casablanca.

Rachid LAMRINI, Pharmacien Responsable



MOTILIUM 10MG
CP PELL B20



6 118000 011033

supérieures à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque le dompéridone est administré avec certains médicaments par votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter des infections (infections fongiques ou bactériennes) si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique d'autres médicaments).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible chez l'adulte et chez l'enfant.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement par MOTILIUM devra alors être arrêté.

Prise d'autres médicaments :

Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé si vous prenez des médicaments pour traiter les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kéticonazole oral, le fluconazole, le posaconazole ou le voriconazole,
- infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la tétracycline, la lévofloxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques),
- problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalol, l'hydroquinidine, la quinidiné),
- psychose (par exemple l'halopéridol, le piégadol, la sertindole),
- dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram),
- troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le domperidone),
- allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine),
- que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase),
- hépatite C (par exemple le télaprévir),
- VIH (par exemple le raltegravir),
- cancer (par exemple la temozolamide, le vandétoposide, la temozolamide),
- que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase),
- VIH (par exemple le raltegravir),
- cancer (par exemple la temozolamide, le vandétoposide),

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

Il est important de demander à votre médecin ou à votre pharmacien si MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé est sûr pour vous lorsqu'il prend d'autres médicaments, y compris des médicaments délivrés sans ordonnance.

Prise de MOTILIUM avec des aliments et boissons

Prenez MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé avant les repas. Si vous prenez MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé après les repas, son absorption est quelque peu retardée.

Grossesse : Le risque associé à la prise de MOTILIUM pendant la grossesse n'est pas connu.

Si vous êtes enceinte ou pensez que vous pouvez l'être, consultez votre pharmacien ou votre médecin qui décidera si vous pouvez prendre MOTILIUM.

Allaitement : Des petites quantités de dompéridone ont été trouvées dans le lait maternel. MOTILIUM peut entraîner des effets indésirables chez le nourrisson allaité. MOTILIUM doit être utilisé au cours de l'allaitement uniquement si votre pharmacien le juge nécessaire. Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Certains patients ont rapporté des sensations vertigineuses ou une somnolence après la prise de MOTILIUM. Ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines lorsque vous prenez MOTILIUM, avant de connaître l'effet que ce produit a sur vous.

Informations importantes concernant certains composants de MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé :

DR. MOHAMED BENNANI

Diplômé de la faculté de Médecine

De BESANÇON – France

03/06/2020

ME CHAMSDHA DOUNIA

SPECIALISTE

Des Maladies de l'Appareil Digestif

ECHOGRAPHIE ABDOMINO-PELVienne



Dr Mohamed BENNANI

Diplômé de Besançon - France

Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif

(Foie - Estomac - Intestins)

Fibroscopie Digestive

Diplômé d'Echographie de Strasbourg

Attestation de Proctologie de Paris

(Hémorroïdes - Fissures - Fistules Anales)

Ancien Attaché des Hôpitaux de France

Membre de la Société Nationale Française de Gastro-Entérologie SNFGE

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive SFED

Membre de la Société Européenne d'Endoscopie Digestive ESGE

Membre de la Société Nationale Française de Colo-proctologie SNFCP

الدكتور محمد بناني

خريج كلية الطب ببوزنسون فرنسا

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي - التنظير الداخلي

حاائز على شهادة الفحص بالأشعة ما فوق الصوتية

الطب بستراسبورغ

حاائز على شهادة أمراض البواسير بباريس

ملحق سابقا بمستشفيات فرنسا

عضو في الجمعية الفرنسية لأمراض الجهاز الهضمي

عضو في الجمعية الفرنسية للتنظير الباطني

عضو في الجمعية الأوروبية للتنظير الباطني

عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية لطب المستقيم

03/06/2019

NOM : ME DOUNIA CHEMSA DHA

C/R D'ECHOGRAPHIE ABDOMINO-PELVienne

Le foie est de taille limite de la normale et d'échostructure homogène , aux bords réguliers sans anomalie focale circonscrite intraparenchymateuse décelable et sans dilatation des voies biliaires intra ou extra hépatiques.

Absence d'anomalie de calibre ou de trajet des structures veineuses portales et sus hépatique.

La vésicule biliaire est de taille normale à contenu anéchogène et à paroi fine.

Le pancréas présente un aspect normal au niveau de la portion céphalo-corporelle .Il en est de même pour la région mesocolique .

La rate est homogène , de taille normale .

Les deux reins sont de taille normale avec une bonne différenciation cortico-médullaire sans dilatation pyélo-calicielle.
la vessie présente des contours réguliers et une paroi fine.

Absence de masse ou de collection anormale visible notamment au niveau de la fosse iliaque droite.

Météorisme colique diffus modéré.

-C/C : IMPORTANT METEORISME ABDOMINAL DIFFUS.

DISCRETE HEPATOMEGALIE HOMOGENE.

Dr. Mohamed BENNANI
SPECIALISTE
des Maladies de l'Appareil
Digestif
47, Bd. Rahal El Meskini
Tél: 03.22.31.47.42 / Casablanca

47, Bd Rahal El Meskini - Casablanca - Tél/Fax : 05 22 31 47 42

47، شارع رحال المسكيني - الدار البيضاء - الهاتف / الفاكس :