

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

phacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

N°D: № P19-0035839

33161

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2001007

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés:



Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 06/07/2020

Nom et prénom du malade : SAADEH El Khatib Age:

Lui-même

Conjoint

Enfant

Lien de parenté :

Nature de la maladie : Célo-polype, colyse, ménadole

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
06 07 2022	CA		130 DH	

EXECUTION DES ORDONNANCES

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan d

O.D.F
PROTHÉSES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
D 00000000	00000000

(Création, remont, adjonction)

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAILX

MONTANTS DES COINS

DATE DU
DEVIS

Dr.El Moustapha MAACHOU

Spécialiste en Médecine du Travail
Médecine Générale

الدكتور المصطفى معاشو

اختصاصي في طب الشغل
الطبيب العام

- Echographie
- E.C.G
- Ancien Médecin de la Polyclinique des Electriciens
- Médecin Assermenté près des Tribunaux

- فحص بالصدري
- تخطيط القلب الكهربائي
- طبيب سابق بمصحة الكهربائيين
- طبيب خبير محلف لدى المحاكم

Casablanca, le : 06.07.2008

1 = STADIUM SASRI KHOUDIR

24,70 - TARAXET 25g
1/2 g le sri

40,40 - Echographie
1 pt + 30 aer

86,80 - Recette 204
14

75,00 - orostic
144

42,20 x 2 CAL C A X D
144 x 02 mois

21,20x2 Mercox 100g N₂
14 x 20 x 3 mm repaire le m^{att}
+ joints ap

درب البلدية، زنقة القاضي العراقي 12 مكرر - الهاتف : 06 98 22 82 05

Quartier Baladija, Rue CADI EL IRAKI, 12 Bis - Tél. : 05 22 82 98 60 - E-mail: dr.maachou-m@hotmail.fr



PHARMACIE POPULAIRE
LAHLOU MOHAMED CIEN
Angle Rue Hadji Amar Riffi
Tél. 05 22 22 17 04 - Casablanca

- Courteie el Tha Poy
6403 19M1

Dr. MACIEN EL MOUSTAPHA
Spécialiste en Antécédents de Traçage
MÉDECIN CASUAL
Quai des Baïadja, Rue des Baïadja, RAOU 12 BS
Tél: 05 22 22 17 04 - Casablanca



PHARMACIE POPULAIRE
LAHLOU Mohamed
PHARMACIEN
Angle Rue Hadi Amar Riffi
& Boulevard d'Alsace
Tél: 05 22 22 17 04 - Casablanca

T: 412,80



vermox

TRADEMARK



Composition

Comprimés à 100 mg de mébendazole.

Suspension buvable à 20 mg de mébendazole.

Propriétés

Vermox est un dérivé synthétique du benzimidazole avec une activité anthelminthique puissante contre les nématodes et les cestodes. Chez l'homme, Vermox est très efficace contre :

Enterobius vermicularis (oxyure) *Necator americanus*

Ascaris lumbricoides (ascaris) *Strongyloïdes stercoralis*

Trichuris trichiura (trichocéphale) *Taenia spp.* (ver soi)
Ancylostoma duodenale (ankylostome)

Une posologie judicieuse permet de guérir plus de 90 % en cas d'infections sévères ou mixtes.

Indications

- oxyurose
- ascariasis
- trichocéphalose
- ankylostomose
- strongyloïdose (anguilleux)
- téniasis

2120



vermox

TRADEMARK



Composition

Comprimés à 100 mg de mèbendazole.
Suspension buvable à 20 mg de mèbendazole.

Propriétés

Vermox est un dérivé synthétique du benzimidazole avec une activité antihelminthique puissante contre les nématodes et les cestodes.

Chez l'homme, Vermox est très efficace contre :

Enterobius vermicularis (oxyure)

Necator americanus

Ascaris lumbricoides (ascaris)

Strongyloïdes stercoralis

Trichuris trichiura (trichocéphale)

Taenia spp. (ver solitaire)

Ancylostoma duodenale (ankylostome)

Une posologie judicieuse permet de guérir plus de 90 % de
en cas d'infections sévères ou mixtes.

Indications

- oxyurose

- ascariose

- trichocénose

21,20



Canesten® Extra



Bifonazole

Crème 1%

Forme et Présentation Pharmaceutiques

Canesten® Extra Crème : tube de 15 g de crème pour a

Composition :

Principe actif : Bifonazole

1 g de crème contient 0,01 g de bifonazole.

Excipients : alcool benzylique, alcool cétostéarylque polysorbate 60, eau purifiée, monostéarate de sorbitan

Propriétés :

Le bifonazole est un antifongique à large spectre imidazolés.

Son spectre d'action comprend les dermatophytes, les levures également actif sur d'autres champignons comme Malassezia ██████████ Corynebacterium minutissimum.

Le bifonazole agit en inhibant la synthèse de l'ergostérol à deux niveaux, ce qui le distingue des autres dérivés azolés qui n'agissent qu'à un seul niveau. Cette inhibition conduit à des altérations structurelles et fonctionnelles de la membrane cytoplasmique.

Indications :

Dermatophytoses :

- Traitement des dermatophytoses de la peau glabre : herpès circiné;
- Traitement des intertrigos des grands plis : eczéma marginé de Hébra, intertrigos génitaux et cruraux ;
- Traitement des intertrigos des orteils : pied d'athlète ;
- Traitement d'appoint d'onyxis dermatophytique : un traitement antifongique est alors nécessaire.

Candidoses :

Les candidoses rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à Candida albicans. Cependant, la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une indication.

- Traitement des intertrigos des grands plis : génitaux, cruraux, interfessiers, axillaire et sous-mammaires;
- Traitement des intertrigos des petits plis : interdigitaux, interorteils;
- Traitement des perlèches, vulvites et anites;
- Traitement d'appoint d'onyxis ou périonyxie. Un traitement systémique antifongique peut être discuté.

Dans certains cas, et en particulier dans les mycoses de la sphère péri-buccale et péri-anogénitale, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif.

- pityriasis versicolor.

Contre-indications :

Le traitement par Canesten® Extra Crème est contre-indiqué en cas de :

- Hypersensibilité au bifonazole.
- Hypersensibilité à l'alcool cétostéarylque ou à l'un des autres constituants.

Mises en garde et précautions d'emploi :

Aucune étude approfondie n'a été réalisée chez l'enfant.

Les données cliniques recueillies ne laissent présager aucun effet nocif chez l'enfant.

Toutefois, le bifonazole ne doit être utilisé chez le nourrisson que sous surveillance médicale.

Eviter le contact avec les yeux.

LOT : CT016E

12 2024

64 00

PPV :



Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

42,20



votre

DÉNOMINATION

CALCIFIX® D3 500 mg/400 UI

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Carbonate de calcium correspondant à calcium élément 500 mg

Cholécalciférol enrobé à 100 000 UI/g* correspondant à cholécalciférol (vitamine D3) 400 UI

Excipients q.s.p. un comprimé

* mélange de cholécalciférol, d'alphatocophérol, de graisses alimentaires, de gélatine, de saccharose et d'amidon de maïs.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION

Boîte de 30 comprimés à croquer ou à sucer.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

APPORT VITAMINO D-CALCIQUE.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué :

- chez le sujet âgé, en cas de carences en calcium et en vitamine D,
- en association aux traitements de l'ostéoporose, lorsque l'apport de calcium et de vitamine D est insuffisant.

ATTENTION !

a) DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- antécédents d'allergie à la vitamine D ou à l'un des constituants,
- immobilisation prolongée,
- quantité de calcium dans le sang anormalement élevée (hypercalcémie),
- élimination exagérée de calcium par l'urine (hypercalciurie),
- calculs rénaux (lithiasie calcique),
- phénylcétonurie (maladie héréditaire due à un déficit enzymatique), en raison de la présence d'aspartam.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Meteospasmyl®

®

B 20 caps molles

Alvéroline citrate 60 mg / Siméticone 300 mg

P.P.V. : 40,40 DH

Distribué par COOPER PHARMA
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca

6 1180001 100293

Alle - Boite de 20 alvérine et Siméticone

S s'annule non destiné à l'homme

ment cette notice avant
l'achèvement car elle contient
des informations pour vous.

20
prendre ce médicament
Veuillez lire attentivement les informations
de cette notice ou par votre
pharmacien. Si vous avez besoin de la
pharmacien pour tout
des effets indésirables,
rédacteur ou à votre pharma-
cien. Cela s'applique
aussi à tout effet
indésirable qui ne serait pas mentionné dans
cette notice. Voir rubrique 4.

• Ne laissez pas ce médicament à la portée des
enfants.
• Si vous avez des questions, parlez
à votre pharmacien. Cela s'applique
également à tout effet
indésirable qui ne serait pas mentionné dans
cette notice. Voir rubrique 4.
• Ne laissez pas ce médicament à la portée des
enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que METEOSPASMYL, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
3. Comment prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver METEOSPASMYL, capsule molle ?
6. Informations supplémentaires.

METEOSPASMYL capsule molle avec des aliments, boissons et de l'alcool
Sans objet.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Vous devez éviter de prendre ce médicament si vous allaitez.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que METEOSPASMYL ait un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Toutefois, METEOSPASMYL peut provoquer des vertiges et cela peut avoir un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE METEOSPASMYL, capsule molle ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE

1 capsule 2 à 3 fois par jour.

فرحة العافية أو الحسر على عمر في حال الإصابة بجروحه تدعى **فينيلوبلاستير بيلوري**. إن انتفخة عليك هذه الحالة، قد يصف لك الطبيب أيضاً بعض المضادات الجوية لعلاج هذه المرض والتقليل من الفرحة.

البلف

الجرعة 4

- تغليمات من أجل الاستعمال الجيد
تناول دائمًا راسبير® كما وصفه لك طبيبك تماماً، استشر طبيبك أو الصيدلي عند الضرورة.
لا ينصح بتناول راسبير® قرآن مقاوم لمحوسة المعدة من قبل الأطفال أقل من 12 سنة.
إذا كنت تتناول هذا الدواء لفترة طويلة (وخاصة منذ أكثر من سنة واحدة)، يجب على الطبيب
ومنكه تحف المرأة.
إذا أمرك الطبيب بتناول هذا الدواء "عند الطلب" حسب الحاجة، يجب إبلاغه بأى تغيرات
بالأعراض.
طريقة تناول الدواء
يمكنك أن تتناول الأقراص في أي وقت من اليوم.
يمكن تناول الأقراص خلال أو بين الوجبات.

طريقة تناول الدوا

التي يجب تناولها و مدة العلاج لكن ذلك يعتمد على

١٠- علاج اعراض الارتجاع المعدى المريئي (حرقة وارتجاع الحمض)

٣- تحدى الجراثيم الأعوبية حالي:
علاج اعراض الارتجاع المعدى المريئي (حرقة وارتجاع الحمض)
الافتراض: الأدوية بدماء من 12 سنة

gentiles.

- Hives and difficulties in breathing.
 - Swelling of the face, tongue or throat.
 - Difficulties in swallowing.
 - Severe reactions that can include blistering of the skin, eyes, mouth and genitalia.
- If you get any of the following symptoms after taking TARAXET, stop taking people:
- the medicine and seek immediate medical attention:
- everyone gets them. TARAXET can cause side effects, although not Do not worry, like all medicines, TARAXET can cause side effects in some Do not take a double dose. Do not take a double dose. Then go on as before.
- If you forget to take TARAXET

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

- If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.
- TARAXET tell the medical staff carrying out the treatment of the overdose.
- TARAXET can cause considerable sedation that requires treatment.
- TARAXET can cause shakiness and hallucinations.
- slowing down of your central nervous system, which can slow your breathing and heart rate, causing you to feel drowsy or become unconscious. Or, you may experience stimulation of your central nervous system, with feelings of excitement, fits, shaking and hallucinations.
- dry mouth, problems with your vision, fast or pounding heart beat, difficulty passing water and constipation.
- slowing of your thoughts, slurred speech and experiencing restlessness, involuntary or slow movements.
- Symptoms of an overdose can vary and may include:
- thyroid problems such as QT interval prolongation or Torsade de Pointes.
- An ECG monitoring could be undertaken, sympathetic treatment could be implemented. In the event of an emergency department, in particular if a child has taken too much.
- If you have used or taken too much TARAXET, immediately contact your doctor or the nearest accident and emergency department, in particular if a child has taken too much.
- If you take more TARAXET than you should

In the elderly, the maximum daily dose is 50 mg per day.

For elderly patients:

Your doctor will reduce your dose by about half if you have kidney disease.

TARAXET is not suitable for patients with severe liver disease or liver failure.

Your doctor will reduce your dose by about half if you have liver disease.

For patients with kidney disease:

The dose is 50 mg to 100 mg daily, taken throughout the day.

For treating anxiety in adults:

Premedication before general anaesthesia of adults: 100 mg

Children over 6 years old: The recommended dose is 1 mg/kg/day. The doctor may change this depending on the child's weight.

In children up to 40 kg in weight, the maximum daily dose is 2 mg/kg/day.

For patients in children:

Children and adolescents 25 mg three or four times daily.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

The recommended dose should be as short as possible in adults and children over

TARAXET should be a day in all indications.

For patients in adults:

The recommended dose should be a day in all indications.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

first few days after you start taking TARAXET, you should be aware that you may feel tired and drowsy.

Driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

TARAXET may make you sleepy until this effect wears off.

Always take this medicine driving and using

Ask your doctor or pharmacist.

4476

U918

Lisez attentivement l'intégralité de la notice.

Elle contient des informations impor-

Si vous avez d'autres questions,
pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit
symptômes identiques, car cela pourrait lui être.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.



DÉNOMINATION

CALCIFIX® D3 500 mg/400 UI

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Carbonate de calcium correspondant à calcium élément.....	500 mg
Cholécalciférol enrobé à 100 000 UI/g* correspondant à cholécalciférol (vitamine D3).....	400 UI
Excipients	q.s.p. un comprimé
* mélange de cholécalciférol, d'alphatocophérol, de graisses alimentaires, de gélatine, de saccharose et d'amidon de maïs.	

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION

Boîte de 30 comprimés à croquer ou à sucer.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

APPORT VITAMINO D-CALCIQUE.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué :

- chez le sujet âgé, en cas de carences en calcium et en vitamine D,
- en association aux traitements de l'ostéoporose, lorsque l'apport de calcium et de vitamine D est insuffisant.

ATTENTION !

a) DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- antécédents d'allergie à la vitamine D ou à l'un des constituants,
- immobilisation prolongée,
- quantité de calcium dans le sang anormalement élevée (hypercalcémie),
- élimination exagérée de calcium par l'urine (hypercalciurie),
- calculs rénaux (lithiasis calcique),
- phénylcétonurie (maladie héréditaire due à un déficit enzymatique), en raison de la présence d'aspartam.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.