

COMMANDATIONS IMPORTANTES À LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET ÉVITER LES REJETS

Informations générales :

Le nom et l'adresse réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le nom et l'adresse réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie. La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

Entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

Entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

N° P19-0031249

Optique

ND: 33960

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 0770

Société : ROYAL AIR MAROC

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HAMRI Abdeslam

Date de naissance : 24.10.1941

Adresse : Lotis. Charouit Colorado n°2
TANSEZ

Tél. : 0808532132 Total des frais engagés : # 9.231,90 # Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 23.10.2020

Nom et prénom du malade : HAMRI Abdeslam Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Cataracte

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : TANSEZ

Le : 13.10.2020

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	29.06.2020	22.120
	29.06.2020	26.170

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	30.06.20					250.-

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan radiologique.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	C
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS


DATE DU
DEVIS

Dr. Amine IDRISI ALAMI

Spécialiste des maladies et chirurgies des yeux

- Lauréat de la Faculté de Médecine de Rabat et de Paris
- Ancien médecin au CHU Ibn Sina de Rabat
- Ancien Interné des hôpitaux de Paris

- Chirurgie de la cataracte • des paupières • Chirurgie réfractive
- Dacryo • Maladie de la rétine • Contactologie • OCT
- Angiographie • Laser • Topographie cornéenne



الدكتور أمين إدريسي علمي
achi في طب وجراحة العيون

- خريج كلية الطب بالرباط وباريس
- طبيب من الجامعي ابن سينا بالرباط

- جراحة عدسات العيون (جلاة) بالليزر • تقويم النظر بالليزر
- المسالك الدمعية • أمراض الشبكة • العدسات اللاصقة
- تحظيف أنواعية الشبكة • الليزر • تحظيف القرنية

29 Juin 2020

Mr. HAMRI Abdeslam

24,70



1/ TRAKXET 25 MG COMPRIME PELLICULE SECABLE

2 cp le soir



2/ SEPCEN 500 MG COMPRIME

196,50

1 cp le soir

921,90



115, Bd Ben Abdellah (Iberia), 1^{er} étg. N° 4 - Tanger
Tél: 05 39 33 63 48
Fax: 06 25 25 26 48
E-mail: amineophtalm@gmail.com
Dr. Amine IDRISI ALAMI

115, Bd Med Ben Abdellah (Iberia), 1^{er} étg. N° 4 - Tanger

05 39 33 63 64

alamiamineophtalm@gmail.com

INPE : 161173703



TARAXET 25 mg, comprimé pelliculé

Hydroxyzine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARAXET et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARAXET ?
3. Comment prendre TARAXET ?
4. Effets indésirables éventuels
5. Comment conserver TARAXET ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE TARAXET ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TARAXET appartient à un groupe de médicament appelé anti-histamines (pour traiter les réactions allergiques). Il est indiqué :

- dans la démangeaison causée par l'urticaire (éruption cutanée) et la dermatite (eczéma) chez l'adulte et l'enfant,
- en prémédication avant anesthésie générale,
- dans le traitement de l'anxiété chez les adultes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TARAXET ?

TARAXET contient du lactose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament. Si vous avez une intolérance héréditaire au galactose, un déficit en lactase de l'app ou un syndrome de malabsorption du glucose-galactose vous ne devrez pas prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TARAXET :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'hydroxyzine, cétirizine, autres dérivés de la pipérazine, aminophylline ou l'éthylénediamine, ou à l'un des constituants de TARAXET (voir Information supplémentaires),
- si votre ECG (électrocardiogramme) montre une anomalie du rythme cardiaque appelée "allongement de l'intervalle QT",
- si vous avez ou avez eu une maladie cardiovasculaire ou si votre fréquence cardiaque est très basse,
- si vous avez de faibles taux en sel dans votre corps (par ex. un faible taux de potassium ou de magnésium),
- si vous prenez certains médicaments pour des troubles du rythme cardiaque ou des médicaments qui peuvent modifier le rythme cardiaque (voir Autres médicaments et TARAXET),
- si quelqu'un dans votre famille est décédé subitement à cause de problèmes cardiaques,
- si vous êtes un asthmatique ayant souffert dans le passé d'une réaction grave due à un antihistaminique,
- si vous avez une porphyrine (une maladie qui cause des douleurs d'estomac, constipation, changement de la couleur des urines, éruption cutanées, trouble de comportement),
- si vous êtes enceinte, vous envisagez une grossesse ou vous allaitez,
- si vous avez un glaucome (augmentation de la pression dans l'œil),
- si vous avez une difficulté pour uriner due à un problème de prostate.

SI L'UN DE CES CAS S'APPLIQUE À VOUS, OU SI VOUS N'ETES PAS SURE, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TARAXET.

Mises en garde et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARAXET.

TARAXET peut être associé à un risque accru de trouble du rythme cardiaque pouvant mettre en danger le pronostic vital. Par conséquent, si vous avez un problème cardiaque ou vous prenez d'autres médicaments, y compris des

médicaments obtenus

- Pendant la prise de TA survenez de problèmes de respiration, perte de connaissance à votre médecin
- maladie de reins ou de foie,
 - maladie du foie. TARAXET grave de foie ou d'insuffisance hépatique,
 - problèmes digestifs
 - myasthénie grave (maladie de démentie),
 - troubles épileptiques
 - problèmes respiratoires
 - obstruction des voies respiratoires
 - hyperthyroïdisme (souvent)
 - hypertension artérielle

Votre médecin pourra à TARAXET peut modifier le traitement doit être réalisé d'un test cutané. Informez toujours votre TARAXET.

SI L'UN DE CES CAS S'APPLIQUE À VOUS, OU SI VOUS N'ETES PAS SURE, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TARAXET.

Autres médicaments

Informez votre médecin pourrez prendre tout autre médicament sans ordonnance. TARAXET peut modifier le traitement doit être réalisé d'un test cutané.

Ne prenez pas TARAXET :

- des infections bactériennes (par ex. céfalexine et levofoxacin),
- des infections fongiques
- des problèmes cardiaques (par ex. quinidin, disopyramide),
- une psychose (par ex. haloperidol),
- une dépression (par ex. citalopram, escitalopram),
- des troubles gastro-intestinaux (par ex. prucalopride),
- une allergie,
- un paludisme (par ex. mèfénamic),
- un cancer (par ex. toremifène, vandetanib),
- un abus de drogues ou des douleurs sévères (méthadone).

Il est important d'informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants : adrénergique ou épinephrine,

- barbituriques (pour les troubles de sommeil et l'épilepsie),
- cimétidine (pour les ulcères et brûlures d'estomac),
- antiémétiques (médicaments pour traiter les vomissements et les nausées),
- betahistine (pour traiter une maladie appelée maladie de Ménière),
- anesthésiques,
- myorelaxants,

- opioïdes (médicaments pour soulager la douleur sévère) médicaments anti-cholinergiques, ceci inclus certains médicaments utilisés pour le syndrome de l'intestin irritable, asthme ou l'incontinence,

- aminophylline (pour les troubles de respiration),
- sels du benzylpenicilline et succinate de sodium chloramphénicol (antibiotiques),
- chlorhydrate de doxorubicin (médicament de la chimiothérapie),
- antidiépresseurs, incluant les inhibiteurs des monoamines oxydases (IMAO) (tel que l'isocarboxazide ou le moclobémide) et les tricycliques (tel que l'amitriptyline) médicaments pour traiter l'anxiété,
- somnifères,
- benzodiazépines,
- médicaments anticholinesterase (tel que l'edrophonium et la neostigmine),
- médicaments antimuscariniques (tel que l'atropine),
- médicaments antépileptiques,
- autres antihistaminiques,
- les médicaments qui ont un effet sur le cerveau interagissent avec les antihistaminiques. L'hydroxyzine est un inhibiteur du CYP2D6 (une enzyme qui métabolise certains médicaments) et peut causer des interactions avec les substrats du CYP2D6. La cétirizine n'interagit pas avec d'autres médicaments via cytochrome P450 (une famille de protéines qui interviennent dans le métabolisme).

24/70

طاراكسست

بدر و سبز

بدر و سبز

بدر و سبز



asthme. Le

ép. avant la

également pris

TES PAS SURE,

DE PHARMACIEN

vez récemment pris

des médicaments obtenus

peut être affecté par d'autres

ent pour traiter :

les érythromycine, moxifloxa-

n artérielle (par ex. amiodarone,

سيبرو ٩٣
M

SEPCEN 500 mg

ciprofloxacin

10 comprimés pelliculés




6

118000 230182

١٩٦,٥٠

٥٨٢٠٠٧٢
٥٣٧٢٠٢٣
١٦٦,٥٠٠٢

- Lauréat de la Faculté de Médecine de Rabat et de Paris
- Ancien médecin au CHU Ibn Sina de Rabat
- Ancien Interne des hôpitaux de Paris
- Chirurgie de la cataracte • des paupières • Chirurgie réfractive
- Dacryo • Maladie de la rétine • Contactologie • OCT
- Angiographie • Laser • Topographie cornéenne



الدكتور أمين إدريسي علمي
إختصاصي في طب وجراحة العيون

- خريج كلية الطب بباريس وباريس
- طبيب سابق بالمستشفى الجامعي ابن سينا بباريس
- طبيب داخلي سابق مستشفيات باريس
- جراحة عدسات العيون (جلاة) بالليزر • جراحة الجفون • تقويم النظر بالليزر
- المسالك الدمعية • أمراض الشبكة • العدسات اللاصقة
- تخطيط أوعية الشبكة • الليزر • تخطيط القرنية

26/06/2020

DEVIS

Mr. HAMRI Abdeslam

Acte : extraction de cataracte œil gauche par un système de phaco-émulsification à globe fermé avec mise en place d'un implant intra-oculaire

Prestations :

- Pharmacie = 2000.00 dh
- Implant oculaire : 1000.00 dh
- Salle d'opération : K100 x 25 dh = 2500.00 dh
- Chirurgien : k100 x 25 dh = 2500.00 dh

TOTAL : 8000.00 dh

Arrêté le présent devis à la somme de huit mille dirhams.

Dr. Amine IDRISI ALAMI
Ophthalmologiste

115, Bd Med Ben Abdellah (Iberia)
3^{er} étage, N° 115 - Tanger

العنوان: 115، بول. ميد بن عبد الله (iberia)، الطابق 3، رقم 115 - تanger
Tél: 05 39 33 63 64 / Gsm: 06 25 25 26 48
E-mail: alamiamineophtalm@gmail.com


INPE : 16117303

Dr. Amine IDRISI ALAMI

Spécialiste des maladies et chirurgies des yeux

- Lauréat de la Faculté de Médecine de Rabat et de Paris
- Ancien médecin au CHU Ibn Sina de Rabat
- Ancien Interné des hôpitaux de Paris

- Chirurgie de la cataracte • des paupières • Chirurgie réfractive
- Dacryo • Maladie de la rétine • Contactologie • OCT
- Angiographie • Laser • Topographie cornéenne



الدكتور أمين إدريسي علمي

اختصاصي في طب وجراحة العيون

• خريج كلية الطب بباريس

• طبيب سابق بالمستشفى الجامعي ابن سينا بباريس

• طبيب داخلی سابق بمستشفيات باريس

• جراحة عدسات العيون (جحالة) بالليزر • جراحة الخفون • تقويم النظر بالليزر

• المسالك الدمعية • أمراض الشبكة • العدسات اللاصقة

• تخطيط أوعية الشبكة • الليزر • تخطيط القرنية

29 Juin 2020

Mr. HAMRI Abdeslam

Traitements de l'œil opéré

1/ CHIBROCADRON: COLLYRE

1 Goutte 5 fois par jour. Pendant 2 semaines

2/ FRAXIDEX: POMMADE

1 app le soir pendant 10 jours

3/ DICLOCED: COLLYRE

1 goutte 3 fois par jour pendant 1 mois

4/ LARMABAK: COLLYRE

1 goutte 5 fois par jour pendant 8 semaines

5/ ZINNAT 750 mg : Poudre pour injection

1 flacon

6/ PANSEMENT OCULAIRE

A changer chaque matin

FR

Chibro-Cadron, collyre en flacon

Dexaméthasone / Néomycine

peuvent être prescrites sous surveillance ophtalmologique stricte.

CHIBRO-CADRON

Collyre - Flacon 5 ml - PPV : 29,40 DH



6 118001 071425

A.M.M. Maroc
N° 116 DMP/21/NOV
Distribué par les
Laboratoires SOTHEMA
B.P. N°1, 27182
Boussoura - MAROC



FORMEZ-VOUS STRICTEMENT A
MEDECIN.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CHIBRO CADRON, collyre en flacon ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CHIBRO CADRON, collyre en flacon ?
3. COMMENT UTILISER CHIBRO CADRON, collyre en flacon ?

QUELLES SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
CONSEILS CHIBRO CADRON

opacification du cristallin, une kératite superficielle, et un retard de cicatrisation.

Si vous pensez avoir pris plus de CHIBRO CADRON, collyre en flacon, qu'il ne fallait et que vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez contacter votre médecin.

Si vous oubliez de prendre CHIBRO CADRON, collyre en flacon :

Si vous oubliez de mettre une dose, mettez-la dès que possible, sauf s'il est presque l'heure de la dose suivante. Dans ce cas, reprenez votre traitement comme prescrit par votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CHIBRO CADRON, collyre en flacon est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Sensations de brûlure, de larmoiement, gêne, rougeur.
- Risques de réactions allergiques.
- En usage prolongé : augmentation de la tension oculaire, opacification du cristallin, inflammation superficielle de la cornée.

Si vous avez des questions, contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

نـدة العـلاج

أي المتوسط 7 أيام.

يمكن وصف علاج أطول وعمليات تقطير أكثر مع الخصوص
مراقبة صارمة من طرف طبيب العيون.

كل الأحوال ينبع التقييد تماماً بوصفه الطيب.

ما يجب فعله في حالة أخذ جرعة مفرطة من شيبوروكلادرون
 محلول قطرات للعين في قارورة:

يمكن أن ينبع عن التقطير المتكرر لمحول قطرات العين لمدة طويلة مرور مجموعي لا يستهان به للمواد الفعالة ، فرط ضغط العين ، نكث الخلط البليوري ، التهاب القرنية السطحية ، تأخر في الالتفات.

إذا تناولتم جرعة من شيبروكادرون محلول قطرات للعين
في قارورة ولاحظتم آثار غير مرغوب فيها غير واردة
في النشرة، أخبر طبيبك.

إذا نسيت أخذ شيبروكادرون محلول قطرات للعين في قارورة: إذا نسيت وضع جرعة، قم بوضعها في أقرب وقت ممكن إلا إذا كان وقت الجرعة المنشورة قد أصرد، وشدّها

٤. ما هي الآثار الغير مرغوب فيها المحتملة ؟
تمثل كل الأدوية ، يمكن أن تترتب عن شبيرو كاردون محلول
نطرات للعين في قارورة آثار غير مرغوب فيها ولكن ليس كل
الأشخاص معجبون بها

احسان مرسوں پر احسان بالحرقة ، تکمع ، رطوبہ عنینہ و احمرار .
ث روید فعل حساسیہ

شیپروکادر ون

محلول قطرات العين في قارورة

دیکسا میتاژون / ندو میمسن

اقرأ يتبعن هذه النشرة بأكملها قبل استعمال هذا الدواء.

احفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مجدداً.

• اذا كانت لديك اسئلة اخري، اذا كان لديك شك، اطلب

معلومات أكثر من طبيبك أو من الصيدلي.

لقد وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لبداً لشخص آخر

حيث أن كان سعد نافع الأعاجز لأن ذلك يمكن أن يكون

ضال الله

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ لِمَا يَعْلَمُ

غير مرغوب فيه غير وارد في هذه التسراة، اعلم طبيب او

في هذه النشرة:

١. ما هو شيبرووكادرون محلول قطرات للعين في قارورة و في أي حالة يستعمل؟

2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استعمال
شبروكادرون محلول قطرات للعين في قارورة؟

3. كيف يستعمل شيبروكادرون محلول قطرات للعين في قارورة؟

١٣٦) الغير مرغوب فيها المحتملة؟

FRAKIDEX®

Phosphate sodique de dexaméthasone - Sulfate de framycétine

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Elle contient des informations importantes sur votre traitement et sur votre maladie.
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Pommade ophta

Les substances actives sont :

Dexaméthasone (phosphate sodique de)

Framycétine (sulfate de)

Les autres composants sont : vaseline et paraffine liquide.

TITULAIRE ET EXPLOITANT

Laboratoire CHAUVIN

416, rue Samuel Morse - 34000 Montpellier - France

Médicament autorisé n° 326 452-1

CLV Algérie n° 096/17D125/01

AMM Tunisie n° 5283073

FABRICANT

Laboratoire CH.

Z. I. Ripotier Hau

FRAKIDEX
Pom. Ophta. 5 g

ZENITH PHARMA
PPV: 20.80 DH
ADSP n° 02 DMP/21/NCI

AUBENAS - France

1. QU'EST-CE QUE FRAKIDEX, Pommade ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Tube de 5 g.

Ce médicament est une pommade ophtalmique contenant :

- un antibiotique de la famille des aminosides : la framycétine,
- et un corticoïde : la dexaméthasone.

Ce médicament est indiqué dans le traitement local de certaines inflammations et infections de l'œil et des paupières :

- après chirurgie de l'œil,
- dans des infections avec inflammation, dues à des bactéries pouvant être combattues par l'antibiotique contenu dans ce médicament.

2. INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT D'UTILISER FRAKIDEX, Pommade

Ne pas utiliser FRAKIDEX, Pommade dans les cas suivants :

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de la pommade, notamment à la framycétine (antibiotique de la famille des aminosides),
- Infection débutante de l'œil d'origine virale,
- Affection mycosique.

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ, sauf avis contraire de votre médecin :

- pendant la grossesse et l'allaitement,
- en association avec des médicaments pouvant donner certains troubles du rythme cardiaque (cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions).

Mises en garde

Ne pas avaler. En cas d'allergie, le traitement doit être arrêté.

Sur certains patients, ce médicament peut entraîner une augmentation de la pression intra-oculaire ou un retard de cicatrisation.

Il existe des situations particulières avec FRAKIDEX, Pommade. Ce médicament doit être évité chez le nouveau-né et l'enfant en raison d'une amélioration

Dicloced 1 mg/ml

Collyre en solution Diclofénac sodique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que DICLOCED 1 mg/ml, collyre en solution et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DICLOCED 1 mg/ml, collyre en solution ?
3. Comment utiliser DICLOCED 1 mg/ml, collyre en solution ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DICLOCED 1 mg/ml, collyre en solution ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE DICLOCED 1 mg/ml, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdiens (**AINS**) pour la voie ophthalmique.

Il est indiqué au cours de certaines interventions chirurgicales de l'œil et de leurs suites opératoires :

- inhibition du myosis (rétrécissement du diamètre de la pupille) dans la chirurgie de la cataracte,
- prévention des manifestations inflammatoires liées à la chirurgie de la cataracte et du segment antérieur de l'œil,
- traitement des manifestations douloureuses liées à la kératectomie photoréfractive (chirurgie correctrice de la myopie) au cours des 24 premières heures après l'opération.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS

A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DICLOCED 1 mg/ml, collyre en solution ?

N'utilisez jamais DICLOCED 1 mg/ml, collyre en solution :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au diclofénac sodique ou à l'un des autres composants contenus dans DICLOCED,
- si vous avez des antécédents d'allergie, d'urticaire (éruption cutanée avec démangeaisons), rhinite aigüe (gonflement et irritation de l'intérieur du nez) ou d'asthme déclenchés par la prise de ce collyre ou d'un médicament apparenté, notamment un autre anti-inflammatoire non stéroïdiens (**AINS**) ou l'aspirine.

• pré-opératoire : jusqu'à 5 fois 1 goutte dans les 3 heures ~~avant l'intervention~~.

Chirurgie
l'œil :

- pré-opératoire : 3 heures
- post-opératoire : l'intervention
- pend

Manifestations
kératiques
la myose

- pré-opératoire : 2 gouttes dans l'heure suivant l'intervention,
- post-opératoire : 2 gouttes dans l'heure suivant l'intervention, puis 4 gouttes dans les 24 heures suivant l'intervention.

Ne pas dépasser la posologie recommandée.

Enfants

Aucune étude spécifique n'a été réalisée.

Mode d'administration

Ce médicament doit être administré dans l'œil (voie ophthalmique).

Ne pas injecter, ne pas avaler.

Le collyre en solution ne doit pas être administré en injection péri ou intra-oculaire.

- ① Laver vous soigneusement les mains avant d'utiliser ce médicament.
- ② Eviter le contact de l'embout du flacon avec l'œil ou les paupières.
- ③ Instiller 1 goutte dans l'œil à traiter en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.
- ④ Reboucher le flacon après utilisation.

Si vous oubliez d'utiliser DICLOCED 1 mg/ml, collyre en solution :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DICLOCED 1 mg/ml, collyre en solution est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables suivant ont été rapportés :

Peu fréquent

(affectant moins de 1 patient sur 100) :

- Sensation de brûlure lors de l'instillation
- Troubles visuels lors de l'instillation

Rare (affectant moins de 1 patient sur 1000) :

- Réactions d'hypersensibilité, démangeaisons et rougeur
- Réaction de photosensibilité (réaction allergique après exposition au soleil)
- Kéратite ponctuée (lésion de la cornée), ulcères de la cornée, amincissement de la cornée
- Dyspnée (difficultés à respirer)
- Asthme aggravé

Autres effets indésirables rapportés

(mais la fréquence n'a pas pu être estimée) :

- Rhinite (gonflement et irritation de l'intérieur du nez)
- Hyper

DICLOCED 1 mg/ml

Collyre, Flacon de 10 ml - PPV : 68,00 DH



6 118001 101948

Distribué par COOPER PHARMA

41, rue Mohamed Diouri, Casablanca

Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

Larmabak 0,9 %

Collyre

Chlorure de sodium

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE LARMABAK 0,9 %, collyre ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LARMABAK 0,9 %, collyre ?
3. COMMENT UTILISER LARMABAK 0,9 %, collyre ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER LARMABAK 0,9 %, collyre ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE LARMABAK 0,9 %, collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Organe des sens (œil)

Suppléance lacrymale

Ce médicament est préconisé pour soulager les symptômes d'irritation liés à la sécheresse oculaire (quand il existe

l'insuffisance lacrymale le nécessitent. 1 ml de collyre contient 31 gouttes.

Mode d'administration

Voie ophthal

Pour une certaines prises :

- Se laver avant c

- Eviter le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières.

Instiller une goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival, en tirant légèrement la paupière inférieure et en regardant vers le haut.

Le temps d'apparition d'une goutte est plus long qu'avec un flacon de collyre classique.

Rebouchez le flacon après utilisation.

Fréquence d'administration

Repartir les instillations au cours de la journée, en fonction des besoins.

En moyenne, 3 à 4 instillations par jour et jusqu'à 8, si nécessaire.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, LARMABAK 0,9 %, collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Possibilité de légères irritations oculaires.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LARMABAK 0,9 %, collyre ?


Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser LARMABAK 0,9 %, collyre après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas conserver de flacon entamé au-delà de 8 semaines.

Les médicaments ne doivent pas



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

6200000
0038735

gsk

Zi Zinnat

CEFUROXIME

750 mg

250 mg, poudre pour solution
750 mg, poudre pour solution
1,5 g, poudre pour solution po

POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE
(I.M., I.V.)

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier(ère).
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier(ère). Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir la rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ZINNAT et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ZINNAT ?
3. Comment utiliser ZINNAT ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Composition :

Céfuroxime sodique

Quantité correspondant à
céfuroxime.....

750 mg

Pour un flacon de poudre.
Contient 42 mg de sodium par flacon.

GlaxoSmithKline Maroc
Ain El Aouda
Région de Rabat

PPV : 59 40 DH
ID : 642447

9 118001 141791



Dr. Amine IDRISI ALAMI

Spécialiste des maladies et chirurgies des yeux

- Lauréat de la Faculté de Médecine de Rabat et de Paris
- Ancien médecin au CHU Ibn Sina de Rabat
- Ancien Interne des hôpitaux de Paris

- Chirurgie de la cataracte • des paupières • Chirurgie réfractive
- Dacryo • Maladie de la rétine • Contactologie • OCT
- Angiographie • Laser • Topographie cornéenne



الدكتور أمين إدريسي علمي
اختصاصي في طب وجراحة العيون

- خريج كلية الطب بالرباط وباريس
- طبيب سابق بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط
- طبيب داخلي سابق بمستشفيات باريس
- جراحة عدسات العيون (خاللة) بالليزر • جراحة الجفون • تقويم النظر بالليزر
- المسالك الدمعية • أمراض الشبكة • العدسات اللاصقة
- تخطيط أنواع الشبكة • الليزر • تخطيط القرنية

Tanger 29 / 06 /2020

Note d'honoraire

Veuillez trouver note de honoraire de Mr. HAMRI Abdeslam pour

Cataracte

Cotation : K100

Montant total des honoraires : 8000.00 DH

Dr. Amine IDRISI ALAMI
Ophtalmologiste
115, Bd. Mohamed Ben Abdellah (Iberia)
30 ème étage, N° 15, Tanger
العنوان: 115، بول. محمد بن عبد الله (iberia)، الطابق 30، رقم 15 - تطعة
Tél: 05 39 33 63 64 / Gsm: 05 25 26 48

115, Bd Med Ben Abdellah (Iberia), 1^{er} étg. N° 4 - Tanger

05 39 33 63 64

alamiamineophtalmo@gmail.com

INPE : 161173703

Dr. Amine IDRISI ALAMI

Spécialiste des maladies et chirurgies des yeux

- Lauréat de la Faculté de Médecine de Rabat et de Paris
- Ancien médecin au CHU Ibn Sina de Rabat
- Ancien Interne des hôpitaux de Paris

- Chirurgie de la cataracte • des paupières • Chirurgie réfractive
- Dacryo • Maladie de la rétine • Contactologie • OCT
- Angiographie • Laser • Topographie cornéenne



الدكتور أمين إدريسي علمي
اختصاصي في طب وجراحة العيون

- خريج كلية الطب بباريس
- طبيب سابق بالمستشفي الجامعي ابن سينا بباريس
- طبيب داخلي سابق مستشفيات باريس

- جراحة عدسات العيون (حلاة) بالليزر • جراحة الجفون • تقويم النظر بالليزر
- المسالك الدمعية • أمراض الشبكة • العدسات الاصنفية
- تخطيط أوعية الشبكة • الليزر • تخطيط القرنية

Tanger 29/06/2020

Note d'honoraire

Veuillez trouver note de honoraire de Mr. HAMRI Abdeslam pour

Biométrie

Montant total des honoraires : 500.00 DH

Dr. Amine IDRISI ALAMI
Ophthalmologiste
115, Bd. Mohamed Ben Abdellah (Iberia)
3^{eme} étage, N° 15 - Tanger
Tunis - 15 33 63 04 / GSM: 06 25 25 26 48

115, Bd Med Ben Abdellah (Iberia), 1^{er} étg. N° 4 - Tanger

05 39 33 63 64

alamiamineophtalmo@gmail.com

INPE : 161173703

Tanger, le

30/06/2020

FACTURE DE CONSULTATION

Reçu de la somme de deux cent cinquante dirhams.

(250dhs) pour frais de Consultation Monsieur **HAMRI ABDESLAM**

Dr. JEDOUSSEI FESSER
Anesthésiste Qualifiée

CLINIQUE
CALIFORNIA
33, RUE ADOLFO FESSER
TANGER - 90004

Tanger, le
02/07/2020

Facture N° : 239/20

Nom et prénom : HAMRI ABDESLAM

N° Patente : 50277415

ICE : 001896834000027

IF : 4904026

INP : 16 00 61 479

Date d'entrée : 02/07/2020

Date de sortie : 02/07/2020

- Honoraires chirurgien K100.....3500,00

Inculant : Implant, viscoat cassette.....1200,00

Appareil phaco pince irrigation+ pince aspiration.....1400,00

Facture pharmacie spécialisée

- B.S.S.....	70,00
- Monofil 10/0.....	100,00
- Couteau 15°.....	60,00
- Champ à usage unique.....	70,00
- Aide opératoire.....	250,00

Frais clinique

- Salle d'opération.....	440,00
- O2.....	43,00
- Séjour.....	200,00
- Anesthésiste.....	350,00
- Pharmacie	317,00

Total général..... 8000,00

Détail Pharmacie


Gants 7/0.....	20,00
DIPRIVAN.....	80,00
Sérum salé.....	25,00
Sufanta.....	90,00
Intranul.....	10,00
Perfuseur.....	10,00
Esmiron.....	80,00
Seirngue 2cc.....	2,00

Arrêtée la présente facture à la somme de huit mille dirhams.

Réglée en espèce

**CLINIQUE
CALIFORNI A
33 RUE ADOLFO FESSER
TANGER-90004**

- Lauréat de la Faculté de Médecine de Rabat et de Paris
- Ancien médecin au CHU Ibn Sina de Rabat
- Ancien Interne des hôpitaux de Paris



- خريج كلية الطب بالرباط وباريس
- طبيب سابق بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط
- طبيب داخلي سابق مستشفيات باريس

- Chirurgie de la cataracte • des paupières • Chirurgie réfractive
- Dacryo • Maladie de la rétine • Contactologie • OCT
- Angiographie • Laser • Topographie cornéenne

- جراحة عدسات العيون (حالة) بالليزر • جراحة الجفون • تقويم النظر بالليزر
- المسلط الدمعية • أمراض الشبكة • العدسات اللاصقة
- تخطيط أوعية الشبكة • الليزر • تخطيط القرنية

COMPTE RENDU OPERATOIRE

Diagnostic : CATARACTE

Œil Opéré : GAUCHE

Chirurgien : DR AMINE IDRISI ALAMI

PATIENT : Mr. HAMRI Abdeslam

DATE : 02/07/2020

Acte : phaco émulsification œil GAUCHE avec mise en place d'un implant IOL

- Anesthésie locale
- Badigeonnage à la bétadine.
- Mise en place du blépharostat.
- Lavage des culs de sac conjonctivaux à la bétadine ophtalmique
- Incision cornéenne tunnelisée à 11h voie de service à 2h au couteau 15 degré
- Injection du visqueux dans la chambre antérieure.
- Capsulo rhéxis à la pince.
- Hydro dissection + mobilisation du noyau
- Phakoémulsification du noyau, Irrigation-aspiration des masses
- Injection de visqueux dans le sac capsulaire
- Mise en place d'un implant pliable 19 dioptries, dans le sac capsulaire
- Lavage du visqueux.
- Injection de 0.1 cc de Céfuroxime en intracaméruleaire
- Hydrosuture
- Traitement local