

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| O Réclamation | contact@mupras.com |
| O Prise en charge | pec@mupras.com |
| O Adhésion et changement de statut | adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS Société Anonyme Ben Abdellah - Siège social: Angèle Rue Mohamed Fakir ex Rue Aïal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca Maroc - Tél : 05 22 21 85 85 (55) Fax : 05 22 21 85 85 - www.mupras.ma



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-536557

ND: 34397

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5581 Société : R.A.M.
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : SENHATI ABDELLAH
 Date de naissance : 03-12-1977
 Adresse : Route de l'AL BOUSTANE 177 C3 Apt 15 Marrakech
 Tél : 0644714457 Total des frais engagés : 827,89 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. JAWAD KAHIB
Médecine et Echographie Gie.
Av. Prince My. Abdellah Imm. Ben Rais
Apt. 1 Marrakech
Tél. C: 43.32.33

Date de consultation : 10/05/2020
 Nom et prénom du malade : M. SENHATI ABDELLAH
 Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : Aff. chronique
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiqué à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Marrakech

Signature de l'adhérent(e) :



Médecine Générale
ECHOGRAPHIE GENERALE

الدكتور جمال رحيم
الطب العام
الفحص بالصدى الصوتي
خريج كلية الطب بالدار البيضاء
طب و أمراض الشيخوخة
من جامعة بوردو (فرنسا)

Marrakech, le

Sur Rendez-vous

110, 20 SEVEN HATS IN A JIE
 1) Kye chum → 7 Con
 1 → 2/1 x 5
 2) Jolkman 1000 →
 82, 10
 3) Kewer → 2, 3
 28, 10
 4) Vo Kral FW Fenn
 1 → 1/1 x 4
 46 8-3 1/2 hrs

Dr. ~~Abdellah~~ **KARIB**
Medecine et Echographie Gie.
Av. Prince My Abdellah Imm. Ben Rais
Appt 1 Marrakech
Tel.C: 43.32.93

شارع مولاي عبد الله (شارع أسفي سابقا) عمارة ابن الرايس شقة رقم 1 (قرب صيدلية القمودود)
 امبيكور) مراكش الهاتف: العيادة 05 24 43 32 33 المحمول: 06 66 10 28 83
 Av. Prince Moulay Abdellah, Imm. Ben Rais, Appt N°1 (près de la pharmacie Kaadoud)
 Tél.: Cabinet : 05 24 43 32 33 GSM : 06 66 10 28 83 - Patente N°: 45314568

Dr Jamal RAHIB
Médecine Générale
ECHOGRAPHIE GENERALE

Lauréat de la Faculté de Médecine de Casablanca
 DU de GERONTOLOGIE- GÉRIATRIE
 de l'université de Bordeaux (France)

الدكتور جمال رحيب
 الطب العام
 الفحص بالصدى الصوتي
 خريج كلية الطب بالدار البيضاء
 طب و أمراض الشيخوخة
 من جامعة بوردو (فرنسا)

Sur Rendez-vous

Marrakech, le

18/05/2022 مراكش

M. SEWASTI JADIE

38,00 x 2



ABDELATIF

1) C. Sinus Front

21 x 15



2) D. V. Sinus Lat

1 - 3

76,00

DR. CHRAÏBI KAADOUD JALILA
 PHARMACIE KAADOUD
 58 Imm. Ben Rais Lot Al Oumade
 Av. Prince My Abdellah Marrakech
 Tél.: 05 24 44 85 55

شارع مولاي عبد الله (شارع أسفي سابقا) عمارة ابن الرايس شقة رقم 1 (قرب صيدلية القعدود ومقهى
 امنيكور) مراكش الهاتف: العيادة 05 24 43 32 33 المحمول: 06 66 10 28 83
 Av. Prince Moulay Abdellah, Imm. Ben Rais, Appt N°1 (près de la pharmacie Kaadoud)
 Tél.: Cabi.net : 05 24 43 32 33 GSM : 06 66 10 28 83 - Patente N°: 45314568

CO-TRIM®
méthotazole - Triméthoprime

CO-TRIM® FORT

20 comprimés

PPV 38DH00

EXP 11/2023
LOT 90019 4

il correspondant à 20 cuillères mesure de 5 ml.

400 mg	1 comprimé
80 mg	
160 mg	
200 mg	
40 mg	
5 ml	

Par cuillère mes. de 5 ml

800 mg	1 comprimé
160 mg	
200 mg	
40 mg	
5 ml	

rostatites (CO-TRIM® Adulte et CO-TRIM® Fort),
unodiprimé :

nocytose. Dans ces cas, l'incidence de la toxoplasmose cérébrale semble également
sovent l'association triméthoprime-sulfaméthazole et le tolèrent pendant de longues

d'organe.

par rapport à d'autres produits, de l'épidémiologie et des résistances bactériennes

rim® nourrisson et enfant),
examinent traitement monodose de la cystite aiguë non compliquée de la femme de
tion bactériologique;

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

- chez les prématurés et les nouveau-nés.
- pendant l'allaitement si le nouveau-né a moins d'un mois.
- en cas d'allergie à l'un des composants de ce médicament (en particulier allergie aux sulfamides) et aux parabènes (suspension buvable).
- en cas de déficit en G6PD (glucose 6 phosphate déshydrogénase), y compris lorsque ce déficit concerne l'enfant allaité (présence du médicament dans le lait maternel) : risque de déclencher une destruction des globules rouges.
- en cas d'association avec un traitement par le méthotrexate.
- en cas de maladie du foie.
- en cas de déficit en glucose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).
- Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ :
- en période d'allaitement.
- en association avec la phénytoïne, les médicaments qui augmentent le potassium dans le sang.
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Mises en garde spéciales :
Les manifestations cutanées ou les modifications du bilan sanguin imposent l'arrêt immédiat du traitement.

Aussi, un bilan sanguin régulier est nécessaire :

- En cas de traitement de longue durée ou répété,
- Chez les personnes âgées de plus de 65 ans.
- Chez les personnes cancéreuses en folates.

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi :

PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN en cas d'insuffisance rénale, d'antécédents d'allergie à ce médicament ou aux antibiotiques, de maladie du foie, de maladie sanguine.

Un bilan sanguin doit être effectué en cas d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale et de problèmes sanguins antérieurement connus.

Une surveillance biologique (dosage du potassium dans le sang) est nécessaire chez certains patients (insuffisants rénaux, patients infectés par le VIH, patients recevant de fortes doses de ce médicament, sujets âgés).

En cas de diabète ou de régime pauvre en sucre, tenir compte d'un apport de 1,3 g de sucre par cuillère-mesure de suspension buvable (5 ml).

La suspension buvable contient 6,611 mg/5ml de sodium par cuillère-mesure :

A prendre en compte chez les patients contribuant leur apport alimentaire en sodium.

Il est conseillé de boire beaucoup d'eau (au moins 2 litres par jour) pendant le traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée en cas de traitement par le méthotrexate.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, et notamment avec la phénytoïne (médicament anti-convulsivant),

les médicaments qui augmentent le potassium dans le sang, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

CO-TRIM®
méthotazole - Triméthoprime

CO-TRIM® FORT

20 comprimés

PPV 38DH00

EXP 11/2023
LOT 90019 4

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

- chez les prématurés et les nouveau-nés ;
- pendant l'allaitement si le nouveau-né a moins d'un mois ;
- en cas d'allergie à l'un des composants de ce médicament (en particulier allergie aux sulfamides) et aux parabènes (Suspension buvable) ;
- en cas de déficit en G6PD (glucose 6 phosphate déshydrogénase), y compris lorsque ce déficit concerne l'enfant allaité (présence du médicament dans le lait maternel) : risque de déclencher une destruction des globules rouges ;
- en cas d'association avec un traitement par le méthotrexate ;
- en cas de maladie du foie ;
- Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ :
 - en période d'allaitement ;
 - en association avec la phénytoïne, les médicaments qui augmentent le potassium dans le sang ;

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Mises en garde spéciales :
Les manifestations cutanées ou les modifications du bilan sanguin surviennent plus fréquemment chez les personnes cancéreuses en folates. Les modifications du bilan sanguin surviennent plus fréquemment chez les personnes cancéreuses en folates. Aussi, un bilan sanguin régulier est nécessaire :
- En cas de traitement de longue durée ou répété ;
- Chez les personnes âgées de plus de 65 ans ;
- Chez les personnes cancéreuses en folates.

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi :

PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN en cas d'insuffisance rénale, d'antécédents d'allergie à ce médicament ou aux antibiotiques, de maladie du foie, de maladie sanguine.
Un bilan sanguin doit être effectué en cas d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale et de problèmes sanguins antérieurement connus. Une surveillance biologique (dosage du potassium dans le sang) est nécessaire chez certains patients (insuffisants rénaux, patients infectés par le VIH, patients recevant de fortes doses de ce médicament, sujets âgés).

En cas de diabète ou de régime pauvre en sucre, tenir compte d'un apport de 1,3 g de sucre par cuillère-mesure de suspension buvable (5 ml). La suspension buvable contient 6,611 mg/5ml de sodium par cuillère-mesure.

A prendre en compte chez les patients contribuant leur apport alimentaire en sodium.
Il est conseillé de boire beaucoup d'eau (au moins 2 litres par jour) pendant le traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée en cas de traitement par le méthotrexate.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, et notamment avec la phénytoïne (médicament anti-convulsivant), les médicaments qui augmentent le potassium dans le sang, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

il correspondant à 20 cuillères mesure de 5 ml.

400 mg
160 mg
80 mg
1 comprimé

800 mg
160 mg
80 mg
1 comprimé

Par cuillère mes. de 5 ml
200 mg
40 mg
5 ml

ostitites (CO-TRIM® Adulte et CO-TRIM® Fort),
unodiprimé :

sovent l'association triméthoprime-sulfaméthazole et le tolrrent pendant de longues

d'organe.

par rapport à d'autres produits, de l'épidémiologie et des résistances bactériennes

TRIM® nourrisson et enfant),
examinn traitement monodose de la cystite aiguë non compliquée de la femme de
ition bactériologique;

UT. AV. :

فوگالین 0,1%[®]
میتوبیمازین

- constipation,

hydroxybenzoat)

500 mg B410 & B20
750 mg B10

5 pellicules
(cuvette)

spécia avis de produits de médicaments
de la réité.

un doit, demandez plus d'information à votre
médicinal à votre pharmacien.

recueil. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre,
ou si vous remarquez un effet indésirable non
habituel, consultez votre médecin.

2002-2023
01-2023
140-2023

250, 500 ou 750 mg

comprimé pellicule

calcium microcristallin, zalcosine, aspartate de

de l'acide, les propriétés de l'acide, PEG 6000.

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

300 mg, 300 mg, 300 mg

يمكن أن يسبب اصفرار الجلد وتحول لون البول إلى

CODE No. : HPDRUGS/MNB/95/2

PPV : 86DH90

169, Avenue Hassan 1er, 20070, Casablanca
SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LTD
Importe par :
Dist. Sirmour - 173, 028 Himachal Pradesh, Inde
Village Ganguwale, Tehsil Poonia Sahib,
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED
Fabrique par :

Tableau C (Liste II)

احترام الجرعات الموصى بها
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Medicament Autorisé N°: 393/150MP/21/NTT

محتوى هذه الحقنة يتمثل في تناول هذا الدواء.

حافظ على هذه الحقنة. قد تحتاج لقرعتها من جديد في وقت لاحق.

إن كان لديك أي أسئلة أو انتابك أي شك، المرجو استشارة الطبيب أو الصيدلي قصد الحصول على المزيد من المعلومات.

تم وصف هذا الدواء لك شخصيا. لذا لا تعطيه لأي شخص آخر حتى في حال تطبيق الأعراض لأنه قد يضر به.

في حال ازدياد شدة التأثيرات غير المرغوب فيها أو لاحظت تأثيرات غير مرغوب فيه لم تذكر في هذه النشرة، الرجاء إبلاغ طبيبك أو الصيدلي.

1. تركيبة الدواء

يحتوي كل قرص مقاوم لحموضة المعدة على 20 ملغ أو 40 ملغ من المادة الفعالة: إزوميرازول (على شكل إزوميرازول المغنيزيوم).

المكونات الأخرى : الكرات السكرية، هيدروكسي بروبيل- السيلولوز (HPC-L)، كروسبوفيدون (PPXL-10)، بوفيدون (PVP K-30)، ماكروغل 400، تلك منفى، هيروميلوز فالات (HP-55S)، هيروميلوز فالات (HP-50)، ثنائي تيل فالات، ماكروغل 6000، سيلولوز الميكروكريستالين PH112، الكروسبوفيدون (PPXL)، فومارات ستيريل الصوديوم، أوبادي بني 03B86651، ماكروغل 4000، كحول أيزوبروبيليك، الأميتون، كلوريد الميثيلين، الماء المنقى.

قائمة الساعات ذات تأثيرات معروفة : السكراروز (الكرات السكرية).

2. الفعالية العلاجية

يحتوي راسبيبر® على مادة فعالة تسمى إزوميرازول. ينتمي هذا الدواء إلى فئة مضبطات مضخة البروتون. فهو يقلل من إفراز الحمض في المعدة.

3. الإرشادات العلاجية

يستعمل راسبيبر® 20 ملغ، أقراص مقاومة لحموضة المعدة لعلاج الأمراض التالية :
باللغين والأطفال بدءا من 12 سنة فأكثر

· الارتجاع المعدي المريئي عند صعود حمض المعدة إلى المريء وتسببه في الألم والالتهاب والقرحة،

· قرحة المعدة أو الاثني عشر في حال الإصابة بجرثومة تدعى هيليكوباكتر بيلوري. إذا تطبقت عليك هذه الحالة، قد يصف لك الطبيب أيضا بعض المضادات الحيوية لعلاج هذا

تأثيرات غير مرغوب فيها قد تارة (يمكن أن تظهر لدى شخص واحد من بين 10000 شخص)

· تغير في عدد خلايا الدم بما في ذلك ندرة المحببات (نقص في عدد الكريات البيضاء).

· عدوانية.

· هوس بصري، أو حمية أو سمية.

· اضطراب أبات كبدية شديدة مما يؤدي إلى فشل كبدى والتهاب في الدماغ.

· ظهور مفاجئ لطغخ جلدي شديد، وبثور أو تقشير كثيف للجلد (رود فعل على شكل قعاعات) يصاحبه حمى وآلام في المفاصل (حمى متعددة الأشكال، متلازمة ستيفن جونسون، انحلال البشرة السمي)

· ضعف العضلات.

· مشاكل حادة في الكلى.

· انتفاخ الثديين لدى الرجال.

تأثيرات غير مرغوب فيها ذات تردد غير معروف (لا يمكن تقدير التردد في ظل البيانات المتاحة).

· إذا كنت تتناول راسبيبر® 20 ملغ و 40 ملغ، أقراص مقاومة لحموضة المعدة، لأكثر من ثلاث أشهر، يمكن أن تنخفض مستويات المغنيزيوم في الدم. يمكن لانخفاض مستويات المغنيزيوم أن يؤدي إلى تعب، ارتعاش العضلات، ارتباك، تشنجات، دوخة، تسارع ضربات القلب. إذا كنت تعاني من أحد هذه الأعراض، الرجاء إبلاغ طبيبك فوراً. يمكن لانخفاض مستويات المغنيزيوم أن يؤدي أيضا إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم أو الكالسيوم في الدم. قد يقرر طبيبك إجراء اختبارات الدم بانتظام لمراقبة مستويات المغنيزيوم لديك.

· التهاب الأمعاء (الذي يؤدي إلى الإسهال)

يمكن لراسبيبر® في حالات نادرة جدا أن يؤثر على خلايا الدم البيضاء مما يؤدي إلى نقص المناعة. يجب عليك استشارة طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعاني من هذه الأعراض مثل الحمى المصحوبة بالتهبت الشديد، أو الحمى المصحوبة بأعراض العدوى الموضعية مثل الألم في الرقبة والحنك، والحمى أو صعوبة في التبول. إذا برزت لديك هذه الأعراض، يمكن استبعاد الإصابة بنقص في خلايا الدم البيضاء (ندرة المحببات) بواسطة فحص الدم. من المهم أن توفر المعلومات حول الأدوية التي تتناولها في هذه الحالة.

لا يجب اللق حبال هذه القائمة التي تضم التأثيرات الغير مرغوب فيها المحتملة لأنه لا يظهر لك أي تأثير منها.

في حال لاحظت بروز تأثيرات غير مرغوب فيها لم يتم الإشارة إليها بهذه النشرة، أو ازادت شدة بعض التأثيرات الغير مرغوب فيها، المرجو إبلاغ طبيبك أو الصيدلي بذلك.

Dr Jamal RAHIB
Médecine Générale
ECHOGRAPHIE GENERALE

Lauréat de la Faculté de Médecine de Casablanca

الدكتور جمال رحيب
 الطب العام
 الفحص بالصدى الصوتي
 خريج كلية الطب بالدار البيضاء

Sur Rendez-vous

Marrakech, le

15 MAI 2020

مراكش في

M/SEN H A S I O U A D E
 ABDELLATIF.

1) E C B ✓

2) u u u

3) u u u u u u u

4) P S A R

Dr. Jamal RAHIB
 Médecine Générale
 Echographie Générale
 Imm. Prince Moulay Abdellah, Appt N°1

Dr. BOURRIQUAIAT Saïd
 Pharmacie Laboratoire
 YACOB EL
 31, Av. Yacoub El
 Tël: 05 24 44 33 33

شارع مولاي عبد الله (شارع أسفي سابقا) عقار من 10 م 10 م قرب صيدلية القعدود ومقهى

امنكور) مراكش الهاتف: العيادة 33 32 43 06 66 10 28 83 : اعطول

Av. Prince Moulay Abdellah, Imm. Ben Rais, Appt N°1 (près de la pharmacie Kaadoud)

Tél.: Cabinet : 05 24 43 32 33 GSM : 06 66 10 28 83 - Patente N°: 45314568

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YACOUB EL MANSOUR

31, Avenue Yacoub El Mansour - MARRAKECH - Tél: 0524 44 70 60

Fax: 0524 43 78 99

BOURRIOUAIAT S.

Pharmacien Biologiste

IDENTIFIANT FISCAL UNIQUE: 69100750
PATENTE 45304015 RC : 40434

CNSS 1195313

INP 073002636

ICE 001527687000052



073002636

FACTURE N°: 850518016

Marrakech, le 18/05/20

Mr SENHAJI OUADIE ABDELLATIF

15-LOT ELBOUSTANE C3

ROUIDATE-MARRAKECH

Prescripteur: DR RAHIB JAMAL

NATURE DES EXAMENS:

ANALYSES CODE COTATION

EXAMEN CYTO-BACTERIO 0000 B150

TOTAL DOSSIER : 201,00 DH

P A Y E E : DH

REGLEMENT :

1 : ESPECE

2 : BANQUE

PAYE

RESULTATS EN LIGNE

Demandez votre login et mot de passe au secrétariat.

Dr. BOURRIOUAIAT Saloua
Pharmacien Biologiste
YACOUB EL MANSOUR
31, Av Yacoub El Mansour
Guéliz - Marrakech
Tél: 05 24 44 70 60 - Fax: 05 24 43 78 99

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YACOUB EL MANSOUR

31, Avenue Yacoub El Mansour - MARRAKECH - Tél: 0524 44 70 60
Fax: 0524 43 78 99

BOURRIOUAIAT S.

Pharmacien Biologiste

IDENTIFIANT FISCAL UNIQUE: 69100750
PATENTE 45304015 RC : 40434

CNSS 1195313
INP 073002636
ICE 001527687000052



073002636

FACTURE N°: 850518015

Marrakech, le 18/05/20

Mr SENHAJI ABDELLATIF
15-LOT ELBOUSTANE C3
ROUIDATE-MARRAKECH

Prescripteur: DR RAHIB JAMAL

NATURE DES EXAMENS:

ANALYSES	CODE	COTATION
UREE	0000	B30
CREATININE	0000	B30

TOTAL DOSSIER : 80,40 DH

P A Y E E : DH

REGLEMENT :

PAYE

1 : ESPECE
2 : BANQUE

RESULTATS EN LIGNE
Demandez votre login et mot de passe au secrétariat.

Dr. BOURRIOUAIAT Saloua
Pharmacien Laboratoire
YACOUB EL MANSOUR
31, Avenue Yacoub El Mansour
Guéliz - Marrakech
Tél: 05 24 44 70 60 - Fax: 05 24 43 78 99