

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier du Hortage
Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-545351

ND: 34090

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11463 Société : Royal Air Maroc

☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : DABBI KHAL

Date de naissance : 14/07/1975

Adresse : 11, rue Ibn Roumi Farah 1 Sottat

Tél : 0661766475 Total des frais engagés : # 2024.02# Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : M. DABBI KHAL Agé : 1975

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

[Signature]



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Medecin attestant le Paiement des Actes
8/07/2020	G		250,00	091152397 NUTRITION 293 Bd. Abdelmeoumen 2eme Etage Tel : 05 22 46 00 00


EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIEN ASMOUN Samir Docteur en Pharmacie 2, Rue ASSALAM Hay Al Houde BERRECHID	08/07/2008	Montant de la Facture 1296,00 05 22 32 84 24

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des honoraires
		PARA SAMALI 48 RUE QUED MALWIA LOT BOURAHAL BERRECHID Tel: 05 22 32 61 19	

[illegible]

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



	H	
25533412		21433552
00000000		00000000
D		G
00000000		00000000
35533411		11433553
	B	

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Otman TAZI

Ancien Médecin Interne des Hôpitaux de Toulouse-France au Service
d'Endocrinologie et Maladies Métaboliques

Diplôme en Pathologie Hypothalamo Hypophysaire

Diplôme en Diabétologie

Diplôme en Nutrition Appliquée

Capacité de Traitement par Pompe à Insuline

Diplôme en Echographie

Holter Glycemique

PHARMACIE ANAFAT
ASMOUN Samir
Docteur en Pharmacie
2 Rue ASSALAM Hay Al Houda
BERRECHID
Tél : 05 22 32 84 94

Casablanca le, 08/07/2020

Mr DAHBI Kamal

2x 647,00

NovoRapid Flexpen

14 ui - 16 ui - 14 ui



LANTUS Solostar

36 ui le soir

120,00x4 Bandelettes

3 contrôles par jour

Traitement pour 03 mois

PHARMACIE ANAFAT
ASMOUN Samir
Docteur en Pharmacie
2 Rue ASSALAM Hay Al Houda
BERRECHID
Tél : 05 22 32 84 94

293 Bd. Abdelmoumen, Imm. Marjana, 2ème Etage, Appt. N°4 - Casablanca
Tél : 05 22 86 56 34 / 0522 86 41 90 - GSM : 0672 24 33 33

PHARMACIE ANAFAT
ASMOUN Samir
Docteur en Pharmacie
2 Rue ASSALAM Hay Al Houda
BERRECHID
Tél : 05 22 32 84 94

T 480,00

PARA SAMLALI
48 RUE OUED DALWIA LOT BOURAHAL
BERRECHID
Tél : 05 22 32 61 19

Sté PARA SAMLALI

Parapharmacie & produits cosmétiques

ICE :000091962000032

CLIENT : DAHBI KAMAL

08/07/2020

Désignation	Qté	P.U	Total
BANDELETTES ON CALL PLUS 50U	4	120.00	480.00

Montant TTC : 480.00

Dont TVA 20% : 80.00

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE : quatre cent quatre vingt dhs



On-Call[®] Plus

Blood Glucose Packaging

REF G133-111,	REF G133-112,	REF G133-114
REF G133-118,	REF G133-119,	REF G133-211

PRINCIPLE AND INTENDED USE

The *On Call[®] Plus* Blood Glucose Test Strips are thin strips with a glucose oxidase enzyme. They work with the *On Call[®] Plus* or *On Call[®] EZ II* Blood Glucose Meters. Blood is applied to the end of the strip, and the glucose is automatically absorbed into the reaction cell where the reaction produces an electrical current. The electrical current is formed during the reaction and the blood glucose concentration is based on the electrical current detected by the meter, then the result is displayed. The meters are calibrated to display plasma-like concentrations. For *in vitro* diagnostic use. Test strips are to be used only outside the home. For self-testing and professional use.

COMPOSITION

Each test strip contains the following reactive chemicals: Glucose oxidase < 25 mg/g
Each test strip vial contains a drying agent.

STORAGE AND HANDLING

- Test strips should be stored in their protective vial. The vial's cap must be tightly closed. This is to keep the test strips in good working condition.
- Store test strips in a cool, dry place at room temperature, 2-35°C (36-95°F). Store them away from heat and direct sunlight.
- Do not freeze or refrigerate.
- To ensure accurate results, use the test strips at room temperature.
- Do not store the test strips outside their protective vial. Test strips must be stored in the original vial with the cap tightly closed.
- Do not store or use the test strips in a humid place such as a bathroom.
- Do not store the meter, the test strips or control solution near bleach or cleaners that contain bleach.
- Do not transfer the test strips to a new vial or any other container.
- Replace the vial cap immediately after removing a test strip.
- Use the test strip immediately after removing it from the vial.
- Do not use your test strips past the unopened expiration date printed on the vial. Using test strips past the expiration date may produce incorrect test results.

Note: All expiration dates are printed in Year-Month format. 2018-01 means January 2018. Use a new vial of test strips for only 6 months after opening. The opened vial expiration date is 6 months after the vial was first opened. Write the opened vial expiration date on the vial label after you open it.

PRECAUTIONS

©2017 ACON Laboratories, Inc.



INFO PHARMA

10, Rue Boulmane Bourgogne
Casablanca 20040 Morocco
Tel: + 212 5 22 22 34 07
+ 212 5 22 22 12 55
Fax: + 212 5 22 47 45 92

strip vial, DO NOT use the system to test your blood glucose. If you cannot correct the problem, contact your healthcare professional.

LIMITATIONS

- The *On Call[®] Plus* and *On Call[®] EZ II* meters are not intended for use with the *On Call[®] Plus* and *On Call[®] EZ II* Blood Glucose Test Strips. They have been tested and proven to work together for accurate measurements. Do not use components from other meters.
- Use only with whole blood. Do not use with plasma or serum.
- Do not use for testing neonates.
- Very high (above 60%) and very low (below 40%) hemoglobin levels may affect results.
- Abnormally high levels of vitamin C and other substances may affect blood glucose measurements.
- The system is tested to accurately read the range of 1.1-33.3 mmol/L (20 - 600 mg/dL). Results outside this range may be inaccurate.
- Fatty substances (triglycerides) up to 3,000 mg/dL may affect blood glucose test results.
- The *On Call[®] Plus* and *On Call[®] EZ II* Blood Glucose Test Strips are not intended for use and shown to work properly up to 10,000 f.
- Severely ill persons should not run the glucose test.
- Blood samples from patients in shock, on

On-Call[®] Plus

Blood Glucose Packaging

REF G133-111,	REF G133-112,	REF G133-114
REF G133-118,	REF G133-119,	REF G133-211

PRINCIPLE AND INTENDED USE

The *On Call[®] Plus* Blood Glucose Test Strips are thin strips with a glucose oxidase enzyme. They work with the *On Call[®] Plus* or *On Call[®] EZ II* Blood Glucose Meters. Blood is applied to the end of the strip, and the glucose is automatically absorbed into the reaction cell where the reaction produces an electrical current. The electrical current is formed during the reaction and the blood glucose concentration is based on the electrical current detected by the meter, then the result is displayed. The meters are calibrated to display plasma-like concentrations. For *in vitro* diagnostic use. Test strips are to be used only outside the home. For self-testing and professional use.

COMPOSITION

Each test strip contains the following reactive chemicals: Glucose oxidase < 25 mg/g
Each test strip vial contains a drying agent.

STORAGE AND HANDLING

- Test strips should be stored in their protective vial. The vial's cap must be tightly closed. This is to keep the test strips in good working condition.
- Store test strips in a cool, dry place at room temperature, 2-35°C (36-95°F). Store them away from heat and direct sunlight.
- Do not freeze or refrigerate.
- To ensure accurate results, use the test strips at room temperature.
- Do not store the test strips outside their protective vial. Test strips must be stored in the original vial with the cap tightly closed.
- Do not store or use the test strips in a humid place such as a bathroom.
- Do not store the meter, the test strips or control solution near bleach or cleaners that contain bleach.
- Do not transfer the test strips to a new vial or any other container.
- Replace the vial cap immediately after removing a test strip.
- Use the test strip immediately after removing it from the vial.
- Do not use your test strips past the unopened expiration date printed on the vial. Using test strips past the expiration date may produce incorrect test results.

Note: All expiration dates are printed in Year-Month format. 2018-01 means January 2018. Use a new vial of test strips for only 6 months after opening. The opened vial expiration date is 6 months after the vial was first opened. Write the opened vial expiration date on the vial label after you open it.

PRECAUTIONS

©2017 ACON Laboratories, Inc.



INFO PHARMA

10, Rue Boulmane Bourgogne
Casablanca 20040 Morocco
Tel: + 212 5 22 22 34 07
+ 212 5 22 22 12 55
Fax: + 212 5 22 47 45 92

strip vial, DO NOT use the system to test your blood glucose. If you cannot correct the problem, contact your healthcare professional.

LIMITATIONS

- The *On Call[®] Plus* and *On Call[®] EZ II* meters are not intended for use with the *On Call[®] Plus* and *On Call[®] EZ II* Blood Glucose Test Strips. They have been tested and proven to work together for accurate measurements. Do not use components from other meters.
- Use only with whole blood. Do not use with plasma or serum.
- Do not use for testing neonates.
- Very high (above 60%) and very low (below 40%) hemoglobin levels may affect results.
- Abnormally high levels of vitamin C and other substances may affect blood glucose measurements.
- The system is tested to accurately read the range of 1.1-33.3 mmol/L (20 - 600 mg/dL). Results outside this range may be inaccurate.
- Fatty substances (triglycerides) up to 3,000 mg/dL may affect blood glucose test results.
- The *On Call[®] Plus* and *On Call[®] EZ II* Blood Glucose Test Strips are not intended for use and shown to work properly up to 10,000 f.
- Severely ill persons should not run the glucose test.
- Blood samples from patients in shock, on

On-Call[®] Plus

Blood Glucose Packaging

REF G133-111,	REF G133-112,	REF G133-114
REF G133-118,	REF G133-119,	REF G133-211

PRINCIPLE AND INTENDED USE

The *On Call[®] Plus* Blood Glucose Test Strips are thin strips with a glucose oxidase enzyme. They work with the *On Call[®] Plus* or *On Call[®] EZ II* Blood Glucose Meters. Blood is applied to the end of the strip, and the glucose is automatically absorbed into the reaction cell where the reaction produces an electrical current. The electrical current is formed during the reaction and the blood glucose concentration is based on the electrical current detected by the meter, then the result is displayed. The meters are calibrated to display plasma-like concentration. For *in vitro* diagnostic use. Test strips are to be used only outside the home. For self-testing and professional use.

COMPOSITION

Each test strip contains the following reactive chemicals: Glucose oxidase < 25 mg/g
Each test strip vial contains a drying agent.

STORAGE AND HANDLING

- Test strips should be stored in their protective vial. The vial's cap must be tightly closed. This is to keep the test strips in good working condition.
- Store test strips in a cool, dry place at room temperature, 2-35°C (36-95°F). Store them away from heat and direct sunlight.
- Do not freeze or refrigerate.
- To ensure accurate results, use the test strips at room temperature.
- Do not store the test strips outside their protective vial. Test strips must be stored in the original vial with the cap tightly closed.
- Do not store or use the test strips in a humid place such as a bathroom.
- Do not store the meter, the test strips or control solution near bleach or cleaners that contain bleach.
- Do not transfer the test strips to a new vial or any other container.
- Replace the vial cap immediately after removing a test strip.
- Use the test strip immediately after removing it from the vial.
- Do not use your test strips past the unopened expiration date printed on the vial. Using test strips past the expiration date may produce incorrect test results.

Note: All expiration dates are printed in Year-Month format. 2018-01 means January 2018.
• Use a new vial of test strips for only 6 months after opening. The opened vial expiration date is 6 months after the vial was first opened. Write the opened vial expiration date on the vial label after you open it.

PRECAUTIONS

©2017 ACON Laboratories, Inc.



INFO PHARMA

10, Rue Boulmane Bourgogne
Casablanca 20040 Morocco
Tel: + 212 5 22 22 34 07
+ 212 5 22 22 12 55
Fax: + 212 5 22 47 45 92

strip vial, DO NOT use the system to test your blood glucose. If you cannot correct the problem, contact your healthcare professional.

LIMITATIONS

- The *On Call[®] Plus* and *On Call[®] EZ II* meters are not intended for use with the *On Call[®] Plus* and *On Call[®] EZ II* Blood Glucose Test Strips. They have been tested and proven to work together for accurate measurements. Do not use components from other meters.
- Use only with whole blood. Do not use with plasma or serum.
- Do not use for testing neonates.
- Very high (above 60%) and very low (below 40%) hemoglobin levels may affect results.
- Abnormally high levels of vitamin C and other substances may affect blood glucose measurements.
- The system is tested to accurately read the range of 1.1-33.3 mmol/L (20 - 600 mg/dL).
- Fatty substances (triglycerides) up to 3,000 mg/dL may affect blood glucose test results.
- The *On Call[®] Plus* and *On Call[®] EZ II* Blood Glucose Test Strips are shown to work properly up to 10,000 f.
- Severely ill persons should not run the glucose test.
- Blood samples from patients in shock, on

On-Call[®] Plus

Blood Glucose Packaging

REF G133-111,	REF G133-112,	REF G133-114
REF G133-118,	REF G133-119,	REF G133-211

PRINCIPLE AND INTENDED USE

The *On Call[®] Plus* Blood Glucose Test Strips are thin strips with a glucose oxidase enzyme. They work with the *On Call[®] Plus* or *On Call[®] EZ II* Blood Glucose Meters. Blood is applied to the end of the strip, and the glucose is automatically absorbed into the reaction cell where the reaction produces an electrical current. The electrical current is formed during the reaction and the blood glucose concentration is based on the electrical current detected by the meter, then the result is displayed. The meters are calibrated to display plasma-like concentration. For *in vitro* diagnostic use. Test strips are to be used only outside the home. For self-testing and professional use.

COMPOSITION

Each test strip contains the following reactive chemicals: Glucose oxidase < 25 mg/g
Each test strip vial contains a drying agent.

STORAGE AND HANDLING

- Test strips should be stored in their protective vial. The vial's cap must be tightly closed. This is to keep the test strips in good working condition.
- Store test strips in a cool, dry place at room temperature, 2-35°C (36-95°F). Store them away from heat and direct sunlight.
- Do not freeze or refrigerate.
- To ensure accurate results, use the test strips at room temperature.
- Do not store the test strips outside their protective vial. Test strips must be stored in the original vial with the cap tightly closed.
- Do not store or use the test strips in a humid place such as a bathroom.
- Do not store the meter, the test strips or control solution near bleach or cleaners that contain bleach.
- Do not transfer the test strips to a new vial or any other container.
- Replace the vial cap immediately after removing a test strip.
- Use the test strip immediately after removing it from the vial.
- Do not use your test strips past the unopened expiration date printed on the vial. Using test strips past the expiration date may produce incorrect test results.

Note: All expiration dates are printed in Year-Month format. 2018-01 means January 2018. Use a new vial of test strips for only 6 months after opening. The opened vial expiration date is 6 months after the vial was first opened. Write the opened vial expiration date on the vial label after you open it.

PRECAUTIONS

©2017 ACON Laboratories, Inc.



INFO PHARMA

10, Rue Boulmane Bourgogne
Casablanca 20040 Morocco
Tel: + 212 5 22 22 34 07
+ 212 5 22 22 12 55
Fax: + 212 5 22 47 45 92

strip vial, DO NOT use the system to test your blood glucose. If you cannot correct the problem, contact your healthcare professional.

LIMITATIONS

- The *On Call[®] Plus* and *On Call[®] EZ II* meters are not intended for use with *On Call[®] Plus* and *On Call[®] EZ II* Blood Glucose Test Strips. They are tested and proven to work together for accurate glucose measurements. Do not use components from other brands.
- Use only with whole blood. Do not use with plasma or serum.
- Do not use for testing neonates.
- Very high (above 60%) and very low (below 40%) glucose levels may affect the accuracy of the results.
- Abnormally high levels of vitamin C and other substances may affect the blood glucose measurements.
- The system is tested to accurately read the range of 1.1-33.3 mmol/L (20 - 600 mg/dL).
- Fatty substances (triglycerides) up to 3,000 mg/dL may have a major effect on blood glucose test results.
- The *On Call[®] Plus* and *On Call[®] EZ II* Blood Glucose Test Strips are shown to work properly up to 10,000 ft.
- Severely ill persons should not run the glucose test.
- Blood samples from patients in shock, on dialysis, or with severe anemia may not be accurate.

NovoRapid® FlexPen®

100 U/ml,
Solution injectable en stylo prérempli

Insuline asparte

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si un quelconque effet indésirable devient sérieux ou si vous ressentez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien.

1. Qu'est-ce que NovoRapid® et dans quel cas est-il utilisé ?

NovoRapid® est une insuline moderne (analogue de l'insuline) d'action rapide. Les insulines modernes sont des versions améliorées de l'insuline humaine.

NovoRapid® est utilisé pour le traitement du diabète chez les adultes, les adolescents et les enfants à partir de 1 an. Le diabète est une maladie au cours de laquelle votre organisme ne produit pas assez d'insuline pour contrôler votre taux de sucre dans le sang.

NovoRapid® commence à faire baisser votre taux de sucre dans le sang 10 à 20 minutes après l'injection, son effet maximum apparaît 1 à 3 heures après l'injection et l'effet dure de 3 à 5 heures. En raison de sa courte durée d'action, NovoRapid® doit normalement être associé à des insulines d'action intermédiaire ou d'action prolongée. De plus, NovoRapid® peut être utilisé par perfusion continue à l'aide



► Si vous partez
horaires entre
insuline et les
consulter votre

NovoRapid® FlexPen®
100U/ml
Solution injectable
5 stylos pré-remplis de 3ml
PPV : 647 DH

iges

ge.

Autres médi

Certains médicaments
glucose agit sur le
d'insuline. Les pri
fier votre traiteme



dose
odi-

Informez votre médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris des médicaments, y compris ceux obtenus sans prescription. En particulier, vous devriez aviser votre médecin si vous prenez l'un des médicaments énumérés ci-dessous qui peuvent avoir un impact sur votre taux de glycémie.

Votre taux de sucre dans le sang peut diminuer (hypoglycémie) si vous prenez :

Antidiabétiques oraux, Inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO), Bêta-bloquants, Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), Salicylés, Stéroïdes anabolisants, Sulfamides.

Votre taux de sucre dans le sang peut augmenter (hyperglycémie) si vous prenez :

Contraceptifs oraux, Thiazidiques, Glucocorticoïdes, Hormones thyroïdiennes, Sympathomimétiques, Hormone de croissance, Danazol.

L'octréotide et le lanréotide peuvent augmenter ou diminuer votre taux de sucre dans le sang.

Les bêta-bloquants peuvent atténuer ou supprimer entièrement les premiers symptômes annonciateurs qui vous aident à reconnaître un faible taux de sucre dans le sang.

Thiazolidinediones (classe d'antidiabétiques oraux

NovoRapid® FlexPen®

100 U/ml,
Solution injectable en stylo prérempli

Insuline asparte

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si un quelconque effet indésirable devient sérieux ou si vous ressentez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien.

1. Qu'est-ce que NovoRapid® et dans quel cas est-il utilisé ?

NovoRapid® est une insuline moderne (analogue de l'insuline) d'action rapide. Les insulines modernes sont des versions améliorées de l'insuline humaine.

NovoRapid® est utilisé pour le traitement du diabète chez les adultes, les adolescents et les enfants à partir de 1 an. Le diabète est une maladie au cours de laquelle votre organisme ne produit pas assez d'insuline pour contrôler votre taux de sucre dans le sang.

NovoRapid® commence à faire baisser votre taux de sucre dans le sang 10 à 20 minutes après l'injection, son effet maximum apparaît 1 à 3 heures après l'injection et l'effet dure de 3 à 5 heures. En raison de sa courte durée d'action, NovoRapid® doit normalement être associé à des insulines d'action intermédiaire ou d'action prolongée. De plus, NovoRapid® peut être utilisé par perfusion continue à l'aide



► Si vous partez
horaires entre
insuline et les
consulter votre

NovoRapid® FlexPen®
100U/ml
Solution injectable
5 stylos pré-remplis de 3ml
PPV : 647 DH

iges

ge.

Autres médicaments

Certains médicaments
glucose agit sur votre
d'insuline. Les prendre
fier votre traitement



dose
odi-

Informez votre médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris des médicaments, y compris ceux obtenus sans prescription. En particulier, vous devriez aviser votre médecin si vous prenez l'un des médicaments énumérés ci-dessous qui peuvent avoir un impact sur votre taux de glycémie.

Votre taux de sucre dans le sang peut diminuer (hypoglycémie) si vous prenez :

Antidiabétiques oraux, Inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO), Bêta-bloquants, Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), Salicylés, Stéroïdes anabolisants, Sulfamides.

Votre taux de sucre dans le sang peut augmenter (hyperglycémie) si vous prenez :

Contraceptifs oraux, Thiazidiques, Glucocorticoïdes, Hormones thyroïdiennes, Sympathomimétiques, Hormone de croissance, Danazol.

L'octréotide et le lanréotide peuvent augmenter ou diminuer votre taux de sucre dans le sang.

Les bêta-bloquants peuvent atténuer ou supprimer entièrement les premiers symptômes annonciateurs qui vous aident à reconnaître un faible taux de sucre dans le sang.

Thiazolidinediones (classe d'antidiabétiques oraux