

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

itions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 0042928 /

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2725

Société :

36798

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 01/07/2017

Nom et prénom du malade : D. H. El F. El F.

Age :

Lien de parenté :

☒ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14/02/20				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE JERRADA 61, Bd Abderrahim Bouabid Oasis Casablanca Tél: 0522 23 84 49 / 05 22 84 47 20	14/2/20	1188,90

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient																						
				COEFFICIENT DES TRAVAUX																					
				MONTANTS DES SOINS																					
				DEBUT D'EXECUTION																					
				FIN D'EXECUTION																					
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			H			25533412	21433552		00000000	00000000		D		G	00000000	00000000		35533411	11433553		B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
H																									
25533412	21433552																								
00000000	00000000																								
D		G																							
00000000	00000000																								
35533411	11433553																								
B																									
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS																					
				DATE DU DEVIS																					
				DATE DE L'EXECUTION																					

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur MIKOU Abdelhaq

Diplômé de la faculté de
Médecine de Toulouse
Spécialiste en
Endocrinologie - Diabète
Maladies de la nutrition

Obésité - Maigreux - Maladies du Cholestérol
- Goitre -

Sur Rendez-vous

Membre de :

- SFD
- EASD
- MGSD

Société Francophone du Diabète
Association Européenne pour l'Etude du Diabète
Groupe Méditerranéen pour l'Etude du Diabète

PHARMACIE JERRADA
61, Bd Abderrahim Bouabid
Oasis - Casablanca
Tél: 0522.23.54.49 / 05.22.99.47.20

الدكتور ميكو عبد الحق

خريج كلية الطب بتولوز

اختصاصي في

أمراض الغدد، مرض السكر

السمنة و أمراض الكوليسترول
بالموعد

Casablanca, le 1.4.2020

425.00
DARFI El Khachou
Total 1188.90
5x85.00
Zacharie Zumbir Dix
2006.00
20.80
1006.00
675.00
2x10.40
2x26.00
3x225.00
On Cell ft
68.10
Banyatene 2thf
3x22.70

DR MIKOU
ENDOCRINOLOGIE DIABETE
39, BD. RAHAL EL MESKINI, CASA
TEL: 0522 31 16 30 - FAX: 0522 31 05 74

39, شارع رحال المسكيني - الطابق (2) - الدار البيضاء - الهاتف (عيادة) : 05 22 31 16 30 - هاتف و فاكس : 05 22 31 06 74
39, Bd Rahal El Meskini - 2ème étage - Casablanca - Tél. : 05 22 31 16 30 - Tél./Fax : 05 22 31 06 74
e-mail: familemikou@gmail.com

PHARMACIE JERRADA
61, Bd Abderrahim Bouabid
Oasis - Casablanca
Tél: 0522.23.54.49 / 05.22.99.47.20



INSULET® RAPIDE 100 UI/ml, solution injectable

INSULET® MIX 30 100 UI/ml, suspension injectable

INSULET® NPH 100 UI/ml, suspension injectable

l'alcool :
ne pourraient varier. La prise d'alcool à
des hypoglycémies.

Intensité d'exercice que d'habitude :
l'intensité diminue généralement si vous
sentez une fatigue physique.

Prise de mesures à prendre en cas
de baisse de la glycémie.
avant de partir en voyage à l'étranger :
vous rendre à l'étranger, pensez à en
consultez un pharmacien ou infirmier. Le décalage
peut vous contraindre à modifier vos heures
par rapport à vos heures habituelles.

TRAITEMENT
Si vous devez vous prévoyez de l'être, vous devez
avant votre médecin pour discuter de vos
plans de contrôler votre diabète.
un traitement par insuline n'expose votre
santé. Il peut cependant être nécessaire
d'insuline ainsi que votre régime.
consultez votre médecin ou à votre pharmacien
pour votre traitement.

UTILISATEURS D. MACHINES
La concentration et vos réflexes peuvent être
affectés par l'hypoglycémie. Vous devez penser à
vous pourriez mettre votre vie en
danger si vous ne consultez pas d'autres personnes, comme la conduite
de machines.

Précautions à prendre :
Demandez à votre médecin sur vos capacités à
conduire des véhicules.
En cas d'hypoglycémie,
les symptômes d'hypoglycémie diminuent ou
disparaissent.

MÉDICAMENTS ET AUTRES

Autres médicaments :
L'insuline peut être augmentée par
l'usage concomitant de médicaments à effet
hypoglycémiant, tels que les glucocorticoïdes, les hormones
de croissance, le danazol, les bêta-2
agonistes (rôdriane, salbutamol, terbutaline) et les
diurétiques.

L'insuline peut être diminuée par
l'usage concomitant de médicaments à effet
hyperglycémiant, tels que les glucocorticoïdes, les hormones
de croissance, le danazol, les bêta-2
agonistes (rôdriane, salbutamol, terbutaline) et les
diurétiques.

INSULET® ne doit pas être mélangée
avec d'autres insulines produites par d'autres fabricants ou avec
d'autres insulines d'origine animale.
Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si

vous prenez ou avez pris récemment un
autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE, FREQUENCE

TRAITEMENT, MODÉ ET VOIE D'ADMINISTRATION

Se conformer strictement à l'ordonnance.

Suivez attentivement les conseils

de l'équipe de diabétologie concernant

l'administration de votre insuline

glycémie, le régime et l'activité physique

pour maintenir l'équilibre de votre diabète.

Il est recommandé de mesurer

régulièrement la glycémie.

Les préparations d'INSULET®

par voie sous-cutanée (sous la

peau) vous l'a prescrit, être

utilisées. Les préparations d'INSULET®

par voie intraveineuse à l'exception

de l'administration par voie intraveineuse

par un médecin pourrait dans

certains cas nécessiter un changement

de l'insuline animale à une

insuline humaine.

Effectuez lors de la première

injection plusieurs semaines ou plus

avant de commencer le traitement.

Préparation :

Une asepsie rigoureuse

est requise. INSULET® Rapide est

une solution injectable.

Le liquide doit être transparent

et sans particules. Vérifiez-le avant chaque injection.

INSULET® NPH et MIX 30 : avant utilisation, faire

plusieurs fois entre la paume des mains les flacons afin de

remettre l'insuline en suspension, jusqu'à ce qu'elle prenne

un aspect uniformément trouble ou laiteux. Si cet aspect n'est

pas obtenu, répéter la procédure ci-dessus jusqu'à ce que le

contenu du flacon soit bien mélangé. Ne pas agiter

vigoureusement car la formation d'une mousse pourrait gêner

la mesure exacte de la dose.

Examinez les flacons régulièrement et ne pas les utiliser si la

suspension présente des flocculations ou si des particules

blanches restent collées au fond ou sur les parois du flacon,

lui donnant un aspect givré.

Si vous devez mélanger deux types d'insuline :

Commencer par aspirer l'insuline à action rapide dans la

seringue, afin d'éviter la contamination du flacon par la

préparation à durée d'action plus longue. Il est conseillé de

réaliser l'injection immédiatement après le mélange.

Il est également possible d'utiliser des seringues distinctes

de l'INSULET® RAPIDE et de l'INSULET® NPH pour administrer la

quantité requise de chaque préparation.

Injection

Injecter la dose correcte d'insuline en suivant les instructions

de votre médecin ou de votre infirmier.

L'administration sous-cutanée peut être effectuée dans les

bras, les cuisses, les fesses ou l'abdomen. Demander l'avis de

votre médecin.

avant, et

même s'il s'agit d'un médicament obtenu

de votre médecin.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.

Les points d'injection doivent varier afin de

éviter le même point d'injection plus d'une fois par

jour.



SOTHEMA
Fabriqué par / Manufactured by
Laboratoires SOTHEMA
P.O. Box N° 1, 20180 Boukoura - Morocco



CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSION

DE PLUSIEURS DOSES

Si vous avez oublié une dose, votre glycémie

pourrait être élevée.

Ne prenez pas de dose double pour compenser

la dose oubliée.

Les symptômes liés à une glycémie inhabituellement

élevée apparaissent progressivement. Ces symptômes

sont : polyurie (envie fréquente d'uriner),

appétit, nausées, vomissements, somnolence,

rougeur et sécheresse buccale et cutanée, odeur

de l'urine. Les symptômes graves sont une respiration

profonde et un pouls rapide.

Si vous n'obtenez aucune réaction au glucose

plasma-veineux de sérum glucose hypertonique

réalisée et un traitement hospitalier pourra être

nécessaire. Demandez à votre médecin des renseignements

sur le glucose.

Si une hypoglycémie n'est pas traitée, il peut

entraîner des complications sérieuses telles que perte de

conscience voire même décès. Ayez toujours

un document indiquant que vous êtes diabétique.

Ayez toujours du sucre avec vous. Il n'y a aucun

doute sur le diagnostic d'hypoglycémie.

Le traitement décrit ci-dessus.

Signalez à votre médecin tout épisode d'hypoglycémie.

Si vous avez oublié une dose, votre glycémie

pourrait être élevée.

Ne prenez pas de dose double pour compenser

la dose oubliée.

Les symptômes liés à une glycémie inhabituellement

élevée apparaissent progressivement. Ces symptômes

sont : polyurie (envie fréquente d'uriner),

appétit, nausées, vomissements, somnolence,

rougeur et sécheresse buccale et cutanée, odeur

de l'urine. Les symptômes graves sont une respiration

profonde et un pouls rapide.

Si vous n'obtenez aucune réaction au glucose

plasma-veineux de sérum glucose hypertonique

réalisée et un traitement hospitalier pourra être

nécessaire. Demandez à votre médecin des renseignements

sur le glucose.

Si une hypoglycémie n'est pas traitée, il peut

entraîner des complications sérieuses telles que perte de

conscience voire même décès. Ayez toujours

un document indiquant que vous êtes diabétique.

Ayez toujours du sucre avec vous. Il n'y a aucun

doute sur le diagnostic d'hypoglycémie.

Le traitement décrit ci-dessus.

Signalez à votre médecin tout épisode d'hypoglycémie.

Si vous avez oublié une dose, votre glycémie



INSULET® RAPIDE 100 UI/ml, solution injectable

INSULET® MIX 30 100 UI/ml, suspension injectable

INSULET® NPH 100 UI/ml, suspension injectable

l'alcool :
ne pourraient varier. La prise d'alcool à
des hypoglycémies.

Intensité d'exercice que d'habitude :
l'intensité diminue généralement si vous
physique.

médecin des mesures à prendre en cas
avant de partir en voyage à l'étranger :
vous rendre à l'étranger, pensez à en
n, pharmacien ou infirmier. Le décalage
s contraindre à modifier vos heures
par rapport à vos heures habituelles.

TRAITEMENT
te ou prévoyez de l'être, vous devez
votre médecin pour discuter de vos
in de contrôler votre diabète.
un traitement par insuline n'expose votre
e. Il peut cependant être nécessaire
insuline ainsi que votre régime.
votre médecin ou à votre pharmacien
médicament.

UTILISATEURS D. MACHINES
concentration et vos réflexes peuvent être
hypoglycémie. Vous devez y penser dans
ou vous pourriez mettre votre vie en
autres personnes, comme la conduite
de machines.

er votre médecin sur vos capacités à

des d'hypoglycémie,

écureurs d'hypoglycémie diminués ou

MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES

autres médicaments :
insuline peuvent être augmentés par
acomitante de médicaments à effet
s que les glucocorticoïdes, les hormones
one de croissance, le danazol, les bêta-2
riodrine, salbutamol, terbutaline) et les
es.

insuline peuvent être diminués par
acomitante de médicaments à effet
s que les hypoglycémisants oraux, les
mple l'acide acétylsalicylique) certains
inhibiteurs de la monoamine oxydase),
s de l'enzyme de conversion de
les bêta-bloquants ou l'alcool.

la somatostatine (tels que lanréotide,
selon les cas, soit augmenter soit
s en insuline.

INSULET® ne doivent pas être mélangées
produites par d'autres fabricants ou avec
insuline d'origine animale.

votre médecin ou à votre pharmacien si

vous prenez ou avez pris récemment un
même s'il s'agit d'un médicament obtenu

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE, FREQUENCE

TRAITEMENT, MODÉ ET VOIE D'ADMINISTRATION

Se conformer strictement à l'ordonnance.

Suivez attentivement les conseils

équipe de diabétologie concernant

d'administration de votre insuline

glycémie, le régime et l'activité physique

équilibre de votre diabète.

Il est recommandé de mesurer

Les préparations d'INSULET®

injection sous-cutanée (sous la

médecin vous l'a prescrit, être

Les préparations d'INSULET®

par voie intraveineuse à l'exception

un médecin pourrait dans

l'injection par voie intraveineuse

Si vous changez de type d'

d'une insuline animale à une

nécessiter un changement

effectué lors de la première

plusieurs semaines ou plus

Préparation :

Une asepsie rigoureuse

INSULET® Rapide est

que si elle a l'apparence

Le liquide doit être transparent

particule. Vérifiez-le avant chaque injection

INSULET® NPH et MIX 30 : avant utilisation, faire

plusieurs fois entre la paume des mains les flacons afin de

remettre l'insuline en suspension, jusqu'à ce qu'elle prenne

un aspect uniformément trouble ou laiteux. Si cet aspect n'est

pas obtenu, répéter la procédure ci-dessus jusqu'à ce que le

contenu du flacon soit bien mélangé. Ne pas agiter

vigoureusement car la formation d'une mousse pourrait gêner

la mesure exacte de la dose.

Examinez les flacons régulièrement et ne pas les utiliser si la

suspension présente des flocculations ou si des particules

blanches restent collées au fond ou sur les parois du flacon,

lui donnant un aspect givré.

Si vous devez mélanger deux types d'insuline :

Commencer par aspirer l'insuline à action rapide dans la

seringue, afin d'éviter la contamination du flacon par la

préparation à durée d'action plus longue. Il est conseillé de

réaliser l'injection immédiatement après le mélange.

Il est également possible d'utiliser des seringues distinctes

d'INSULET® RAPIDE et d'INSULET® NPH pour administrer la

quantité requise de chaque préparation.

Injection

Injecter la dose correcte d'insuline en suivant les instructions

de votre médecin ou de votre infirmier.

L'administration sous-cutanée peut être effectuée dans les

bras, les cuisses, les fesses ou l'abdomen. Demander l'avis de

votre médecin.



SOTHEMA
Fabriqué par / Manufactured by
Laboratoires SOTHEMA
P.O. Box N° 1, 20180 Boukoura - Morocco



Les points d'injection doivent varier afin de
même point d'injection plus d'une fois par m

injections :

a'une fois. Jeter les
provoquer d'accident
gées. Les flacons pe

soient vides, puis

EN CAS DE SURDO

été une dose trop importa

une hypoglycémie.

symptômes d'hypoglycémie :

Les symptômes possibles so

pâleurs et froidure cutané

remblement, sensation d'anxi

bituelle, confusion, difficultés

taim excessive, troubles vis

e, nausées ou rythme cardiaque

en l'absence de traiteme

inique

dans ce cas de faire le traitement p

as.

d'hypoglycémie :

du sucre (sauf en cas de perte de

z vous. Ceci vous permettra fréquem

hypoglycémie légère.

as d'aggravation, une injection de

culaire ou sous-cutanée devra être ré

surage ; elle devra être suivie d'une réal

peil.

Si vous n'obtenez aucune réaction au glucose

tra-veineuse de sérum glucosé hyperten

réalisée et un traitement hospitalier pourra être

Demandez à votre médecin des renseignements

glucose.

Si une hypoglycémie n'est pas traitée, il peut

complications sérieuses telles que perte de

coma voire même décès. Ayez toujours

document indiquant que vous êtes diabétique.

Ayez toujours du sucre avec vous. Il n'y a aucu

de doute sur le diagnostic d'hypoglycémie

traitement décrit ci-dessus.

Signalez à votre médecin tout épisode d'hypo

CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSI

DE PLUSIEURS DOSES

Si vous avez oublié une dose, votre glycémie

de façon importante.

Ne prenez pas de dose double pour compens

que vous avez oubliée de prendre.

Les symptômes liés à une glycémie inhabitu

apparaissent progressivement. Ces symptô

suivants : polyurie (envie fréquente d'urin

d'appétit, nausées, vomissements, somnol

rougeur et sécheresse buccale et cutanée, odeu

l'haléine. Les symptômes graves sont une resp

et un pouls rapide.



INSULET® RAPIDE 100 UI/ml, solution injectable

INSULET® MIX 30 100 UI/ml, suspension injectable

INSULET® NPH 100 UI/ml, suspension injectable

l'alcool :
ne pourraient varier. La prise d'alcool à
des hypoglycémies.

Intensité d'exercice que d'habitude :
l'intensité diminue généralement si vous
sentez une fatigue physique.

Prise de mesures à prendre en cas
avant de partir en voyage à l'étranger :
vous rendre à l'étranger, pensez à en
un pharmacien ou infirmier. Le décalage
vous contraindra à modifier vos heures
par rapport à vos heures habituelles.

TRAITEMENT
Si vous devez vous prévoyez de l'être, vous devez
avant votre médecin pour discuter de vos
de contrôler votre diabète.
un traitement par insuline n'expose votre
e. Il peut cependant être nécessaire
insuline ainsi que votre régime.
votre médecin ou à votre pharmacien
médecin.

UTILISATEURS D. MACHINES
concentration et vos réflexes peuvent être
hypoglycémie. Vous devez y penser dans
ou vous pourriez mettre votre vie en
autres personnes, comme la conduite
de machines.

er votre médecin sur vos capacités à

des d'hypoglycémie,

épisodes d'hypoglycémie diminués ou

MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES

autres médicaments :
insuline peuvent être augmentés par
l'association de médicaments à effet
que les glucocorticoïdes, les hormones
de croissance, le danazol, les bêta-2
rôdriolone, salbutamol, terbutaline) et les
autres.

insuline peuvent être diminués par
l'association de médicaments à effet
que les hypoglycémisants oraux, les
complexe l'acide acétylsalicylique) certains
inhibiteurs de la monoamine oxydase),
de l'enzyme de conversion de
des bêta-bloquants ou l'alcool.

la somatostatine (tels que lanréotide,
selon les cas, soit augmenter soit
insuline.

INSULET® ne doivent pas être mélangées
produites par d'autres fabricants ou avec
insuline d'origine animale.

votre médecin ou à votre pharmacien si

vous prenez ou avez pris récemment un
même s'il s'agit d'un médicament obtenu

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE, FREQUENCE

TRAITEMENT, MODÉ ET VOIE D'ADMINISTRATION

Se conformer strictement à l'ordonnance.

Suivez attentivement les conseils

équipe de diabétologie concernant

d'administration de votre insuline

glycémie, le régime et l'activité physique

équilibre de votre diabète.

Il est recommandé de mesurer

Les préparations d'INSULET®

injection sous-cutanée (sous la

médicament vous l'a prescrit, être

Les préparations d'INSULET®

par voie intraveineuse à l'exception

un médecin pourrait dans

l'injection par voie intraveineuse

Si vous changez de type d'

d'une insuline animale à une

nécessiter un changement

effectué lors de la première

plusieurs semaines ou plus

Préparation :

Une asepsie rigoureuse

INSULET® Rapide est

que si elle a l'apparence

Le liquide doit être transparent

particulier. Vérifiez-le avant chaque injection

INSULET® NPH et MIX 30 : avant utilisation, faire

plusieurs fois entre la paume des mains les flacons afin de

remettre l'insuline en suspension, jusqu'à ce qu'elle prenne

un aspect uniformément trouble ou laiteux. Si cet aspect n'est

pas obtenu, répéter la procédure ci-dessus jusqu'à ce que le

contenu du flacon soit bien mélangé. Ne pas agiter

vigoureusement car la formation d'une mousse pourrait gêner

la mesure exacte de la dose.

Examinez les flacons régulièrement et ne pas les utiliser si la

suspension présente des flocculations ou si des particules

blanches restent collées au fond ou sur les parois du flacon,

lui donnant un aspect givré.

Si vous devez mélanger deux types d'insuline :

Commencer par aspirer l'insuline à action rapide dans la

seringue, afin d'éviter la contamination du flacon par la

préparation à durée d'action plus longue. Il est conseillé de

réaliser l'injection immédiatement après le mélange.

Il est également possible d'utiliser des seringues distinctes

d'INSULET® RAPIDE et d'INSULET® NPH pour administrer la

quantité requise de chaque préparation.

Injection

Injecter la dose correcte d'insuline en suivant les instructions

de votre médecin ou de votre infirmier.

L'administration sous-cutanée peut être effectuée dans les

bras, les cuisses, les fesses ou l'abdomen. Demander l'avis de

votre médecin.



Les points d'injection doivent varier afin de

même point d'injection plus d'une fois par

semaines :

a'une fois. Jeter les

provoquer d'accidents

gées. Les flacons pe

soient vides, puis

AIR EN CAS DE SURDO

été une dose trop importa

une hypoglycémie.

symptômes d'hypoglycémie :

les symptômes possibles so

pâleurs et froidure cutané

remblement, sensation d'anxi

bituelle, confusion, difficultés

taim excessive, troubles vis

en, nausées ou rythme cardiaque

en l'absence de traiteme

technique

dans ce cas de faire le traitement p

as.

d'hypoglycémie :

du sucre (sauf en cas de perte de

z vous. Ceci vous permettra fréquem

hypoglycémie légère.

as d'aggravation, une injection de

culaire ou sous-cutanée devra être ré

surage ; elle devra être suivie d'une réal

peil.

Si vous n'obtenez aucune réaction au glucose

intra-veineuse de sérum glucosé hypert

réalisée et un traitement hospitalier pourra être

Demandez à votre médecin des renseignements

glucose.

Si une hypoglycémie n'est pas traitée, il peut

complications sérieuses telles que perte de

coma voire même décès. Ayez toujours

document indiquant que vous êtes diabétique.

Ayez toujours du sucre avec vous. Il n'y a aucu

de doute sur le diagnostic d'hypoglycémie

traitement décrit ci-dessus.

Signalez à votre médecin tout épisode d'hypo

CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSI

DE PLUSIEURS DOSES

Si vous avez oublié une dose, votre glycémie

de façon importante.

Ne prenez pas de dose double pour compenser

que vous avez oubliée de prendre.

Les symptômes liés à une glycémie inhabitu

apparaissent progressivement. Ces symptô

suivants : polyurie (envie fréquente d'urin

d'appétit, nausées, vomissements, somnol

rougeur et sécheresse buccale et cutanée, odeu

l'haléine. Les symptômes graves sont une resp

et un pouls rapide.



INSULET® RAPIDE 100 UI/ml, solution injectable

INSULET® MIX 30 100 UI/ml, suspension injectable

INSULET® NPH 100 UI/ml, suspension injectable

l'alcool :
ne pourraient varier. La prise d'alcool à
des hypoglycémies.

Intensité d'exercice que d'habitude :
l'intensité diminue généralement si vous
sentez une fatigue physique.

Prise de mesures à prendre en cas
avant de partir en voyage à l'étranger :
vous rendre à l'étranger, pensez à en
un pharmacien ou infirmier. Le décalage
vous contraindra à modifier vos heures
par rapport à vos heures habituelles.

TRAITEMENT
Si vous devez vous prévoyez de l'être, vous devez
avant votre médecin pour discuter de vos
de contrôler votre diabète.
un traitement par insuline n'expose votre
e. Il peut cependant être nécessaire
insuline ainsi que votre régime.
votre médecin ou à votre pharmacien
médecin.

UTILISATEURS D. MACHINES
concentration et vos réflexes peuvent être
hypoglycémie. Vous devez y penser dans
ou vous pourriez mettre votre vie en
autres personnes, comme la conduite
de machines.

er votre médecin sur vos capacités à

des d'hypoglycémie,

épisodes d'hypoglycémie diminués ou

MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES

autres médicaments :
insuline peuvent être augmentés par
l'association de médicaments à effet
que les glucocorticoïdes, les hormones
de croissance, le danazol, les bêta-2
rôdriolone, salbutamol, terbutaline) et les
autres.

insuline peuvent être diminués par
l'association de médicaments à effet
que les hypoglycémisants oraux, les
complexe l'acide acétylsalicylique) certains
inhibiteurs de la monoamine oxydase),
de l'enzyme de conversion de
des bêta-bloquants ou l'alcool.

la somatostatine (tels que lanréotide,
selon les cas, soit augmenter soit
insuline.

INSULET® ne doivent pas être mélangées
produites par d'autres fabricants ou avec
insuline d'origine animale.

votre médecin ou à votre pharmacien si

vous prenez ou avez pris récemment un
même s'il s'agit d'un médicament obtenu

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE, FREQUENCE

TRAITEMENT, MODÉ ET VOIE D'ADMINISTRATION

Se conformer strictement à l'ordonnance.

Suivez attentivement les conseils

équipe de diabétologie concernant

d'administration de votre insuline

glycémie, le régime et l'activité physique

équilibre de votre diabète.

Il est recommandé de mesurer

Les préparations d'INSULET®

injection sous-cutanée (sous la

médicament vous l'a prescrit, être

Les préparations d'INSULET®

par voie intraveineuse à l'exception

un médecin pourrait dans

l'injection par voie intraveineuse

Si vous changez de type d'

d'une insuline animale à une

nécessiter un changement

effectué lors de la première

plusieurs semaines ou plus

Préparation :

Une asepsie rigoureuse

INSULET® Rapide est

que si elle a l'apparence

Le liquide doit être transparent

particulière. Vérifiez-le avant chaque injection

INSULET® NPH et MIX 30 : avant utilisation, faire

plusieurs fois entre la paume des mains les flacons afin de

remettre l'insuline en suspension, jusqu'à ce qu'elle prenne

un aspect uniformément trouble ou laiteux. Si cet aspect n'est

pas obtenu, répéter la procédure ci-dessus jusqu'à ce que le

contenu du flacon soit bien mélangé. Ne pas agiter

vigoureusement car la formation d'une mousse pourrait gêner

la mesure exacte de la dose.

Examinez les flacons régulièrement et ne pas les utiliser si la

suspension présente des flocculations ou si des particules

blanches restent collées au fond ou sur les parois du flacon,

lui donnant un aspect givré.

Si vous devez mélanger deux types d'insuline :

Commencer par aspirer l'insuline à action rapide dans la

seringue, afin d'éviter la contamination du flacon par la

préparation à durée d'action plus longue. Il est conseillé de

réaliser l'injection immédiatement après le mélange.

Il est également possible d'utiliser des seringues distinctes

d'INSULET® RAPIDE et d'INSULET® NPH pour administrer la

quantité requise de chaque préparation.

Injection

Injecter la dose correcte d'insuline en suivant les instructions

de votre médecin ou de votre infirmier.

L'administration sous-cutanée peut être effectuée dans les

bras, les cuisses, les fesses ou l'abdomen. Demander l'avis de

votre médecin.



Les points d'injection doivent varier afin de

même point d'injection plus d'une fois par m

fréquences :

a'une fois. Jeter les

provoquer d'accident

gées. Les flacons pe

soient vides, puis

AIR EN CAS DE SURDO

été une dose trop importa

une hypoglycémie.

symptômes d'hypoglycémie

les symptômes possibles so

pâleurs et froidure cutané

remblement, sensation d'anxi

bituelle, confusion, difficultés

taim excessive, troubles vis

en, nausées ou rythme cardiaque

en l'absence de traiteme

technique

dans ce cas de faire le traitement p

as.

d'hypoglycémie :

du sucre (sauf en cas de perte de

z vous. Ceci vous permettra fréquem

hypoglycémie légère.

as d'aggravation, une injection de

culaire ou sous-cutanée devra être ré

surage ; elle devra être suivie d'une réal

peil.

vous n'obtenez aucune réaction au glucose

tra-veineuse de sérum glucosé hyperten

réalisée et un traitement hospitalier pourra être

Demandez à votre médecin des renseignements

glucose.

Si une hypoglycémie n'est pas traitée, il peu

complications sérieuses telles que perte de

coma voire même décès. Ayez toujours

document indiquant que vous êtes diabétique

Ayez toujours du sucre avec vous. Il n'y a aucu

de doute sur le diagnostic d'hypoglycémie

traitement décrit ci-dessus.

Signalez à votre médecin tout épisode d'hypo

CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSI

DE PLUSIEURS DOSES

Si vous avez oublié une dose, votre glycémie

de façon importante.

Ne prenez pas de dose double pour compens

que vous avez oubliée de prendre.

Les symptômes liés à une glycémie inhabitu

apparaissent progressivement. Ces symptô

suivants : polyurie (envie fréquente d'urin

d'appétit, nausées, vomissements, somnol

rougeur et sécheresse buccale et cutanée, odeu

l'haléine. Les symptômes graves sont une resp

et un pouls rapide.

LOT : 20E007
PER: 12 2022

METFORMINE WIN 500MG
CP PEL B30 .

P.P.V : 10DH40



ملغ 500

ميٹفورمين وين كلوريدات الميتفورمين

عن طريق الفم

قرص ملبس

يرجى الاطلاع على هذه النشرة بأكملها قبل تناول هذا الدواء
• احتفظوا بهذه النشرة فقد تحتاجون إلى قرائتها مجدداً.
• لكل استشارة اترككم في حالة ما إذا كانت لديكم شكوكه، اطباء مزيداً من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلي.
• هذا الدواء وصف لكم خصيصاً لا تقدموه أبداً لغير حتى وإن ظهرت لديه نفس الأعراض، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار به.
• إذا أصبحت بعض الآثار غير المرغوب فيها خطيرة أو إذا لاحظتم بعض الآثار غير المرغوب فيها التي لم يرد ذكرها في هذه النشرة، استشروا طبيبكم أو الصيدلي.

1. ما هو ميتفورمين وين، قرص ملبس، وما الحالات التي يستعمل فيها؟

الصف المصنعي العلاجي
ميتفورمين وين يحتوي على الميتفورمين. هذا الدواء يستخدم لعلاج داء السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية البيكواليد.
الإرشادات العلاجية
بالإضافة عن حمية غذائية مناسبة، هذا الدواء هو مضاد للسكري عن طريق الفم.
مخصص لمعالجة داء السكري من صنف 2.
• عند البالغين، يمكن وصفه لوحده أو مع دواء آخر مضاد للسكري عن طريق الفم أو مع الأنسولين.
• عند الطفل الذي يتجاوز عمره 10 سنوات والمراهقين: يمكن وصفه لوحده أو مع الأنسولين.
يمكن استعمال ميتفورمين وين 1000 ملغ بدل قرصين من ميتفورمين وين 500 ملغ حينما يتطلب العلاج جرعة من 2 أو 3 غرامات يومياً من ميتفورمين.

2. ما المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول ميتفورمين وين، قرص ملبس؟

مضادات الاستعمال
يجب عدم تناول ميتفورمين وين: • إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) للميتفورمين، أو لأحد المكونات الأخرى المتوفرة في هذا الدواء. (انظر ما المكونات التي يحتوي عليها ميتفورمين وين، في فقرة 6 «معلومات إضافية»). • إذا كانت لديك مشاكل مفرقة بالكلىين أو الكبد. • إذا كان لديك داء سكري غير منضبط، مصحوب مثلاً بارتفاع شديد لسكر الدم (نسبة السكر مرتفعة جداً في الدم)، غثيان، قيء، جفاف، فقدان سريع للوزن أو ارتفاع الحموضة الميتورينية أو ارتفاع الحموضة السيترينية أو مرض يعتمد على تراكم مواد في الدم تسمى «أجسام السيروز» التي يمكن أن تتسبب في مسبق غيبوبة السكري. الأعراض في الشخص أو في المعدة، تنفس سريع وعميق، رغبة في التقيؤ أو التقيؤ، تنفس عن رائحة فواكه غير عادية. • إذا كنت قد فقدت الكثير من الماء (جفاف)، على سبيل المثال بسبب إسهال مستمر أو حاد. أو إذا بقيت عدة مرات على التوالي، الجفاف يمكن أن يؤدي إلى مشاكل الكلى التي يمكن أن تضعف في خطر الإصابة بالحمض اللاكتوزي (انظر «معلومات إضافية» في فقرة 6 «معلومات إضافية» في هذا الدواء). • إذا كانت لديك إصابة حادة، مثلاً إصابة الرئتين أو القصبية الهوائية، أو إصابة الكلى. إصابات وخيمة يمكن أن تتسبب في مشاكل في الكلى قد تضعف في خطر الإصابة بالحمض اللاكتوزي (انظر «معلومات إضافية» في فقرة 6 «معلومات إضافية» في هذا الدواء). • إذا كانت لديك قصور القلب أو مؤخرًا أصيبت بنبوة قلبية، إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في الدورة الدموية (مثل الصدمة) أو إذا كانت لديك صعوبات في التنفس. يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض في إمداد الأوكسجين إلى الأنسجة، الذي يمكن أن يضعف في خطر الإصابة بالحمض اللاكتوزي (انظر «معلومات إضافية» في فقرة 6 «معلومات إضافية» في هذا الدواء). • إذا كنت تصاب بالكثير من الكحول.
إذا كنت أي من الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، تحدث عن ذلك إلى طبيبك قبل بدء تناول هذا الدواء.

• يجب عليك القيام ببعض التصوير الإشعاعي أو فحص حقن مادة تباين مختبرة على اليود في دورتك الدوائية. • يجب تجنب كيري.

• من تناول ميتفورمين وين بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية، سيؤمّن طبيبك بتحديد ما إذا كنت بحاجة أو لا إلى استبدال العلاج خلال هذه الفترة. من الضروري أن تتبع بدقة تعليمات طبيبك.
• احتياطات الاستعمال: لتجذبات خاصة
يجب الانتباه قبل تناول ميتفورمين وين:

المرجو الأخذ بعين الاعتبار الخطر الخاص التالي للتحضض اللاكتوزي
يمكن أن يحدث القيام ببعض مادة تباين نادرة جداً لكثيراً خطيرة تسمى التحضض اللاكتوزي، خاصة إذا كانت الكلىين لا تعملان بشكل صحيح. خطر التحضض اللاكتوزي يمكن أن يزيد في حالة داء سكري غير منضبط، صوم مطول أو شرب الكحول. أعراض التحضض اللاكتوزي هي القيء، ألم البطن غير منضبط، شعور بعباء عام مع تعب شديد وصعوبات في التنفس. إذا وجدت نفسك في هذه الحالة، قد تحتاج إلى الاستشفاء في المستشفى للعلاج لأن التحضض اللاكتوزي يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة. توقف فوراً عن تناول ميتفورمين وين والاتصال فوراً بالطبيب أو أقرب مستشفى.

ميتفورمين وين وحده لا يتسبب في نقص سكر الدم (نسبة السكر في الدم منخفضة جداً). ومع ذلك، إذا كنت تتناول ميتفورمين وين في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج داء السكري والتي يمكن أن تتسبب في نقص سكر الدم (مثل السولفاميدات المخفضة لنسبة سكر الدم، الأنسولين، مكلينيد، هناك خطر نقص سكر الدم. إذا أحسست بأعراض نقص سكر الدم مثل الضعف، الدوخة، زيادة التعرق، تسارع دقات القلب، عدم وضوح الرؤية أو صعوبات في الرؤية، أكل أو شرب شيء يحتوي على سكر يساعدك على التحسن.

الفتلات مع أدوية أخرى
تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا يجب عليك القيام ببعض مادة تباين تحتوي على اليود في دورتك الدوائية مثلاً للفحص بالتصوير الإشعاعي أو فحص السكر يجب التوقف عن تناول ميتفورمين وين بعض الوقت قبل وبعد مثل هذا الفحص. (انظر «فقرة يرجى استشارة طبيبك».)

يرجى منكم إخبار طبيبك إذا كنتم تتناولون ميتفورمين وين في نفس الوقت مع أحد الأدوية التالية. قد يكون أيضاً من الضروري مراقبة نسبة السكر في الدم لديكم باستمرار أو ضبط جرعة ميتفورمين وين: • مدرات البول (المستعملة لإزالة كمية من الماء من الجسم بزيادة كمية البول المتخرج)، مثلاً مثاقيل بيتا - 2 - الأدرينالين مثلاً السالوبوتامول أو البروتيرين (المستعمل لعلاج الربو). • الكورتيكوستيرويدات (المستعملة لعلاج أمراض مختلفة خاصة التهابات الحادة للجلد أو الربو). • الأدوية الأخرى المستعملة لعلاج داء السكري.

إذا كنت تتناول أو سوف تتناول مؤخرًا دواء آخر بما فيها دواء تم الحصول عليه دون وصفة طبية، تحدث عن ذلك إلى طبيبك أو الصيدلي.

الفتلات مع المواد الغذائية والمشروبات

يجب تجنب استهلاك المشروبات الكحولية في حين تناول هذا الدواء. الكحول قد يزيد من خطر التحضض اللاكتوزي، خاصة إذا كنت تعاني من فشل الكبد أو إذا كنت تعاني من نقص في التغذية. هذا ينطبق أيضاً على الأدوية التي تحتوي على الكحول.

الاستعمال خلال الحمل والرضاعة
الحمل أو الرضاعة

إذا فترة الحمل. تحتاجين إلى استشارة طبيبكِ لعلاج داء السكري. أبلغني طبيبك إذا كنت حاملًا، لأن ذلك قد يصعب أو يعطلن أن تكوني حاملتي حتى تتمكن من تغيير علاجي.
لا ينصح بهذا الدواء إذا كنت ترضعين طفلك أو إذا كنت تتوين القيام به.

قائمة الأدوية في قيادة القيادة

تأثيرات أو استعمال الآلات

استعمال هذا الدواء لوحده لا يؤدي إلى نقص السكر في الدم وبالتالي ليس له أي تأثير على القدرة على قيادة العربة أو استعمال الآلات.

لكن عند تناوله مع مضادات أخرى للسكري مخفضة لنسبة السكر في الدم (السولفاميدات

6 118000 062127

500 ملغ

میتفورمین وین^②

كلوريدات الميثفورمين

١: • وجب عليك القيام بفحص بالتصوير الإشعاعي أو فحص حقن مادة تباين محتوية على اليود في دورتك الدموية؛ • وجب

من تناول مثقوبين وبين بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو
للعلاجات الجراحية. سيقوم طبيبك بتحديد ما إذا كنت بحاجة أو لا إلى استبدال العلاج
خلال هذه الفترة. من الضروري أن تتبع بدقة تعليمات طبيبك.
احتياطات وتحذيرات خاصة
يجب الانتباه قبل تناول مثقوبين وبين :

المرجو الأبعد باعتبار الخطر الخاص التالي للتحصين اللاكروزي
يكن أن ينسب للمختصين وبين في مضاغلة نادرة جدا لكنها خطيرة تسمى التحصين
اللاكروزي، خاصة إذا كانت الكبتين لا تعالجان بشكل صحيح. خطر التحصين اللاكروزي
يكن أن يزيد في حالة عدم سكري غير مضبوط، مع مطول أو طري الكحول، أعراض
التحصين اللاكروزي هي القيء، الحمى البنية مع تضخمات شديدة شعور، بياض مع
تعب شديد وعصوبات في التنفس. إذا وجدت كبت في هذه الحالة، قد تحتاج إلى
استشارة مع الفور لتلقي العلاج لأن التحصين اللاكروزي يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة.
نوفول فوق عن تناول مضبوطين ومن الواتصال فوراً بالطبيب أو أي فرد مستشفي.

ميتوثومين وين وحده لا يتسبب في نقص سكر الدم (نسبة السكر في الدم منخفضة جداً)، وبمع ذلك، إذا كنت تتناول ميتوثومين وين في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج داء السكري والتي يمكن أن تسبب في نقص سكر الدم (مثل السولفاميدات المخفضة لنسبة سكر الدم، الانسولين، مكلينيتين)، هناك خطر نقص سكر الدم. إذا أحسست بأعراض نقص سكر الدم مثل الضعف، الدوخة، الارتعاج، تسارع القلب، عدم وضوح الرؤية أو صعوبة في التركيز، أكل أو شرب شيء يحتوي على سكر يساعذك على التحسن.

التفاعلات مع أدوية أخرى
تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا وجب عليك القيام بحقن مادة تبارين تحتوي على اليود في دورتك الدوائية مثلاً للفحص بالتصوير الإشعاعي أو فحص السكانثر يجب التوقف عن تناول ميثغورمين وين بعض الوقت قبل وبعد مثل هذا الفحص. (انظر «فقرة يرجى استشارة طبيبك»).

الدرجوي منكم إيجاب طبيكم إذا كنتم تتناولون فيتامينين وين في نفس الوقت مع أحد الأدوية الثلاثة، إذ يكون أيضا من الضروري مراقبة نسبة السكر في الدم لدىكم باستمرار أو ضبط جرعة فيتامينين وين • مدرات البول (المستعملة لإزالة كمية من الماء من الجسم • محاللات مستقيبات بيتا - 2 - الأدرينالية مثل السالبتامول (المستعمل لعلاج الربو)، الكورتيكوستيرويدات (المستعملة لعلاج أمراض مختلفة خاصة التهابات الحادة للجلد أو الربو)، الأدوية الأخرى المستعملة لعلاج داء

إذا كنت تتناول أو سبق لك أن تناولت مؤخرا دواء آخر بما فيها دواء تم الحصول عليه دون وصفة طبية، تحدث عن ذلك إلى طبيبك أو الصيدلي.

التفاعلات مع المواد الغذائية والمشروبات

يجب تجنب استهلاك المشروبات الكحولية في حين تتناول هذا الدواء. الكحول قد يزيد من خطر التحمض اللاكتوزي، خاصة إذا كنت تعاني من فشل الكبد أو إذا كنت تعاني من نقص في التغذية. هذا ينطبق أيضا على الأدوية التي تحتوي على الكحول.

الإستعمال خلال الحمل والرضاعة
الحمل والرضاعة

خلال فترة الحمل، ستحتاجين للأستروجين لعلاج داء السكري. أبلغني طبيبك إذا كنت حاملاً،
تظنين أنك قد تصبحين أو تخططين أن تكوني حاملاً حتى يتمكن من تغيير علاجك.
لا ينصح بهذا الدواء إذا كنت ترضعين طفلك أو إذا كنت تتوبن القيام به.

تأثير على القدرة على قيادة العربات أو استعمال الآلات
قيادة العربات أو استعمال الآلات

استعمال هذا الدواء لوحده لا يؤدي إلى نقص السكر في الدم وبالتالي ليس له أي تأثير على القدرة على قيادة العربات أو استعمال الآلات.

لكن عند تناوله مع مضادات أخرى للسكري مخفضة لنسبة السكر في الدم (السولفاميدات

عن طريق الفم

يرجى الاطلاع على هذه النشرة بأكملها قبل تناول هذا الدواء

- احتفظوا بهذه النشرة فقد تحتاجون إلى قراءتها مجددا.
- لكل استفساراتكم أو في حالة ما إذا كانت لديكم شكوك، اطلبوا مزيدا من المعلومات من طبيبيكم أو من الصيدلي.

• هذا الدواء وصف لكم شخصياً. لا تقدموه أبداً للغير حتى وإن ظهرت لديه نفس الأعراض، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار به.

• إذا أصبحت بعض الآثار غير المرغوب فيها خطيرة أو إذا لاحظتم بعض الآثار غير المرغوب فيها التي لم يرد ذكرها في هذه النشرة، استشيروا طبيكم أو الصيدلي.

١. ما هو ميتفورمين وین، قرص ملبس، وما الحالات التي يستعمل فيها؟

الصف الصيدلي العلاجي
ميتفورمين وين يحتوي على الميتفورمين. هذا الدواء يستخدم لعلاج ذاء السكري. ينتمي
إلى فئة الأدوية المسماة بيكوانيد.

الإرشادات العلاجية
بالإقتران مع حمية غذائية مناسبة، هذا الدواء هو مضاد للسكري عن طريق الفم، مخصص لمعالجة داء السكري من صنف 2.

• عند البالغين، يمكن وصفه لوحده أو مع دواء آخر مضاد للسكري عن طريق الفم أو مع الأنسولين.

• عند الطفل الذي يتجاوز عمره 10 سنوات والمراهقين : يمكن وصفه لوحده أو مع الأنسولين.

يمكن استعمال ميتفورمين وبن 1000 ملغ بدل قرصين من ميتفورمين وبن 500 ملغ
حينما يتطلب العلاج جرعة من 2 أو 3 غرامات يوميا من ميتفورمين.

2. ما المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول ميتفورمين و/أو قرص ملبس؟

مضادات الاستعمال
يجب عدم تناول ميتفورمين وين : • إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفروطة)

للميتفورمين، أو لأحد المكونات الأخرى المتوفرة في هذا الدواء. (انظر «ما المكونات التي يحتوي عليها ميتفورمين وإن» في فقرة 6 «معلومات إضافية».) إذا كانت لديك مشاكل مقترنة بالكلى أو الكبد، * إذا كان لديك داء سكري غير منضبط، مصحوب مثلاً بارتفاع

شديد لسكر الدم (نسبة السكر مرتفعة جدا في الدم)، غثيان، قي، جفاف، فقدان سريع للوزن وأرتفاع الحموضة السيتوزية. ارتفاع الحموضة السيتوزية هو مرض يعتمد على تراكم مواد في الدم تسمى "أجسام السيتوز" التي يمكن أن تتسبب في مسبب غيبوبة

السكري. الأعراض هي بالخصوص ألم في المعدة، تنفس سريع وعميق، رغبة في النوم أو تنفس مع رائحة فواكه غير عادية. • إذا كنت قد فقدت الكثير من الماء (جفاف)، على سبيل المثال بسبب إسهال مستمر أو حاد ، أو إذا بقيت عدة مرات على التوالي الجفاف

يمكن أن يؤدي إلى مشاكل الكلى التي يمكن أن تضغط في خطر الإصابة بالتهتمض اللاكوزي (انظر "عناية خاصة مع ميتفورمين و"ين" أدناه). إذا كانت لديك إصابة حادة، مثل إصابة الرتتين أو القصبات الهوائية، أو إصابة الكلى. إصابات وخيمة يمكن أن تسبب في مشاكل

في الكلى قد تضاع في خطر الإصابة بالتهنض اللاكوزي (انظر "عنية خاصة مع ميتهومين وبن" أدناه). إذا كنت تتلقى علاجاً ضد قصور القلب أو مؤخراً أصبت بنوبة قلبية، إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في الدورة الدموية (مثل الصدمة) أو إذا كانت لديك

صعوبات في التنفس. يمكن أن يؤدي هذا إلى التفكير في إمداد الأوكسجين إلى الأنسجة، الذي يمكن أن يضعك في خطر الإصابة بالتمنص اللاكوزي (انظر «عناية خاصة مع ميتفورمين وبن» أدناه). إذا كنت تتعاطى الكثير من الكحول.

إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، تحدث عن ذلك إلى طبيبك قبل بدء تناول هذا الدواء.



Baycutène® N 15 g
Crème



Baycutène® N

Crème

LOT :

PER :

PPV :

22170

Con

Baycutène® N, crème pour application locale

100 g de crème contient 1 g de clotrimazole

déxaméthasone (soit 0,04 g de dexaméthasone)

Excipients : Alcool benzylique, Alcool cétoste

chaîne moyenne, Hostaphat KW et l'eau purifiée.

Classe Pharmaco-thérapeutique

Association d'un corticostéroïde et d'un antifongique imidazolé à large spectre d'action.

Anti-eczémateux.

Indications

Baycutène® N crème est préconisé dans les infections fongiques cutanées à composante anti-inflammatoire importante.

Contre-indications

Le traitement par Baycutène® N crème est contre-indiqué en cas de :

- Hypersensibilité au clotrimazole,
- Hypersensibilité à l'alcool cétostéarylique ou à l'un des autres composants,
- Affections cutanées spécifiques (syphilis, tuberculose),
- Infections cutanées d'origine virale (herpes, rosacée),
- Varicelle
- Réaction à la vaccination antivariolique,
- Dermate péricoronaire,
- Pansement occlusif en cas d'eczéma atopique,
- Durant le premier trimestre de la grossesse.

Pendant le reste de la grossesse ainsi que chez les nourrissons, Baycutène® N ne doit pas être appliqué sur des surfaces cutanées étendues ou pendant une longue durée. Il ne doit pas non plus être appliqué sur le sein allaitant.



Baycutène® N 15 g
Crème



Baycutène® N

Crème

LOT :

PER :

PPV :

22170

Baycutène® N, crème pour application locale. 100 g de crème contient 1 g de clotrimazole et 0,04 g de dexaméthasone (soit 0,04 g de dexaméthasone par g de crème).

Composition

Baycutène® N, crème pour application locale.

100 g de crème contient 1 g de clotrimazole

dexaméthasone (soit 0,04 g de dexaméthasone

Excipients : Alcool benzylique, Alcool cétoste

chaîne moyenne, Hostaphat KW et l'eau purifiée.

Classe Pharmaco-thérapeutique

Association d'un corticostéroïde et d'un antifongique imidazolé à large spectre d'action.

Anti-eczémateux.

Indications

Baycutène® N crème est préconisé dans les infections fongiques cutanées à composante anti-inflammatoire importante.

Contre-indications

Le traitement par Baycutène® N crème est contre-indiqué en cas de :

- Hypersensibilité au clotrimazole,
- Hypersensibilité à l'alcool cétostéarylique ou à l'un des autres composants,
- Affections cutanées spécifiques (syphilis, tuberculose),
- Infections cutanées d'origine virale (herpes, rosacée),
- Varicelle
- Réaction à la vaccination antivariolique,
- Dermatite péri buccale,
- Pansement occlusif en cas d'eczéma atopique,
- Durant le premier trimestre de la grossesse.

Pendant le reste de la grossesse ainsi que chez les nourrissons, Baycutène® N ne doit pas être appliqué sur des surfaces cutanées étendues ou pendant une longue durée. Il ne doit pas non plus être appliqué sur le sein allaitant.

Blood Glucose Test Strips

REF G133-111

LOT 1690962

2021-12-22



Blood Glucose Test Strips

50

**For testing glucose in whole blood
using the *On Call® Plus* and *On Call®
EZ II* blood glucose meters.
For self testing and professional use**

Contents:
50 Test Strips
Code Chip
Package Insert



CE 0123

©2017 ACON Laboratories, Inc.



6 ||| 8 2 6 0 7 || 5 3 5 2 1 ||| 7

INFO PHARMA
10, Rue Boulmane Bourgogne
Casablanca 20040 Morocco
Tel: + 212 5 22 22 34 07
+ 212 5 22 22 12 55
Fax: + 212 5 22 47 45 92

Blood Glucose Test Strips

REF G133-111

LOT 1690962

2021-12-22



Blood Glucose Test Strips

50

**For testing glucose in whole blood
using the *On Call® Plus* and *On Call®
EZ II* blood glucose meters.
For self testing and professional use**

Contents:
50 Test Strips
Code Chip
Package Insert



CE 0123

©2017 ACON Laboratories, Inc.



6 ||| 8 2 6 0 7 || 5 3 5 2 1 ||| 7

INFO PHARMA
10, Rue Boulmane Bourgogne
Casablanca 20040 Morocco
Tel: + 212 5 22 22 34 07
+ 212 5 22 22 12 55
Fax: + 212 5 22 47 45 92

Blood Glucose Test Strips

REF G133-111

LOT 1690962

2021-12-22



Blood Glucose Test Strips

50

**For testing glucose in whole blood
using the *On Call® Plus* and *On Call®
EZ II* blood glucose meters.**

For self testing and professional use.

Contents:
50 Test Strips
Code Chip
Package Insert



CE 0123

©2017 ACON Laboratories, Inc.



6 ||| 8 2 6 0 7 || 5 3 5 2 1 ||| 7

INFO PHARMA

10, Rue Boulmane Bourgoigne
Casablanca 20040 Morocco

Tel: + 212 5 22 22 34 07
+ 212 5 22 22 12 55

Fax: + 212 5 22 47 45 92