

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-427385

ND: 35564

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e) Matricule : **10441** Société : **RAM**

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : **HIRIZI Abdelkader**

Date de naissance : **04/03/1970**

Adresse : **B270636 complexe Med II Maârif extension Casablanca**

Tél. : **0662 7797 05** Total des frais engagés : **681,20 Dhs**

 Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : **Dr. BENALI Brahim**

Professeur Agrégé en ORL

62, Rue El Aloussi Boucraa Casablanca

04 AOUT 2020

Date de consultation : **04/08/2020**

Nom et prénom du malade : **HIRIZI Abdelkader**

Age : **40**

Lien de parenté : **Conjoint** Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : **APP-DRL**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.


Fait à : **Casablanca** Le : **29/06/2020**

Signature de l'adhérent(e) : **EB**

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/01/2015	C200 (consultation)		300,00	INP : 09148975 BENALI B. Aggregé en O. Moussi Bourgogne 29 47 10 / 11

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE ONZAC 108, L'assètement SINDIBAD AIR Diab - CASABLANCA Tél : 05 22 70 78 78	29/06/10	381.23

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	
	
	
	
	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H	
	25533412	21433552
	00000000	00000000
D	00000000	00000000
	35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Brahim BENALI

Professeur Agrégé

Diplômé des Universités de Lille et Bruxelles

NEZ - GORGE - OREILLES

CHIRURGIE TETE ET COU

Traitements du Ronflement, de la Surdité et du Vertige

SUR RENDEZ-VOUS

24, Rue El Alloussi - Bourgogne

(Face Clinique Badr)

Casablanca

Tél. : C : 05.22.29.47.10 / 05.22.29.47.11

Fax : 05.22.29.47.10

6,00

51

82,50

17,75

8F,00

3/ Ndy

60.90

4/ Anaknes

21

Dr. BENALI Brahim
Professeur Agrégé en O.R.L.
Rue El Alloussi Bourgogne
Tél. : 05.22.29.47.10 / 11

الدكتور ابراهيم بنعلي
أستاذ ميرز
خريج جامعات ليل وابروكسيل
أمراض الأذن والأذن والحنجرة
جراحة الرأس والعنق
معالجة الشخير — الصمم — الدوخة
بالموعد

24، زنقة العلوسي - بوركون
(أمام مصحة بدر)
الدار البيضاء

الهاتف : 05.22.29.47.11 / 05.22.29.47.10
الفاكس : 05.22.29.47.10

Casablanca, le

29/6/2020

PHARMACIE D'URGENCE
168, Lotissement SINDBAD
Ain Diab - CASABLANCA
Tél. : 05.22.79.78.74

18 Jan (2020)

BENALI Brahim
Professeur Agrégé en O.R.L.
Rue El Alloussi Bourgogne
Tél. : 05.22.29.47.10 / 11

En Cas d'Urgence, Contacter Clinique Badr - 35, Rue El Alloussi Bourgogne (Face Mosquée Badr) - Casablanca

Tél. : 05.22.49.28.00 - 05.22.49.23.80/81/82/83/84/85 - Fax : 05.22.49.23.86

T : 381.20

ELUDRIL® 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml

Chlorhexidine-Chlorobutanol

• solution pour bain de bouche

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ELUDRIL 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ELUDRIL 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche ?

3. COMMENT UTILISER ELUDRIL 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ELUDRIL 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ELUDRIL 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Il est préconisé comme traitement local d'appoint des affections de la cavité buccale et lors de soins post-opératoires en odonto-stomatologie.

2. QUELLES CONNATRE AVANT D'UTILISER ELUDRIL 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche ?

N'utilisez pas ce médicament si vous avez une réaction allergique à l'un des ingrédients.

L'utilisation de ce médicament peut entraîner une coloration temporaire de la peau et des muqueuses.

Faites une toilette buccale régulière et buvez suffisamment d'eau.

100 ml

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

En cas de réaction allergique, arrêter l'utilisation et consulter un médecin.

Une utilisation excessive peut entraîner une coloration temporaire de la peau et des muqueuses.

Ce médicament est destiné à l'usage des adultes.

(E124)

Prise de médicaments.

L'utilisation de ce médicament peut entraîner une coloration temporaire de la peau et des muqueuses.

Antiseptique, interférent avec les médicaments.


Si vous avez une réaction allergique à l'un des ingrédients.

Précautions : Ne pas dépasser la dose recommandée.

اللودريل®

كلوريكسيدين- كلوروبوتانول

محلول لغسل الفم



قارورة من فنتا 90 مل مزودة بكوب - مقاييس

ORO disperible



Anapred®

predniso...

voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice. Vous pourriez avoir besoin de poser une autre question, si vous avez des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE Anapred 20 MG, COMPRIMÉ ORODISPERSIBLE ?

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTÉMIQUE.

Ce médicament est un corticoïde.

Il est indiqué dans certaines maladies, où il est utile.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE SUR LE COMPRIMÉ ORODISPERSIBLE ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à ce médicament.

Contre-indications

Ne pas utiliser Anapred 20 mg, comprimé orodispersible.

- La plupart des infections.

Certaines maladies virales en évolution (hépatite).

- Certains troubles mentaux non traités.

- Vaccination par des vaccins vivants.

- Si vous êtes allergique à la prednisolone ou à l'acétylsalicylique.

- Phénylcétoneurie (maladie héréditaire dépistée à EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER UN TEST).

Mises en garde spéciales

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance.

AVANT LE TRAITEMENT :

Prévenir votre médecin en cas de vaccination chirurgicale récente au niveau de l'intestin, de la tuberculose, d'insuffisance hépatique, d'insuffisance cardiaque avec fatigue musculaire).

Prévenir votre médecin en cas de séjour dans les maladies parasitaires.

La prise de ce médicament en association avec l'acétylsalicylique (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour).

PENDANT ET APRÈS LE TRAITEMENT :

éviter le contact avec les sujets atteints de varices. En cas de traitement prolongé, ne jamais arrêter le traitement sans avis de votre médecin pour la diminution des doses.

Sous traitement et au cours de l'année suivant l'intervention chirurgicale ou de situation de stress.

Les corticoïdes oraux ou injectables peuvent être utilisés (exceptionnelle). Prévenir votre médecin en cas de grossesse.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement, votre médecin pourra vous conseiller d'arrêter le traitement si nécessaire.

En cas de traitement prolongé, un apport en calcium et en vitamine D est recommandé.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER A DEMANDER UN AVIS MEDICAL.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments.

Ce médicament DOIT ETRE EVITÉ en association avec l'acétylsalicylique (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

UTILISATION PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement, sauf si votre médecin le prescrit.

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommandé d'éviter l'acétylsalicylique (≥ 1 g par jour).

Il est recommand

THIOBACT

Thiamphénicol

Formes et présentations

- Préparation pour usage parentér. 750 mg de thiamphénicol, ampoule
- Comprimés enrobés dosés à 250 mg
- Comprimés dosés à 500 mg de thiamphénicol
- Granulé pour suspension buvable dosé à 250 mg
- Granulé pour suspension buvable dosé à 500 mg

Propriétés

Le THIOBACTIN est un antibiotique du groupe du thiamphénicol.

Indications

Celles des phénicolés, sous-groupe du thiamphénicol. Elles seront limitées à :

- Certaines infections aiguës des voies respiratoires aux autres antibiotiques,
- Certaines infections digestives telles que la colite pseudomembraneuse,
- Certaines infections hépatobiliaires,
- Urétrites gonococciques,
- Urétrites non gonococciques à germes anaérobies,
- Méningites à haemophilus,
- Infections à germes anaérobies responsables de certaines infections cutanées et des infections de la peau et des tissus mous.

Contre-indications

Sujets présentant des antécédents de phénicolés.

Nourrissons de moins de six mois,

Insuffisant rénal grave,

Allergie aux phénicolés.

Mises en garde

Prévenir le médecin traitant en cas de :

- antécédents d'insuffisance médullaire,
- insuffisance rénale.

Recommandations

Ce médicament appartient à la famille des phénicolés. Il combat l'infection dont vous êtes atteint. Les bactéries qui sont la cause.

1^o) Votre médecin a choisi cet antibiotique. Il convient précisément à votre cas et à votre état de santé. Vous ne devez donc pas l'utiliser pour combattre une maladie même si elle vous-mêmes, ni pour quelqu'un d'autre.

2^o) Pour être efficace, cet antibiotique doit être pris dans les doses prescrites, et aussi longtemps que nécessaire. En effet, la disparition de la fièvre ne signifie pas que l'infection a disparu et que vous pouvez arrêter le traitement avant son terme. Si vous le faites, et votre guérison pourrait être retardée. Il faut augmenter les doses prescrites ne pas prendre plus de 500 mg par jour.

6 118000 061526

24 comprimés

THIOBACTIN 500 mg

24

ثيوبيكتين

500

92160

ثيوبيكتين



Lire attentivement la notice avant utilisation.
A conserver à une température inférieure à 25°C.
TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

Read carefully the package insert before use.
Store below 25°C.
KEEP OUT OF THE REACH AND SIGHT OF CHILDREN.

Maxilase® DORES DE GARGANTA

ADULTO

Via oral.

24 comprimidos revestidos

Composição:

Alfa-amilase 3000 U. CEIP
para um comprimido revestido.

Excipientes com efeito importante:

amarelo alaranjado S (E110),
sacarose, lactose.

60DH10
PPV:

580735
Distribué sous licence
par LAPROPHAN
21, rue des Oudaya
CASABLANCA - Maroc

sanofi-aventis France
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris, France

Fabricant / Manufacturer

المحصن /
Sanofi Winthrop Industrie
1, rue de la Vierge
Ambarès-et-Lagrave
33565 Carbon Blanc, France

Médicament autorisé /
Authorized medicine/
دواء مرخص رقم:
34009 30653074

3 582910 011910

MAUX DE GORGE / SORE THROAT
ALPHA-AMYLASE 3000 U. CEIP
24 COMPRIMÉS ENROBÉS/COATED TABLETS



Maxilase®

