

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

### Maladie

Cadre réservé à l'adhérent (e)

9100

Matricule :

Société :

RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : EL MOUADII MOHAMMED

Date de naissance :

09-12-65

Adresse : OULFA

Tél. : 0661336979

Total des frais engagés : 1000

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. CHAHIR IDRISI TAIBI  
Spécialiste en Maladie  
du Cœur et des Vaisseaux  
Hôpital Al Hassani

Date de consultation :

21/1/20

Nom et prénom du malade :

SC. Mohamed. 17med.

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

H20

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 1/1/20

Signature de l'adhérent(e) :

# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
7/1/20	C2	C5	INP : 021433129	Dr. CHAHIR IDRISI Spécialiste en Maladie du Coeur et des Vaisseaux Hôpital Al Hassan

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. CHAHIR IDRISI Spécialiste en Maladie du Coeur et des Vaisseaux Hôpital Al Hassan	07/01/20 20	672, 20

ANALYSES - RADIographies			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires


AUXILIAIRES MEDICAUX					
Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre		Montant détaillé des Honoraires	
		AM	PC	IM	IV

VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

COEFFICIENT DES TRAVAUX	
MONTANTS DES SOINS	
DEBUT D'EXECUTION	
FIN D'EXECUTION	
COEFFICIENT DES TRAVAUX	
MONTANTS DES SOINS	
DATE DU DEVIS	
DATE DE L'EXECUTION	

**O.D.F PROTHESES DENTAIRES**



**DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE**

25533412	21433552
00000000	00000000
35533411	11433553

**[Création, remont, adjonction]**  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION**

## Ordonnance

Casablanca, 07.05.2000

El moudni 17 ed.

26/05/00

- Atacand 16mg.

1cp/j pd 3 mois



18.30 + 3  
- Doliprane 1000mg.



18.30 + 3  
- Vit. C.

1cp. 2/j

مودني  
Pharmacie L'OURKOS  
Yassine 86 L'Ourkos  
Casablanca  
125/127, 1er ét. 1000  
T. F. N° 00422143  
Ouïfa  
18.30 + 3



18.30 + 3  
- Mycosten. 11

23.90 1app 3/j pd. 10j

Dr. CHAHIID DRSSI TAIBI  
Spécialiste en Maladie  
du Cœur et des vaisseaux  
Hôpital Al Hassan



# MYCOSTER® 1%

Ciclopiroxolamine

Crème



**Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Les informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE MYCOSTER 1 pour cent, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MYCOSTER 1 pour cent, crème ?
3. COMMENT UTILISER MYCOSTER 1 pour cent, crème ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER MYCOSTER 1 pour cent, crème ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### 1. QU'EST-CE QUE MYCOSTER 1 pour cent, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

##### Classe pharmacothérapeutique

ANTIFONGIQUE A USAGE TOPIQUE.

##### Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement:

- des mycoses de la peau ou des ongles (affections dues aux champignons) surinfectées ou non par des bactéries,
- dermatite séborrhéique légère à modérée du visage.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MYCOSTER 1 pour cent, crème ?

##### Contre-indications

#### N'utilisez jamais MYCOSTER 1 pour cent, crème dans les cas suivants :

- en cas d'allergies à l'un des composants du produit,
- prévenir votre médecin en cas de grossesse,
- ne pas appliquer ce médicament près des yeux,
- ne pas avaler.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

##### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec MYCOSTER 1 pour cent, crème :

##### Précautions d'emploi

Ne pas appliquer ce médicament près de la région oculaire.

Candidoses: il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorable à la multiplication de candida).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

##### Interactions avec d'autres médicaments

##### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

##### Grossesse - allaitement

# MYCOSTER® 1%

Ciclopiroxolamine

Crème



**Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Les informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE MYCOSTER 1 pour cent, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MYCOSTER 1 pour cent, crème ?
3. COMMENT UTILISER MYCOSTER 1 pour cent, crème ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER MYCOSTER 1 pour cent, crème ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### 1. QU'EST-CE QUE MYCOSTER 1 pour cent, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

##### Classe pharmacothérapeutique

ANTIFONGIQUE A USAGE TOPIQUE.

##### Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement:

- des mycoses de la peau ou des ongles (affections dues aux champignons) surinfectées ou non par des bactéries,
- dermatite séborrhéique légère à modérée du visage.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MYCOSTER 1 pour cent, crème ?

##### Contre-indications

#### N'utilisez jamais MYCOSTER 1 pour cent, crème dans les cas suivants :

- en cas d'allergies à l'un des composants du produit,
- prévenir votre médecin en cas de grossesse,
- ne pas appliquer ce médicament près des yeux,
- ne pas avaler.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

##### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec MYCOSTER 1 pour cent, crème :

##### Précautions d'emploi

Ne pas appliquer ce médicament près de la région oculaire.

Candidoses: il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorable à la multiplication de candida).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

##### Interactions avec d'autres médicaments

##### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

##### Grossesse - allaitement

# Doliprane®

1000 mg comprimé effervescent sécable

PARACÉTAMOL

Veuillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations importantes. Ce médicament est disponible sans ordonnance et vous pouvez l'acheter sans l'aide d'un médecin. Néanmoins, vous devez utiliser ce médicament avec précaution afin d'en obtenir le meilleur résultat. Veuillez lire attentivement cette notice et la lire à nouveau. Si vous avez besoin de plus d'informations, demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou si

La substance active est : paracétamol 1000 mg pour un comprimé. Les autres ingrédients sont : acide citrique, anhydride, mannitol, saccharine, K90, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium anhydride. Teneur en sodium : 408 mg par comprimé.

## QU'EST-CE QUE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleurs et/ou fièvre telles que maux de tête, fièvre, règles douloureuses.

Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans).

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de ce médicament. Consultez votre pharmacien.

## INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT.

### Contre-indications

Ne pas prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent

- allergie connue au paracétamol,
- maladie grave du foie,
- enfants de moins de 15 ans.

## PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT

### Précautions particulières

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.
- En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sodium : 408 mg par comprimé.
- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

### Mises en garde

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").

### Grossesse et allaitement

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Doliprane® 1000 mg

PARACÉTAMOL

8 comprimés effervescents sécables



6 118000 040361

Conseil  
à l'abri  
de l'humidité

NE PAS  
NI A

AMM

b



# Vita C 1000®

(Acide ascorbique)

## DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITA C 1000®, Comprimés effervescents

VITA C 1000®, Comprimés effervescents

VITA C 1000® SANS SUCRE, Comprimés effervescents

Veuillez lire attentivement cette notice. Elle contient des informations importantes. Vous devez toujours prendre les informations fournies par votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourrez la consulter à tout moment.
- Adressez-vous à votre pharmacien.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables énumérés ci-dessous, informez votre pharmacien ou si possible, le pharmacien mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre pharmacien pour une amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

مختصر  
الجرعات  
ANS.  
ONS -  
يحتوي  
eur et  
يحتوي  
ب

Vita C 1000®


10 Comprimés effervescents



6 118000 32069

AMM N° 03 DMP/21

vita C 1000®



PPV 150H30

EXP 01/2023

LOT 90069 7

## Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que VITA C 1000® Comprimés effervescents et sans sucre ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
3. Comment prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
6. Informations supplémentaires

## 1 - QU'EST-CE QUE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

### - Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C), NON ASSOCIEE - code ATC : A11GA01.

### - Indications thérapeutiques

Ce médicament contient de la vitamine C.

Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

## 2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents.

### - Ne prenez jamais VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Contre-indications)

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
- si vous êtes atteint de phénylcétoneurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam (VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents)
- si vous présentez une insuffisance rénale sévère (défaillance grave des fonctions du rein)
- si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux
- si vous avez des calculs d'oxalate de calcium (hyperoxalurie)
- si vous avez moins de 15 ans

### - Faites attention avec VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents.

- VITA C 1000® comprimés effervescents
- Si votre enfant a moins de 15 ans, il ne doit pas prendre ce médicament.
- En raison de l'effet diurétique, il ne doit pas prendre ce médicament si l'enfant a moins de 15 ans.
- Prendre en cas d'insuffisance rénale sévère.

## • VITA C 1000®

• Ce médicament doit être pris en cas de besoin.

• En raison de l'effet diurétique, il ne doit pas prendre ce médicament chez les personnes souffrant de malabsorption intestinale (maladies héréditaires).

• Ce médicament doit être pris en cas de besoin, mais il faut prendre une dose de sucre ou de glucose.

• Ce médicament peut provoquer des réactions allergiques.

## • VITA C 1000®

• Ce médicament doit être pris en cas de besoin.

• Ce médicament doit être pris en cas de besoin.

• Ce médicament doit être pris en cas de besoin.

• Ce médicament doit être pris en cas de besoin.

## - Enfants & adolescents

Informez votre pharmacien ou votre médecin. Il pourra vous conseiller sur la prise de ce médicament. Ces médicaments contiennent des sucres et doivent être pris avec précaution.

## - Aliments et boissons

Prendre en cas de besoin. Ces médicaments sont enrichis et doivent être pris avec précaution.

## - Utilisation par les personnes âgées

Si vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans, il est préférable de prendre ce médicament avec précaution.

Grossesse

Par mesure de précaution, il est préférable de prendre ce médicament avec précaution.

## - Allaitement

La vitamine C est présente dans le lait maternel. Il est préférable de prendre ce médicament avec précaution.

# Vita C 1000®

(Acide ascorbique)

## DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITA C 1000®, Comprimés effervescents

VITA C 1000®, Comprimés effervescents

VITA C 1000® SANS SUCRE, Comprimés effervescents

Veuillez lire attentivement cette notice. Elle contient des informations importantes. Vous devez toujours prendre les informations fournies par votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourrez la consulter à tout moment.
- Adressez-vous à votre pharmacien.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables énumérés ci-dessous, informez votre pharmacien ou si possible, le pharmacien mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre pharmacien pour une amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

مختصر  
الجرعات  
ANS.  
ONS -  
يحتوي  
eur et  
يحتوي  
ب

Vita C 1000®


10 Comprimés effervescents



6 118000 32069

AMM N° 03 DMP/21

vita C 1000®



PPV 150H30

EXP 01/2023

LOT 90069 7

## Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que VITA C 1000® Comprimés effervescents et sans sucre ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
3. Comment prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
6. Informations supplémentaires

## 1 - QU'EST-CE QUE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

### - Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C), NON ASSOCIEE - code ATC : A11GA01.

### - Indications thérapeutiques

Ce médicament contient de la vitamine C.

Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

## 2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents.

### - Ne prenez jamais VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Contre-indications)

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
- si vous êtes atteint de phénylcétoneurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam (VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents)
- si vous présentez une insuffisance rénale sévère (défaillance grave des fonctions du rein)
- si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux
- si vous avez des calculs d'oxalate de calcium (hyperoxalurie)
- si vous avez moins de 15 ans

### - Faites attention avec VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents.

- VITA C 1000® comprimés effervescents
- Si votre enfant a moins de 15 ans, il ne doit pas prendre ce médicament.
- En raison de l'effet diurétique, il ne doit pas prendre ce médicament si l'enfant a moins de 15 ans.
- Prendre en cas d'insuffisance rénale sévère.

## • VITA C 1000®

• Ce médicament doit être pris en cas de déficit en vitamine C.

• En raison de l'effet diurétique, il ne doit pas prendre ce médicament chez les patients avec malabsorption intestinale (maladies héréditaires).

• Ce médicament doit être pris en cas de déficit en vitamine C.

• Ce médicament peut provoquer des effets indésirables.

## • VITA C 1000®

• Ce médicament doit être pris en cas de déficit en vitamine C.

• Ce médicament doit être pris en cas de déficit en vitamine C.

• Ce médicament doit être pris en cas de déficit en vitamine C.

## - Enfants & adolescents

- Prises d'autre médicament : Informez votre pharmacien, il pourra vous conseiller les médicaments qui doivent être évités.

- Aliments et boissons : Prendre en cas de régime enrichi et de boissons enrichies.

- Utilisation par les personnes âgées : Si vous êtes âgé(e), il est préférable de prendre ce médicament.

**Grossesse**  
Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

**Allaitement**  
La vitamine C passe dans le lait maternel. Il est préférable de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.