

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## tions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## ladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

 Maladie Dentaire Optique Autres

## Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1022 Société : 35617

 Actif Pensionné(e) Autre :AANANHélèneABAD

Nom &amp; Prénom :

Date de naissance : 21/07/1954 EL Nazzam

Adresse :

Hay E-SALAM

Tél. : 06 69 26 36 79 Total des frais engagés : ..... Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 23/07/2020Nom et prénom du malade : AANAN Hélène

Age:


Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  EnfantNature de la maladie : Affection digestive

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : .....  


# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23/07/2022	C		1500H	MEDAL Melika 36, Rue Beauséjour Tél : 05 22 38 64 46 Medecine Generale Beauséjour Casablanca

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE OULMES HAKIMA BEN LE BOUGHANDI ET YOUSSEF MANSOUR 360800	23/07/2022	381,00

## ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

**O.D.F PROTHESES DENTAIRES**

**DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE**

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	35533411	11433553

**(Création, remont, adjonction)**  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION**

Docteur Mifdar Malika

Médecine Générale

36, Rue El Koronfol 1er étage App. 2

Hay Raha (Beausejour)

CASABLANCA

Tél.: 0522.36.64.48

الدكتورة مفضل مليكة

الطب العام

زنقة القرنفل حي الراحة (بوسيجور)

الطابق 1 الشقة 2 - الدار البيضاء

الهاتف: 0522.36.64.48

LARAKI HIKIMA  
TIGLE BO GANDI ET  
Y EL MANSOUR 360806

CASABLANCA, LE 23/07/2022

N° Adnan Halima ep ABAI

55,00t2 Amoxil 18  
1x31j x 8j

149,00 - Odes 20 18  
18el 1j

40,40 - Metronidazole 1 copie 1j

32,90 - Dofutril 50  
1gel + 21j

57,70 - Bedelin 10x21j

381,00

Dr. MIFDAR Malika  
Médecine Générale  
36, Rue Koroufai Hay Raha  
Beausejour Casablanca  
Tél.: 0522.36.64.48



الطبنيب المعلاج في أقرب وقت ممكن. اجلب الدو

٤- تناولها. ٥- تناولها. ٦- تناولها. ٧- تناولها.

توفيق عن تناول أموركم،  
أي موضوع.  
لديكم أسلة أخرى حول استخدام هذا النواة، المرجو  
أن تستحصلوا على المزيد من المعلومات.

ما هي الأدوية التي يمكن أن ينضم إليها العلاج؟

توفيق عن مدونات الشهيدية اثناء، لذا قد تحتاج إلى علاج طبي سارع.  
الشهيدة العزيزية الثالثة نادرة جداً (يمكن أن تظهر لدى مريض واحد من أصل 10000 مريض):

مرتضى:  
• رندة فعل حساسية يمكن أن تشمل الحكة أو الطفح الجلدي، والتورم في الوجه والشفتين ولسانه والجلد، أو صعوبة في التنفس، وصعوبة في الدامع، وحد الأفعال هذه مختبرة وقابلة لـ هذا بسبب

Dogmatil® 50mg

Degmatil 50mg  
20 Gélules

الأخير، تشير التحليلات الجيولوجية للأثار على وجود مشكلة في خلايا الماء، حيث يظهر أن الأثار يحيطون بعذائب الماء، وتحتاج عذائب الماء إلى مياه نظيفة، مما يهدد صحة الماء.

هذه الآثار الجلدية دلائل على وجود مشكلة في خلايا الدم  
 • تفاعل باريسكيموكوبير الذي يمكن أن يظهر أثناء العلاج بألوكسيل بسبب حمى  
 وتشعرية وسعاده في المصلات، مما يتطلب إيقاف العلاج فوراً.  
 التقييم: الأهماء الطفطنة (القولون)، يرافق بهما (في بعض الأحيان مع الدم)، والألام

**النهاية** هو التهاب الأمعاء الطيفية (القولون)، يزف بهما (في بعض الأحيان مع الدم)، والألم والحمى قد تظهر جانبياً خطيرة بذلك. هذه الأعراض تظهر بشكل رئيسي لدى المرضى الذين يعانون العلاج لفترات طويلة، لدى الرجال والممرضين من كبار السن. يجب علىك

الذين يخضعون للعلاج لفترات طويلة، لدى الرجال والمرضى من كبار السن. يجب عليك استشارة الطبيب فوراً في الحالات التالية:  
 ٥- الإسهال الشديد مع وجود نزف،  
 ٦- ظهور بثور واحمرار أو حكمات على الجلد،  
 ٧- مرض مزمن.

قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.  
قد تحدث هذه التفاعلات عند تناول النواة أو خلال عدة أسابيع بعد التوقف عن تناوله.  
إذا أردت لديك أي من التفاعلات المذكورة أعلاه، توقيف عن تناول هذا الدواء واستشارة الطبيب فوراً.

الطبيب فوراً.  
يمكن أن تكون  
طفح جلدي (طبع  
منتفحة على اللد

مفع جدي (مع  
ومنطقة على الـ  
(يمكن أن تظهر  
إذا ظهرت لديك  
أداء مكملاً.  
أداء مكملاً.


**bedelix®**

**betadex** ملطف جلدی.  
\* غیران  
بسال

R..01 17/08/2023 SACHETS B30 P.P.V :57DH70 008013-02

A standard linear barcode is positioned horizontally across the page. It consists of vertical black bars of varying widths on a white background. The barcode is used for tracking and identification purposes.

6 " 118000"010234 "



Amoxil 500mg et 1 g comprimé

Amoxil 125 mg, 250mg et 500 mg

flacon de 60 ml.

Amoxicilline

#### Dénomination du médicament

Veuillez lire attentivement cette notice. Elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir des questions, interroger.

- Ce médicament vous a été prescrit à vous ou d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les symptômes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice.

#### Quel contenu cette notice ?

- Qu'est-ce que AMOXIL et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AMOXIL ?
- Comment prendre AMOXIL ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver AMOXIL ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

#### 1. QU'EST-CE QUE AMOXIL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

##### Classe pharmacothérapeutique

##### Qu'est-ce que AMOXIL ?

AMOXIL est un antibiotique. Le principe actif est l'amoxicilline. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines ».

##### Dans quels cas AMOXIL est-il utilisé ?

AMOXIL est utilisé pour traiter des infections causées par des bactéries dans différentes parties du corps.

AMOXIL peut également être utilisé en association à d'autres médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AMOXIL ?

##### Ne prenez jamais AMOXIL :

- Si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
  - Si vous déjà présenté une réaction allergique à un antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou de la gorge.
- Ne prenez pas AMOXIL si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

##### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

si vous:

- souffrez de mononucléose infectieuse (fièvre, maux de gorge, ganglions enflés et fatigue extrême)
- avez des problèmes rénaux
- N'urinez pas régulièrement

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

##### Tests sanguins et urinaires

Si vous devez effectuer :

- Des analyses d'urine (dosage du glucose) ou des analyses de sang pour explorer le fonctionnement de votre foie,
- Un dosage d'ostriol (utilisé pendant la grossesse pour vérifier que le bébé se développe normalement).

Informez votre médecin ou votre pharmacien que vous prenez AMOXIL. En effet, AMOXIL peut influer sur les résultats de ces tests.

##### Enfants

Sans objet.

##### Autres médicaments et AMOXIL :

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

- Si vous prenez de l'allopurinol (utilisé dans le traitement de la goutte) avec AMOXIL, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.
- Si vous prenez du probénécide (utilisé dans le traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'adapter votre dose d'AMOXIL.
- Si vous prenez des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine), vous pourriez avoir besoin d'effectuer des analyses sanguines supplémentaires.

AMOXIL peut

incer et du effets

sans objet.

##### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

##### Sportifs

Sans objet.

##### Conduite de véhicules et utilisation de machines

AMOXIL peut provoquer des effets indésirables (comme des réactions allergiques, des vertiges et des convulsions) susceptibles de réduire votre capacité à conduire. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à moins que vous vous sentiez bien.

##### AMOXIL comprimé dispersible contient de l'aspartam

L'aspartam (E951) est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive pour les patients ayant une maladie appelée « phénylcétoneurie ».

##### AMOXIL poudre pour suspension buvable contient :

- L'aspartam (E951) est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive pour les patients ayant une maladie appelée « phénylcétoneurie ».
- Le maltodextrine est absorbé sous forme de glucose. Si votre médecin vous a informé que vous avez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.
- En raison de la présence de benzoate de sodium (E221), ce médicament peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses et peut accroître le risque de jaunissement chez le nouveau-né.

#### 3. COMMENT PRENDRE AMOXIL ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Faire dissoudre complètement chaque comprimé dans un verre d'eau et bien remuer le mélange jusqu'à ce qu'il soit homogène. Avaler immédiatement le mélange ;
- Agiter bien le flacon avant chaque utilisation et utiliser la cuillère fournie avec le flacon ;
- Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être espacées d'au moins 4 heures.

##### Posologie habituelle :

##### Enfants pesant moins de 40 kg

Toutes les posologies sont déterminées en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.

- Votre médecin vous indiquera la quantité d'AMOXIL que vous devez administrer à votre bébé ou votre enfant.
- La posologie habituelle est de 40 mg à 90 mg par kilogramme de poids corporel et par jour, à administrer en deux ou trois prises.
- La dose maximale recommandée est de 100 mg par kilogramme de poids corporel et par jour.

##### Adultes, patients âgés et enfants pesant 40 kg ou plus

La forme suspension n'est pas adaptée aux adultes et enfants de plus de 40 Kg. La posologie habituelle d'AMOXIL est de 250 mg à 500 mg trois fois par jour ou 750 mg à 1 g toutes les 12h, selon la sévérité et le type d'infection.

- Infections sévères : 750 mg à 1 g trois fois par jour.
- Infection des voies urinaires : 3 g deux fois par jour pendant un jour.
- Maladie de Lyme (infection transmise par des parasites appelés tiques) : érythème migrant isolé (phase précoce - éruption cutanée circulaire rouge ou rose) ; 4 g par jour, manifestations systémiques (phase tardive - avec des symptômes plus graves lorsque la maladie est étendue à tout le corps) ; jusqu'à 6 g par jour.
- Ulcère de l'estomac : 750 mg ou 1 g deux fois par jour pendant 7 jours avec d'autres antibiotiques et médicaments destinés à traiter les ulcères de l'estomac.
- Pour prévenir les infections cardiaques en cas de chirurgie. La posologie varie selon le type de chirurgie. D'autres médicaments peuvent également être administrés simultanément. Votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère pourra vous donner plus de détails.