

ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

Nº P19-0033226

ND136141

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1687 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Saïti Ahmed

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade : Salati Ahmed Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

lumbalgia + dyspepsia

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.


J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>A. A. M. Mohammed HARMAZI M.Y ABDELLAH Rue Sidi Ali El Hachmi 58 - Ain Chock Télé: 03.22.21.73.64</i>	13-07-2020	260.10

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires



AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				
				
				
				
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H 25533412 00000000	21433552 00000000	D 00000000 35533411	G B 11433553
				
				
				
				

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur NAOUR Abdessadek
MEDECINE GENERALE

468. Bd Abdellah SANHAGI. 1^{re} étage
DRISSIA 2. CASABLANCA
Tél 0522 80 22 40

الدكتور ناور عبد الصادق
الطب العام

شارع عبد الله الصنهاجي. الطابق 1
الإدريسية 2. الدار البيضاء
الهاتف: 0522 80 22 40

13 JULY 2020
URGENCES : 0661-32-09-60
CASABLANCA Le.....
المستعجلات: 0661-32-09-60
البيضاء في

Selhi Ali

53.-00

- Relax - 140 + 38 بدماء

53.-10

109.-00

D. Stress

749 + 2

58.-00

98.-

Tannins 1000 mg

260.-10

749

ALAOUI Mohamed
PHARMACEUTICALS
Rue 30, N° 10 - Ain Chock
Hospital Med Sekkat - Casablanca
Tél: 05.22.21.73.64

synergia
Laboratoire de médecine nutritionnelle

COMPLEMENT ALIMENTAIRE
DESTINES AUX ADULTES ET
ADOLESCENTS STRESSES

Lot: DS11/19
DLC: 11/2022
P.P.C : 109,00 DH

DS



Les nutriments apportés par D-stress permettent d'adopter rapidement l'organisme à une situation de stress et d'en diminuer les conséquences comme par exemple la fatigue.



Tamsulosine Win® L.P.

Chlorhydrate de tamsulosine

0,4 mg

Gélule à libération prolongée

Voie Orale

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la remercier. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien. • Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE TAMSULOSINE WIN LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

Alpha-bloquants/Médicaments utilisés dans l'hypertrophie bénigne de la prostate - code ATC: G04CA02.

TAMSULOSINE WIN L.P.0,4mg contient de la tamsulosine, une substance qui appartient à une famille de médicaments appelée alpha-bloquants.

TAMSULOSINE WIN L.P.0,4mg est utilisé dans le traitement de certains troubles qui peuvent vous empêcher d'uriner normalement suite à une augmentation de volume (hypertrophie bénigne) de votre prostate.

Ce médicament est utilisé uniquement chez l'homme dans le traitement des douleurs du bas appareil urinaire associé à un élargissement de la glande prostatique (hyperplasie bénigne de la prostate). Ces douleurs peuvent être des difficultés à uriner (débit urinaire faible), miction goutte à goutte, besoin urgent d'uriner et envie d'uriner fréquemment aussi bien la nuit que le jour.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TAMSULOSINE WIN LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée?

Ne prenez jamais TAMSULOSINE WIN L.P. 0,4mg

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (la tamsulosine) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6). • Si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille (les alpha-bloquants). • Si vous avez déjà eu des gonflements (œdèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses) après avoir pris ce médicament.
- Si vous avez déjà eu auparavant une baisse de votre tension artérielle lors d'un passage de la position couchée à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges et de malaises (hypotension orthostatique). • Si vous avez une maladie sévère du foie (insuffisance hépatique sévère).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TAMSULOSINE WIN L.P.

- Vous devez prévenir votre médecin si :

- Vous prenez des médicaments pour traiter une tension artérielle élevée (antihypertenseurs).
- Vous avez déjà eu des malaises alors que vous urinez ou après avoir uriné (syncope mictionnelle).

- Vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale chronique).

- Vous avez plus de 65 ans.

- Vous avez des maladies du cœur (patient coronarien). En cas d'aggravation d'un angor, le traitement par ce médicament devra être interrompu.

Pendant le traitement, si vous avez des gonflements (œdèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses), cela peut être le signe d'une réaction allergique au médicament. Dans ce cas, vous devez arrêter le traitement et consulter immédiatement votre médecin.

Des malaises peuvent survenir rarement avec TAMSULOSINE WIN LP 0,4mg et des médicaments apparentés. Aux premiers signes de vertiges ou de faiblesse, vous devez vous asseoir ou vous allonger jusqu'à ce que les sensations de malaise disparaissent.

Si vous devez vous faire opérer de la cataracte ou du glaucome

Si vous devez vous faire opérer prochainement de la cataracte (opacité du cristallin) ou du glaucome, et si vous avez été ou êtes actuellement ou prévoyez d'être traité par TAMSULOSINE WIN L.P.0,4mg, informez-en votre ophtalmologue avant l'opération.

Le chirurgien pourra prendre des précautions appropriées en fonction de votre traitement au moment de l'intervention chirurgicale.

Recommandations concernant votre santé

**TAMSULOSINE WIN LP
0,4MG GELU 30**

P.P.V : 98DH00

6 118000 062257

Informez votre médecin ou votre pharmacien pourriez prendre tout autre médicament ordonnance.

Il est important d'informer votre médecin de médicaments qui peuvent diminuer l'effet (ex: ketaconazole, érythromycine).

Grossesse, allaITEMENT ET FERTILITÉ
TAMSULOSINE WIN LP 0,4mg n'est médicament au cours de la grossesse connus.

Chez l'homme, une éjaculation anormale. Cela signifie que le sperme ne sort pas progressivement ou bien le volume d'éjaculation phénomène est sans gravité.

Demandez conseil à votre médecin médicamenteux.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines
Ce médicament peut provoquer une brûlure debout, des vertiges ou des malaises, non recommandé de conduire un véhicule avec ces effets.

3. COMMENT PRENDRE TAMSULOSINE WIN LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée?

Veuillez à toujours prendre ce médicament sur prescription de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Posologie : La dose recommandée est de

Mode d'administration : Le médicament est administré par voie orale, avalée avec un verre d'eau sans être croqué.

Fréquence d'administration : • Vous pouvez prendre la gélule, de préférence, à la fin du petit déjeuner consistant, prenez votre gélule chaque jour au 3^e moment de prendre la gélule au petit déjeuner, prenez la gélule à jeun.

Durée du traitement : Ce traitement ne pourra être nécessaire de le poursuivre habituellement, TAMSULOSINE WIN LP 0,4mg effets sur la vessie et sur les mictions sont

Si vous avez pris plus de TAMSULOSINE WIN LP 0,4mg
Contactez rapidement un médecin et allez à l'hôpital.

Si vous oubliez de prendre TAMSULOSINE WIN LP 0,4mg
Si vous avez oublié 1 jour de traitement, poursuivez le traitement, le lendemain, ainsi.

Ne prenez pas de dose double pour compenser une dose oubliée.
Si vous avez pris plus de TAMSULOSINE WIN LP 0,4mg

Si vous arrêtez de prendre TAMSULOSINE WIN LP 0,4mg
Si vous arrêtez de prendre votre traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate pour

C'est pourquoi il est impératif de pourvoir médicament vous l'a prescrit, même si les troubles

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut causer des effets indésirables. Ils ne surviennent pas systématiquement.

Les effets suivants surviennent fréquemment
étourdissements, surtout lors du passage de l'urètre mais se dirige vers la vessie (éjaculation anormale (troubles de l'éjaculation

