

VER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ons générales :

cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

la validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Declaration de Maladie

N° P19- 0045825

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☒ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0560 Société : R.A.M.
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : Mr. ABAKIL Hamed
Date de naissance : 01-07-1943
Adresse : LOT BEN YAKHLEF Rue ALGHOFANE
N° 49 Mohammedia
Tél. : 05 23 33 52 48 Total des frais engagés : 540,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Farid ZEGHARI
5, AV. de la Marche Verte
Ben Yakhlef - Mohammedia
Tel. : 05 23 33 54 44

Date de consultation : 22/07/2020
Nom et prénom du malade : Bouzid Fatma Age : 1952
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : KTA - artériosclérose
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 07/08/2020

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 22/02/20 | C | 1 | 150 | Dr. Farid ZEGHARI 5. AV. de la Marche Verte Ben Yakhlef - Mohammedia Tel. : 05 23 33 54 44 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| EXECUTION DES ORDONNANCES | | |
|--|----------|-----------------------|
| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur | Date | Montant de la Facture |
| | 22/02/20 | 390,00 |
| | | |
| | | |

| ANALYSES - RADIOGRAPHIES | | | |
|---|------|------------------------------|------------------------|
| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| AUXILIAIRES MEDICAUX | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------------------|
| Cachet et signature du Praticien | Date des Soins | Nombre | | | | Montant détaillé des Honoraires |
| | | A M | P C | I M | I V | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important !

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

| SOINS DENTAIRES | Dents Traitées | Nature des Soins | Coefficient | | |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|--|--|
| | | | | COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/> | | | | |
| | | | | | |
| FIN D'EXECUTION <input type="text"/> | | | | | |
| | | | | | |

| O.D.F PROTHESES DENTAIRES | DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|--|
| | <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table> | H | 25533412 | 21433552 | D | 00000000 | 00000000 | G | 00000000 | 00000000 | B | 35533411 | 11433553 | COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> |
| | H | 25533412 | 21433552 | | | | | | | | | | | |
| | D | 00000000 | 00000000 | | | | | | | | | | | |
| | G | 00000000 | 00000000 | | | | | | | | | | | |
| | B | 35533411 | 11433553 | | | | | | | | | | | |
| | [Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession | MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DATE DU DEVIS <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Farid ZEGHARI

Médecine Générale
Echographie

الدكتور فريد الزغاري

الطب العام
فحص بالأشعة

Ben Yakhlef, le 22-7-2020 بني يخلف، في

Bouziat Fatma

4 x 68,1² TENORETIC 50/12,5 (4)

19 le matin.

4260 paric 7,5

19 à midi après repas

20 INES 20 (14)

1 gel au soir.

390,00

Dr. Farid ZEGHARI
5, AV. de la Marche Verte
Ben Yakhlef - Mohammedia
Tel. : 05 23 33 54 44

NOTICE : INFORMATION

TENORETIC 50 mg/12,5 mg, c

Aténolol/Chlo

euillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit.

Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

ans cette notice :

QU'EST-CE QUE TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable ?

COMMENT PRENDRE

comprimé pelliculé s

QUELS SONT LES EFFETS

COMMENT CONSERVER

comprimé pelliculé s

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
QI Zenata Ain sebaa Casablanca
Tenoretic 50mg/12,5mg

b30cp mv

P.P.V : 68,10 DH



6 118001

182350

5 mg,

NTUELS ?

2,5 mg,

1. QU'EST-CE QUE TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable ?

ANTIHYPERTENSIF

BETA-BLOQUANT

(C : système cardio-vasculaire)

Ce médicament est préconisé en cas d'hypertension artérielle

en cas d'insuffisance

Lot 90356
Exp 08 2021
Fab: 09 2018

NOTICE : INFORMATION

TENORETIC 50 mg/12,5 mg, c

Aténolol/Chlo

euillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit.

Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

ans cette notice :

**QU'EST-CE QUE TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE
AVANT DE PRENDRE TENORETIC 50 mg/12,5 mg,
comprimé pelliculé sécable ?**

COMMENT PRENDRE

comprimé pelliculé s

QUELS SONT LES EFFETS

COMMENT CONSERVER

comprimé pelliculé s

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
QI Zenata Ain sebaa Casablanca
Tenoretic 50mg/12,5mg

b30cp mv

P.P.V : 68,10 DH



6 118001

182350

5 mg,

NTUELS ?

2,5 mg,

1. QU'EST-CE QUE TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable ?

ANTIHYPERTENSIF

BETA-BLOQUANT

(C : système cardio-vasculaire)

Ce médicament est préconisé en cas d'hypertension artérielle

en cas d'insuffisance

Lot 90356
Exp 08 2021
Fab: 09 2018

NOTICE : INFORMATION

TENORETIC 50 mg/12,5 mg, c

Aténolol/Chlo

euillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit.

Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

ans cette notice :

**QU'EST-CE QUE TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE
AVANT DE PRENDRE TENORETIC 50 mg/12,5 mg,
comprimé pelliculé sécable ?**

COMMENT PRENDRE

comprimé pelliculé s

QUELS SONT LES EFFETS

COMMENT CONSERVER

comprimé pelliculé s

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
Ql Zenata Ain sebaa Casablanca
Tenoretic 50mg/12,5mg

b30cp mv

P.P.V : 68,10 DH



5 mg,

NTUELS ?

2,5 mg,

1. QU'EST-CE QUE TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable

ANTIHYPERTENSIF

BETA-BLOQUANT

(C : système cardio-vasculaire)

Ce médicament est préconisé en cas d'hypertension artérielle

en cas d'insuffisance

Lot 90356
Exp 08 2021
Fab: 09 2018

NOTICE : INFORMATION

TENORETIC 50 mg/12,5 mg, c

Aténolol/Chlo

euillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit.

Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

ans cette notice :

QU'EST-CE QUE TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable ?

COMMENT PRENDRE

comprimé pelliculé s

QUELS SONT LES EFFETS

COMMENT CONSERVER

comprimé pelliculé s

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
QI Zenata Ain sebaa Casablanca
Tenoretic 50mg/12,5mg

b30cp mv

P.P.V : 68,10 DH



6 118001

182350

5 mg,

NTUELS ?

2,5 mg,

1. QU'EST-CE QUE TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable ?

ANTIHYPERTENSIF

BETA-BLOQUANT

(C : système cardio-vasculaire)

Ce médicament est préconisé en cas d'hypertension artérielle

en cas d'insuffisance

Lot 90356
Exp 08 2021
Fab: 09 2018

NOTICE : INFORMATION

TENORETIC 50 mg/12,5 mg, c

Aténolol/Chlo

euillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit.

Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

ans cette notice :

QU'EST-CE QUE TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable ?

COMMENT PRENDRE

comprimé pelliculé s

QUELS SONT LES EFFETS

COMMENT CONSERVER

comprimé pelliculé s

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
Ql Zenata Ain sebaa Casablanca
Tenoretic 50mg/12,5mg

b30cp mv

P.P.V : 68,10 DH



6 118001

182350

5 mg,

NTUELS ?

2,5 mg,

1. QU'EST-CE QUE TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable ?

ANTIHYPERTENSIF

BETA-BLOQUANT

(C : système cardio-vasculaire)

Ce médicament est préconisé en cas d'hypertension artérielle

en cas d'insuffisance

Lot 90356
Exp 08 2021
Fab: 09 2018

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Notice

Mobic® 7,5 mg

Meloxicam

comprimé

Mobic® 15 mg

Meloxicam

comprimé sécable

Composition

La substance active est :

meloxicam 7,5 mg ou 15 mg

Les autres composants sont :

citrate de sodium, lactose monohydraté, cellulose microcristalline, povidone, silice colloïdale anhydre, crospovidone, stéarate de magnésium.

Pour 1 comprimé.

QU'EST CE QUE MOBIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament, présenté sous forme de comprimé ou comprimé sécable, est un anti-inflammatoire non stéroïdien.

Il est indiqué chez l'adulte

(plus de 15 ans), en traitement :

- de courte durée des douleurs aiguës d'arthrose
- de longue durée de certains rhumatismes inflammatoires.

INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE MOBIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable

Ne pas utiliser Mobic 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable dans les cas suivants :

- grossesse ou allaitement,
- antécédents d'allergie (crise d'asthme, polypes nasaux, brusque gonflement du cou et du visage (oedème de Quincke), urticaire déclenché par ce médicament ou un médicament apparenté tels que d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine,
- antécédents d'allergie à l'un des constituants du produit,
- ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien ayant récidivé ou en évolution,
- maladie grave du foie,
- maladie grave des reins non dialysée,
- maladie grave du cœur,
- saignement de toute nature.

Prendre des précautions particulières avec MOBIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable :

Il n'existe pas de données d'efficacité et de sécurité chez l'enfant de moins de 15 ans.

AVANT LE TRAITEMENT, PRENDRE UN MEDICIN EN CAS :

- d'antécédents digestifs (ou ulcère de l'estomac ou du duodénum),
- d'insuffisance cardiaque.



Boehringer
Ingelheim

- de maladie du cœur, du foie ou du rein,
- de traitement par diurétiques ou d'intervention chirurgicale récente.

AU COURS DU TRAITEMENT, ARRÊTER LE TRAITEMENT ET CONTACTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE en cas :

- d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration noire des selles). Des cas d'hémorragies fatales sont rapportés avec l'ensemble des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- de signes évocateurs d'une allergie à ce médicament, en particulier crise d'asthme, brusque gonflement du visage et du cou, décollement de la peau (cf. effets indésirables éventuels).

Ce médicament existe sous d'autres dosages ou d'autres formes pharmaceutiques qui peuvent être plus adaptés.

Dans tous les cas, la dose maximale recommandée de 15 mg / jour ne doit jamais être dépassée.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : **le meloxicam.**

Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'aspirine.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine.

Grossesse - Allaitement

Il est recommandé d'éviter la prise de ce médicament au cours de la grossesse.

Votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament au cours des 6 premiers mois de votre grossesse.

SI, CE MÉDICAMENT A PARTIR DU 3^{ème} TRIMESTRE, car ses effets peuvent avoir des conséquences graves sur le fœtus, il ne doit être pris qu'une seule fois.

Il convient d'éviter d'utiliser ce médicament pendant l'allaitement.

PPV: 42DH60

PER: 02/23

LOT: J373



