

**itions générales :**

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

**macie :**

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

**ologie et Biologie :**

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

**que :**

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

**ducation :**

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

**aire :**

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

**die et Affection Longue Durée ALD et ALC :**

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

**Adresses Mails utiles**

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

 **Maladie** **Dentaire** **Optique** **Autres****Cadre réservé à l'adhérent(e)**

Matricule : 8264

Société : R. A. N

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : J. E. S. S. I. A. P. G. L. I. A.

Date de naissance : 28/10/62

Adresse : 42, Rue Am. S. 2me Résidence Rosy Al-Jarrab

Boulevard Hassan II - CASA - ANFA


Tél. : 05 22 613 134

Total des frais engagés :

Dhs

**Cadre réservé au Médecin**

Cachet du médecin :



Date de consultation : 20/08/2020

Nom et prénom du malade : J. E. S. S. I. A. P. G. L. I. A.

Age : 58 ans

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Maladie de la peau

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : Maladie de la peau

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Le : 12/08/2020

Signature de l'adhérent(e) : M. J. S. S. I. A. P. G. L. I. A.

**ND: 3667**

*ZBNT S3*

*PSY*

*455000*

*Cabinet de Neurologie et de Psychologie*

*203, Bd. Zer touni - Casablanca*

*Tel: 05 22 95 01 36 - 37*

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>ARMERIA DE BOUDAGNE BERRADA TAIZI Bd. Zer touni Casablanca 05 22 95 01 36</i>	28/07/20	692,00 DT

### ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

**O.D.F PROTHESES DENTAIRES**

**DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE**

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
G	00000000	11433553
B	35533411	

**[Création, remont, adjonction]**  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EX**

*Docteur Benjelloun Touimi Jamal*

*Neuropsychiatre & Psychothérapeute*

*Sexologue*

*Thérapie du Couple*

*Adulte et Enfants*

*Electroencephalographie*

**الدكتور بن جلون التويمي جمال**

**اختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية**

**الأمراض الجنسية والصعوبات الجنسية**

**العلاج والتحليل النفسي**

**التخطيط الكهربائي للدماغ**

**الكبار والأطفال - الطب الشرعي والخبرة الجنائية**

Casablanca; le : ..... الدار البيضاء، في :

**MOUINE DALILA**

276,00

1- Seroquel 100 : 1 cp le soir

180,00

2- Fluoxet 20 : 1 cp 1 jour sur 2

29,50 x 8 = 236,00

3- Témesta 2.5 : 1 cp matin et midi  
2 cp le soir

197-06  
MURGOGNE  
BOZ Halima  
Cabinet de Dr Benjelloun Toumi  
RUE ZERKOUNI 203 Casablanca  
Tél: 05 22 80 01 37  
Fax: 05 22 80 01 38  
Dr. BENJELLOUN TOUMI  
Cabinet de Neuro-Psychiatre  
et de Sexologie  
203 Bd. Zerkouni Casablanca  
Tél: 05 22 80 01 36 / 05 22 80 01 37

*Treatment de 60 jours*

0522 95 01 37 / 0522 95 01 36 شارع الزر��ونی (قرب التوين) - الطابق الرابع - الدار البيضاء - الهاتف : 203

203, Bd. Zerkouni - (Près de Twin Center) - 4<sup>e</sup> Etage - Casablanca - Tél : 0522 95 01 36 / 0522 95 01 37

## Notice : Information de l'utilisateur

**Seroquel 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg comprimés pelliculés**

quétiapine fumarate

**Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

**Que contient cette notice:**

**Si vous arrêtez de prendre Seroquel**

Si vous arrêtez brusquement de peut-être incapable de dormir (insomnie) ou souffrir de maux de tête, de diarrées, vertiges ou d'irritabilité. Votre médecin pourra vous proposer de réduire progressivement la dose avant d'arrêter le traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. Quels sont les effets indésirables éventuels**

Comme tous les médicaments, Seroquel peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Si l'un des événements suivants se produit**

**SYNTHEMEDIC**22 rue zoubair bno al ouam roches  
noires casablanca**SEROQUEL**

100mg Cpr env

Boîte de 60

269/16 DMP/21/NSF P.P.V: 276,00DH Z



6 118001 021307



# Témosta® 2,5 mg

Lorazepam

comprimé sécable

TEMESTA 2,5MG

CP SEC B30

P.P.V : 29DH50



6 118000 011576

mg, comprimé sécable  
UTILISE ?

benzodiazépines.

• le traitement de l'anxiété  
oubles gênants, ou en

prévention et/ou traitement des manifestations liées à un  
sevrage alcoolique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable  
dans les cas suivants : • allergie connue à cette classe de  
produits ou à l'un des composants du médicament, •  
insuffisance respiratoire grave, • syndrome d'apnée du  
sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil), •  
insuffisance hépatique grave, • myasthénie (maladie  
caractérisée par une tendance excessive à la fatigue  
musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

Faites attention avec TEMESTA 2,5 mg, comprimé  
sécable

Mises en garde spéciales : Si une perte d'efficacité survient  
lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas  
la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner,  
surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance  
physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la  
survenue de la dépendance : • durée du traitement, • dose, •  
antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou  
non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces  
facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à  
votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer  
l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se  
caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en  
quelques jours, de signes tels que anxiété importante,  
insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer  
également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un  
engourdissement ou des picotements des extrémités, une  
sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts  
physiques, etc...

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être  
définies avec votre médecin.

La diminution très PROGRESSIVE des doses et  
l'espacement des prises représentent la meilleure prévention

de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant  
plus longue que le traitement aura été prolongé.

Malgré la décroissance progressive des doses, un  
phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec  
réapparition TRANSITOIRE des symptômes (anxiété) qui  
avaient justifié la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations des  
fonctions psychomotrices sont susceptibles d'apparaître  
dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des  
réactions contraires à l'effet recherché : insomnie,  
cauchemars, agitation, nervosité, euphorie ou irritabilité,  
tension, modifications de la conscience, voire des  
comportements potentiellement dangereux (agressivité  
envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles  
du comportement et des actes automatiques).

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent,  
contactez le plus rapidement possible votre médecin.  
Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être  
utilisés avec prudence chez le sujet âgé, en raison du risque  
de somnolence et/ou de relâchement musculaire qui peuvent  
favoriser les chutes, avec des conséquences souvent graves  
dans cette population.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit  
pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de  
malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en  
lactase (maladies métaboliques rares).

**Précautions d'emploi :** Ce traitement médicamenteux ne  
peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il  
convient de demander conseil à votre médecin. Il vous  
indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre  
l'anxiété.

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical  
renforcé notamment en cas d'insuffisance rénale, de maladie  
chronique du foie, d'alcoolisme et d'insuffisance respiratoire.  
Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez le sujet  
présentant une dépression, il ne doit pas être utilisé seul car il  
laisserait la dépression évoluer pour son propre compte avec  
persistance ou majoration du risque suicidaire.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la  
durée du traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments :** Si vous  
prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y  
compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en  
à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Grossesse :** Ce médicament ne sera utilisé pendant la  
grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous  
découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin,  
qui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le  
traitement.

**Allaitement :** Ce médicament passe dans le lait maternel :  
en conséquence, l'allaitement est déconseillé.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien  
avant de prendre tout médicament.

# Témosta® 2,5 mg

Lorazepam

comprimé sécable

TEMESTA 2,5MG

CP SEC B30

P.P.V : 29DH50



6 118000 011576

mg, comprimé sécable  
UTILISÉ ?

benzodiazépines.

• le traitement de l'anxiété  
oubles gênants, ou en

prévention et/ou traitement des manifestations liées à un  
sevrage alcoolique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable  
dans les cas suivants : • allergie connue à cette classe de  
produits ou à l'un des composants du médicament, •  
insuffisance respiratoire grave, • syndrome d'apnée du  
sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil), •  
insuffisance hépatique grave, • myasthénie (maladie  
caractérisée par une tendance excessive à la fatigue  
musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

Faites attention avec TEMESTA 2,5 mg, comprimé  
sécable

Mises en garde spéciales : Si une perte d'efficacité survient  
lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas  
la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner,  
surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance  
physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la  
survenue de la dépendance : • durée du traitement, • dose, •  
antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou  
non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces  
facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à  
votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer  
l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se  
caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en  
quelques jours, de signes tels que anxiété importante,  
insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer  
également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un  
engourdissement ou des picotements des extrémités, une  
sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts  
physiques, etc...

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être  
définies avec votre médecin.

La diminution très PROGRESSIVE des doses et  
l'espacement des prises représentent la meilleure prévention

de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant  
plus longue que le traitement aura été prolongé.

Malgré la décroissance progressive des doses, un  
phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec  
réapparition TRANSITOIRE des symptômes (anxiété) qui  
avaient justifié la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations des  
fonctions psychomotrices sont susceptibles d'apparaître  
dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des  
réactions contraires à l'effet recherché : insomnie,  
cauchemars, agitation, nervosité, euphorie ou irritabilité,  
tension, modifications de la conscience, voire des  
comportements potentiellement dangereux (agressivité  
envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles  
du comportement et des actes automatiques).

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent,  
contactez le plus rapidement possible votre médecin.  
Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être  
utilisés avec prudence chez le sujet âgé, en raison du risque  
de somnolence et/ou de relâchement musculaire qui peuvent  
favoriser les chutes, avec des conséquences souvent graves  
dans cette population.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit  
pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de  
malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en  
lactase (maladies métaboliques rares).

**Précautions d'emploi :** Ce traitement médicamenteux ne  
peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il  
convient de demander conseil à votre médecin. Il vous  
indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre  
l'anxiété.

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical  
renforcé notamment en cas d'insuffisance rénale, de maladie  
chronique du foie, d'alcoolisme et d'insuffisance respiratoire.  
Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez le sujet  
présentant une dépression, il ne doit pas être utilisé seul car il  
laisserait la dépression évoluer pour son propre compte avec  
persistance ou majoration du risque suicidaire.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la  
durée du traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments :** Si vous  
prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y  
compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en  
à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Grossesse :** Ce médicament ne sera utilisé pendant la  
grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous  
découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin,  
qui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le  
traitement.

**Allaitement :** Ce médicament passe dans le lait maternel :  
en conséquence, l'allaitement est déconseillé.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien  
avant de prendre tout médicament.

# Témosta® 2,5 mg

Lorazepam

comprimé sécable

TEMESTA 2,5MG

CP SEC B30

P.P.V : 29DH50



6 118000 011576

mg, comprimé sécable  
UTILISE ?

benzodiazépines.

• le traitement de l'anxiété  
oubles gênants, ou en

prévention et/ou traitement des manifestations liées à un  
sevrage alcoolique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable  
dans les cas suivants : • allergie connue à cette classe de  
produits ou à l'un des composants du médicament, •  
insuffisance respiratoire grave, • syndrome d'apnée du  
sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil), •  
insuffisance hépatique grave, • myasthénie (maladie  
caractérisée par une tendance excessive à la fatigue  
musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

Faites attention avec TEMESTA 2,5 mg, comprimé  
sécable

Mises en garde spéciales : Si une perte d'efficacité survient  
lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas  
la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner,  
surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance  
physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la  
survenue de la dépendance : • durée du traitement, • dose, •  
antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou  
non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces  
facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à  
votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer  
l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se  
caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en  
quelques jours, de signes tels que anxiété importante,  
insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer  
également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un  
engourdissement ou des picotements des extrémités, une  
sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts  
physiques, etc...

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être  
définies avec votre médecin.

La diminution très PROGRESSIVE des doses et  
l'espacement des prises représentent la meilleure prévention

de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant  
plus longue que le traitement aura été prolongé.

Malgré la décroissance progressive des doses, un  
phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec  
réapparition TRANSITOIRE des symptômes (anxiété) qui  
avaient justifié la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations des  
fonctions psychomotrices sont susceptibles d'apparaître  
dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des  
réactions contraires à l'effet recherché : insomnie,  
cauchemars, agitation, nervosité, euphorie ou irritabilité,  
tension, modifications de la conscience, voire des  
comportements potentiellement dangereux (agressivité  
envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles  
du comportement et des actes automatiques).

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent,  
contactez le plus rapidement possible votre médecin.  
Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être  
utilisés avec prudence chez le sujet âgé, en raison du risque  
de somnolence et/ou de relâchement musculaire qui peuvent  
favoriser les chutes, avec des conséquences souvent graves  
dans cette population.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit  
pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de  
malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en  
lactase (maladies métaboliques rares).

**Précautions d'emploi :** Ce traitement médicamenteux ne  
peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il  
convient de demander conseil à votre médecin. Il vous  
indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre  
l'anxiété.

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical  
renforcé notamment en cas d'insuffisance rénale, de maladie  
chronique du foie, d'alcoolisme et d'insuffisance respiratoire.  
Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez le sujet  
présentant une dépression, il ne doit pas être utilisé seul car il  
laisserait la dépression évoluer pour son propre compte avec  
persistance ou majoration du risque suicidaire.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la  
durée du traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments :** Si vous  
prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y  
compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en  
à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Grossesse :** Ce médicament ne sera utilisé pendant la  
grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous  
découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin,  
qui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le  
traitement.

**Allaitement :** Ce médicament passe dans le lait maternel :  
en conséquence, l'allaitement est déconseillé.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien  
avant de prendre tout médicament.

# Témosta® 2,5 mg

Lorazepam

comprimé sécable

TEMESTA 2,5MG

CP SEC B30

P.P.V : 29DH50



6 118000 011576

mg, comprimé sécable  
UTILISE ?

benzodiazépines.

• le traitement de l'anxiété  
oubles gênants, ou en

prévention et/ou traitement des manifestations liées à un  
sevrage alcoolique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable  
dans les cas suivants : • allergie connue à cette classe de  
produits ou à l'un des composants du médicament, •  
insuffisance respiratoire grave, • syndrome d'apnée du  
sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil), •  
insuffisance hépatique grave, • myasthénie (maladie  
caractérisée par une tendance excessive à la fatigue  
musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

Faites attention avec TEMESTA 2,5 mg, comprimé  
sécable

Mises en garde spéciales : Si une perte d'efficacité survient  
lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas  
la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner,  
surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance  
physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la  
survenue de la dépendance : • durée du traitement, • dose, •  
antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou  
non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces  
facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à  
votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer  
l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se  
caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en  
quelques jours, de signes tels que anxiété importante,  
insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer  
également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un  
engourdissement ou des picotements des extrémités, une  
sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts  
physiques, etc...

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être  
définies avec votre médecin.

La diminution très PROGRESSIVE des doses et  
l'espacement des prises représentent la meilleure prévention

de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant  
plus longue que le traitement aura été prolongé.

Malgré la décroissance progressive des doses, un  
phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec  
réapparition TRANSITOIRE des symptômes (anxiété) qui  
avaient justifié la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations des  
fonctions psychomotrices sont susceptibles d'apparaître  
dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des  
réactions contraires à l'effet recherché : insomnie,  
cauchemars, agitation, nervosité, euphorie ou irritabilité,  
tension, modifications de la conscience, voire des  
comportements potentiellement dangereux (agressivité  
envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles  
du comportement et des actes automatiques).

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent,  
contactez le plus rapidement possible votre médecin.  
Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être  
utilisés avec prudence chez le sujet âgé, en raison du risque  
de somnolence et/ou de relâchement musculaire qui peuvent  
favoriser les chutes, avec des conséquences souvent graves  
dans cette population.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit  
pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de  
malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en  
lactase (maladies métaboliques rares).

**Précautions d'emploi :** Ce traitement médicamenteux ne  
peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il  
convient de demander conseil à votre médecin. Il vous  
indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre  
l'anxiété.

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical  
renforcé notamment en cas d'insuffisance rénale, de maladie  
chronique du foie, d'alcoolisme et d'insuffisance respiratoire.  
Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez le sujet  
présentant une dépression, il ne doit pas être utilisé seul car il  
laisserait la dépression évoluer pour son propre compte avec  
persistance ou majoration du risque suicidaire.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la  
durée du traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments :** Si vous  
prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y  
compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en  
à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Grossesse :** Ce médicament ne sera utilisé pendant la  
grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous  
découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin,  
qui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le  
traitement.

**Allaitement :** Ce médicament passe dans le lait maternel :  
en conséquence, l'allaitement est déconseillé.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien  
avant de prendre tout médicament.

# Témosta® 2,5 mg

Lorazepam

comprimé sécable

TEMESTA 2,5MG

CP SEC B30

P.P.V : 29DH50



6 118000 011576

mg, comprimé sécable  
UTILISE ?

benzodiazépines.

• le traitement de l'anxiété  
oubles gênants, ou en

prévention et/ou traitement des manifestations liées à un  
sevrage alcoolique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable  
dans les cas suivants : • allergie connue à cette classe de  
produits ou à l'un des composants du médicament, •  
insuffisance respiratoire grave, • syndrome d'apnée du  
sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil), •  
insuffisance hépatique grave, • myasthénie (maladie  
caractérisée par une tendance excessive à la fatigue  
musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

Faites attention avec TEMESTA 2,5 mg, comprimé  
sécable

Mises en garde spéciales : Si une perte d'efficacité survient  
lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas  
la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner,  
surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance  
physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la  
survenue de la dépendance : • durée du traitement, • dose, •  
antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou  
non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces  
facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à  
votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer  
l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se  
caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en  
quelques jours, de signes tels que anxiété importante,  
insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer  
également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un  
engourdissement ou des picotements des extrémités, une  
sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts  
physiques, etc...

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être  
définies avec votre médecin.

La diminution très PROGRESSIVE des doses et  
l'espacement des prises représentent la meilleure prévention

de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant  
plus longue que le traitement aura été prolongé.

Malgré la décroissance progressive des doses, un  
phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec  
réapparition TRANSITOIRE des symptômes (anxiété) qui  
avaient justifié la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations des  
fonctions psychomotrices sont susceptibles d'apparaître  
dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des  
réactions contraires à l'effet recherché : insomnie,  
cauchemars, agitation, nervosité, euphorie ou irritabilité,  
tension, modifications de la conscience, voire des  
comportements potentiellement dangereux (agressivité  
envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles  
du comportement et des actes automatiques).

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent,  
contactez le plus rapidement possible votre médecin.  
Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être  
utilisés avec prudence chez le sujet âgé, en raison du risque  
de somnolence et/ou de relâchement musculaire qui peuvent  
favoriser les chutes, avec des conséquences souvent graves  
dans cette population.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit  
pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de  
malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en  
lactase (maladies métaboliques rares).

**Précautions d'emploi :** Ce traitement médicamenteux ne  
peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il  
convient de demander conseil à votre médecin. Il vous  
indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre  
l'anxiété.

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical  
renforcé notamment en cas d'insuffisance rénale, de maladie  
chronique du foie, d'alcoolisme et d'insuffisance respiratoire.  
Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez le sujet  
présentant une dépression, il ne doit pas être utilisé seul car il  
laisserait la dépression évoluer pour son propre compte avec  
persistance ou majoration du risque suicidaire.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la  
durée du traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments :** Si vous  
prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y  
compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en  
à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Grossesse :** Ce médicament ne sera utilisé pendant la  
grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous  
découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin,  
qui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le  
traitement.

**Allaitement :** Ce médicament passe dans le lait maternel :  
en conséquence, l'allaitement est déconseillé.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien  
avant de prendre tout médicament.

# Témosta® 2,5 mg

Lorazepam

comprimé sécable

TEMESTA 2,5MG

CP SEC B30

P.P.V : 29DH50



6 118000 011576

mg, comprimé sécable  
UTILISÉ ?

benzodiazépines.

• le traitement de l'anxiété  
oubles gênants, ou en

prévention et/ou traitement des manifestations liées à un  
sevrage alcoolique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable  
dans les cas suivants : • allergie connue à cette classe de  
produits ou à l'un des composants du médicament, •  
insuffisance respiratoire grave, • syndrome d'apnée du  
sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil), •  
insuffisance hépatique grave, • myasthénie (maladie  
caractérisée par une tendance excessive à la fatigue  
musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

Faites attention avec TEMESTA 2,5 mg, comprimé  
sécable

Mises en garde spéciales : Si une perte d'efficacité survient  
lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas  
la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner,  
surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance  
physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la  
survenue de la dépendance : • durée du traitement, • dose, •  
antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou  
non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces  
facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à  
votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer  
l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se  
caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en  
quelques jours, de signes tels que anxiété importante,  
insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer  
également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un  
engourdissement ou des picotements des extrémités, une  
sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts  
physiques, etc...

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être  
définies avec votre médecin.

La diminution très PROGRESSIVE des doses et  
l'espacement des prises représentent la meilleure prévention

de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant  
plus longue que le traitement aura été prolongé.

Malgré la décroissance progressive des doses, un  
phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec  
réapparition TRANSITOIRE des symptômes (anxiété) qui  
avaient justifié la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations des  
fonctions psychomotrices sont susceptibles d'apparaître  
dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des  
réactions contraires à l'effet recherché : insomnie,  
cauchemars, agitation, nervosité, euphorie ou irritabilité,  
tension, modifications de la conscience, voire des  
comportements potentiellement dangereux (agressivité  
envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles  
du comportement et des actes automatiques).

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent,  
contactez le plus rapidement possible votre médecin.  
Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être  
utilisés avec prudence chez le sujet âgé, en raison du risque  
de somnolence et/ou de relâchement musculaire qui peuvent  
favoriser les chutes, avec des conséquences souvent graves  
dans cette population.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit  
pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de  
malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en  
lactase (maladies métaboliques rares).

**Précautions d'emploi :** Ce traitement médicamenteux ne  
peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il  
convient de demander conseil à votre médecin. Il vous  
indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre  
l'anxiété.

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical  
renforcé notamment en cas d'insuffisance rénale, de maladie  
chronique du foie, d'alcoolisme et d'insuffisance respiratoire.  
Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez le sujet  
présentant une dépression, il ne doit pas être utilisé seul car il  
laisserait la dépression évoluer pour son propre compte avec  
persistance ou majoration du risque suicidaire.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la  
durée du traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments :** Si vous  
prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y  
compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en  
à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Grossesse :** Ce médicament ne sera utilisé pendant la  
grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous  
découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin,  
qui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le  
traitement.

**Allaitement :** Ce médicament passe dans le lait maternel :  
en conséquence, l'allaitement est déconseillé.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien  
avant de prendre tout médicament.

# Témosta® 2,5 mg

Lorazepam

comprimé sécable

TEMESTA 2,5MG

CP SEC B30

P.P.V : 29DH50



6 118000 011576

mg, comprimé sécable  
UTILISÉ ?

benzodiazépines.

• le traitement de l'anxiété  
oubles gênants, ou en

prévention et/ou traitement des manifestations liées à un  
sevrage alcoolique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable  
dans les cas suivants : • allergie connue à cette classe de  
produits ou à l'un des composants du médicament, •  
insuffisance respiratoire grave, • syndrome d'apnée du  
sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil), •  
insuffisance hépatique grave, • myasthénie (maladie  
caractérisée par une tendance excessive à la fatigue  
musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

Faites attention avec TEMESTA 2,5 mg, comprimé  
sécable

Mises en garde spéciales : Si une perte d'efficacité survient  
lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas  
la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner,  
surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance  
physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la  
survenue de la dépendance : • durée du traitement, • dose, •  
antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou  
non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces  
facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à  
votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer  
l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se  
caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en  
quelques jours, de signes tels que anxiété importante,  
insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer  
également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un  
engourdissement ou des picotements des extrémités, une  
sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts  
physiques, etc...

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être  
définies avec votre médecin.

La diminution très PROGRESSIVE des doses et  
l'espacement des prises représentent la meilleure prévention

de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant  
plus longue que le traitement aura été prolongé.

Malgré la décroissance progressive des doses, un  
phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec  
réapparition TRANSITOIRE des symptômes (anxiété) qui  
avaient justifié la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations des  
fonctions psychomotrices sont susceptibles d'apparaître  
dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des  
réactions contraires à l'effet recherché : insomnie,  
cauchemars, agitation, nervosité, euphorie ou irritabilité,  
tension, modifications de la conscience, voire des  
comportements potentiellement dangereux (agressivité  
envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles  
du comportement et des actes automatiques).

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent,  
contactez le plus rapidement possible votre médecin.  
Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être  
utilisés avec prudence chez le sujet âgé, en raison du risque  
de somnolence et/ou de relâchement musculaire qui peuvent  
favoriser les chutes, avec des conséquences souvent graves  
dans cette population.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit  
pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de  
malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en  
lactase (maladies métaboliques rares).

**Précautions d'emploi :** Ce traitement médicamenteux ne  
peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il  
convient de demander conseil à votre médecin. Il vous  
indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre  
l'anxiété.

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical  
renforcé notamment en cas d'insuffisance rénale, de maladie  
chronique du foie, d'alcoolisme et d'insuffisance respiratoire.  
Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez le sujet  
présentant une dépression, il ne doit pas être utilisé seul car il  
laisserait la dépression évoluer pour son propre compte avec  
persistance ou majoration du risque suicidaire.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la  
durée du traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments :** Si vous  
prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y  
compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en  
à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Grossesse :** Ce médicament ne sera utilisé pendant la  
grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous  
découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin,  
qui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le  
traitement.

**Allaitement :** Ce médicament passe dans le lait maternel :  
en conséquence, l'allaitement est déconseillé.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien  
avant de prendre tout médicament.

# Témosta® 2,5 mg

Lorazepam

comprimé sécable

TEMESTA 2,5MG

CP SEC B30

P.P.V : 29DH50



6 118000 011576

mg, comprimé sécable  
UTILISÉ ?

benzodiazépines.

• le traitement de l'anxiété  
oubles gênants, ou en

prévention et/ou traitement des manifestations liées à un  
sevrage alcoolique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable  
dans les cas suivants : • allergie connue à cette classe de  
produits ou à l'un des composants du médicament, •  
insuffisance respiratoire grave, • syndrome d'apnée du  
sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil), •  
insuffisance hépatique grave, • myasthénie (maladie  
caractérisée par une tendance excessive à la fatigue  
musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

Faites attention avec TEMESTA 2,5 mg, comprimé  
sécable

Mises en garde spéciales : Si une perte d'efficacité survient  
lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas  
la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner,  
surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance  
physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la  
survenue de la dépendance : • durée du traitement, • dose, •  
antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou  
non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces  
facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à  
votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer  
l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se  
caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en  
quelques jours, de signes tels que anxiété importante,  
insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer  
également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un  
engourdissement ou des picotements des extrémités, une  
sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts  
physiques, etc...

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être  
définies avec votre médecin.

La diminution très PROGRESSIVE des doses et  
l'espacement des prises représentent la meilleure prévention

de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant  
plus longue que le traitement aura été prolongé.

Malgré la décroissance progressive des doses, un  
phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec  
réapparition TRANSITOIRE des symptômes (anxiété) qui  
avaient justifié la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations des  
fonctions psychomotrices sont susceptibles d'apparaître  
dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des  
réactions contraires à l'effet recherché : insomnie,  
cauchemars, agitation, nervosité, euphorie ou irritabilité,  
tension, modifications de la conscience, voire des  
comportements potentiellement dangereux (agressivité  
envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles  
du comportement et des actes automatiques).

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent,  
contactez le plus rapidement possible votre médecin.  
Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être  
utilisés avec prudence chez le sujet âgé, en raison du risque  
de somnolence et/ou de relâchement musculaire qui peuvent  
favoriser les chutes, avec des conséquences souvent graves  
dans cette population.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit  
pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de  
malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en  
lactase (maladies métaboliques rares).

**Précautions d'emploi :** Ce traitement médicamenteux ne  
peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il  
convient de demander conseil à votre médecin. Il vous  
indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre  
l'anxiété.

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical  
renforcé notamment en cas d'insuffisance rénale, de maladie  
chronique du foie, d'alcoolisme et d'insuffisance respiratoire.  
Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez le sujet  
présentant une dépression, il ne doit pas être utilisé seul car il  
laisserait la dépression évoluer pour son propre compte avec  
persistance ou majoration du risque suicidaire.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la  
durée du traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments :** Si vous  
prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y  
compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en  
à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Grossesse :** Ce médicament ne sera utilisé pendant la  
grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous  
découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin,  
qui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le  
traitement.

**Allaitement :** Ce médicament passe dans le lait maternel :  
en conséquence, l'allaitement est déconseillé.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien  
avant de prendre tout médicament.