

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

37 pob

Déclaration de Maladie : N° P19- 0020094

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : **3496** Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : **BENCHAKROUN AFIFA** Date de naissance : **30-05-1956**

Adresse : **AL Rve Haj Zidali ELADUFIR Resd SALAM APT B1 Praticien CASA**

Tél. : **06.65.99.37.44** Total des frais engagés : Dhs
05.20.30.65-16

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. BENCHAKROUNE DTISS
Cardiologue - Rythmologue
193, Bd. Oum Rabii Oulha - Casablanca
Tel : 0522 90 80 20 - Org. : 06 61 14 87 87

Date de consultation : **03/06/2020**

Nom et prénom du malade : **Benchakroune Afifa** Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant


Nature de la maladie : **Angina** **un 1/2**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **Casablanca**

Signature de l'adhérent(e) : 

Le : **03/06/2020**

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03/06/2010	CS + ECG	150,00	Dr. BENCHAKROUNE Driss Cardiologue Rythmologue 193 Bd. Oum Rabii Oufa - Casablanca Tel: 0522 90 80 20 - Urg.: 06 61 14 87 87	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Universitaire Jilali El Jaziri 106, Rue Jilali El Jaziri Bd. 05 22 98 09 06 - Casablanca	03/06/2010	786,50

Dr. BENCHAKROUNE Driss ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Médecin	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. BENCHAKROUNE Driss Cardiologue Rythmologue 193, Bd. Oum Rabii Oufa - Casablanca Tel: 0522 90 80 20 - Urg.: 06 61 14 87 87	03/06/2010	EDC	800,00
Dr. BENCHAKROUNE Driss Cardiologue Rythmologue 193, Bd. Oum Rabii Oufa - Casablanca Tel: 0522 90 80 20 - Urg.: 06 61 14 87 87	03/06/2010	EDU	800,00

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CCEFFICIENT DES TRAVAUX
				
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES

H	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
25533412	21433552
00000000	00000000

D	H
00000000	00000000
35533411	11433553

B	G
00000000	00000000

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

r Driss BENCHAKROUNE

Cardiologue - Rythmologue

Collégié de la faculté de médecine de Rabat

Plomé en rythmologie de l'université de Bordeaux

Ancien médecin des hôpitaux de Bruxelles

Ancien médecin de l'hôpital militaire de Rabat

دكتور بن شقرنون ادريس

متخصص في أمراض القلب والشرايين

متخصص في اضطرابات نبضات القلب

خريج كلية الطب بالرباط و بوردو (فرنسا)

طبيب سابق بمستشفيات بروكسل (بلجيكا)

طبيب سابق بالمستشفى العسكري (الرباط)

CABINET DE CONSULTATIONS ET D'EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

Electrocardiogramme

Echographie cardiaque
trans-thoracique

Echographie cardiaque
trans-oesophagienne

Echographie doppler
vasculaire

Holter rythmique

Holter tensionnel

Epreuve d'effort

Rythmologie diagnostique
et interventionnelle

Implantation de pacemaker

Implantation de
défibrillateur

Electrophysiologie
endocavitaire

Exploration des troubles
du rythme cardiaque
et palpitations

Casablanca, le .03./06./2020

NOTE D'HONORAIRES

Nom : Benchakroune

Prénom : Afif

<input checked="" type="checkbox"/>	Consultation + ECG	= 250,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Echodoppler cardiaque	= 800,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Echodoppler vasculaire	= 800,00
<input type="checkbox"/>	Holter ECG	=
<input type="checkbox"/>	Holter tensionnel	=
<input type="checkbox"/>	Contrôle de Pacemaker	=
<input type="checkbox"/>	Contrôle de Défibrillateur	=
<input type="checkbox"/>	Autre :,.....	=

TOTAL = 1850,00 DHS

Total (en lettres) : Mille huit cent cinquante DHS

TP :36046312 ICE:001893439000027 IF:20744261

Dr. BENCHAKROUNE Driss
Cardiologue - Rythmologue
193, Bd. Oum Rabii Oulfa Casablanca
Tél. 0522 90 80 20 - URG. : 06 61 11 87 87

193, bd Oum Rabii - 2ème étage - Oulfa - Casablanca
شارع أم الريـعـ - ولـفـا - الـبـيـاضـ

(au dessus laboratoire ORBIO - Face Lydec)

[Tapez un texte] Tel:05 22 90 80 20

Portable/WhatsApp : 07 77 04 78 68

Email : driss.benchakroune@gmail.com



Dr Driss BENCHAKROUNE

Cardiologue - Rythmologue

Diplômé de la faculté de médecine de Rabat

Diplômé en rythmologie de l'université de Bordeaux

Ancien médecin des hôpitaux de Bruxelles

Ancien médecin de l'hôpital militaire de Rabat

دكتور بنشررون ادريس

متخصص في أمراض القلب والشرايين

متخصص في اضطرابات نبضات القلب

خريج كلية الطب بالرباط و بوردو (فرنسا)

طبيب سابق بمستشفيات بروكسل (بلجيكا)

طبيب سابق بالمستشفى العسكري (الرباط)

CABINET DE CONSULTATIONS

ET D'EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

Electrocardiogramme

Echographie cardiaque

trans-thoracique

03/06/2020

ORDONNANCE

Echographie cardiaque
trans-oesophagienne

Echographie doppler
vasculaire

Holter rythmique

Holter tensionnel

Epreuve d'effort

Rythmologie diagnostique
et interventionnelle

Implantation de pacemaker

Implantation de
défibrillateur

Electrophysiologie
endocavitaire

Exploration des troubles
du rythme cardiaque
et palpitations

Mme BENCHAKROUNE Afifa

ASKARDIL 75 mg : 1 comp. par jour à midi

GINMAG B6 : 1 ampoule par jour pendant 20 jours

NOLIP 10 mg : 1 comp le soir

(TRAITEMENT DE 03 MOIS / ne pas arrêter sans avis médical)

Prochain RDV : 03 mois (le/...../.....)



193, bd Oum Rabii - 2ème étage - Oulfa - Casablanca

شارع أم الريـعـ - ولـفـا - الـبـيـضاـ

(au dessus laboratoire ORBIO - Face Lydec)

Tel : 05 22 90 80 20

Portable/WhatsApp : 07 77 04 78 68

Email : driss.benchakroune@gmail.com



ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés
disponibles

PPV 22DH40
EXP 01/2022
LOT 90039 7

ASKARDIL® Acide acétylsalicylique)

PRESENTATIONS
boîte de 30 comprimés
boîte de 30 comprimés

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés
disponibles

PPV 22DH40
EXP 11/2021
LOT 98004 6

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés
disponibles

PPV 22DH40
EXP 01/2022
LOT 90039 7

QUE

action plaquettaire, héparine exclue

EDICAMENT?

est prescrit dans certaines maladies du cœur ou des vaisseaux
Ils
site que sur prescription de votre médecin.

Conté : N°DA 20150206205DMP/21RQv2

ce avant fin / Best before end of :

PPC : 124.00 DH	UTAV : 01/24	Lot : 20/002
GINMAG B6 10 Ampoules		

IPHADERM

75 mg

160 mg



GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Au cours de la grossesse, ce médicament peut être prescrit par votre médecin à dose très faible.
Ces doses ne peuvent pas être utilisées dans le traitement de la fièvre et la douleur.

Il ne faut pas dépasser les doses prescrites et ne pas prendre d'autres médicaments contenant de l'aspirine à partir du 6^e mois de la grossesse.

Ce médicament passe dans le lait maternel, il est déconseillé au cours de l'allaitement.
D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOIRE

- Aspartame : est contenu indiqué en cas de phénylkétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance).
COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT?

a- Posologie :

DANS TOUTS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.
A TITRE INDICATIF, LA POSOLOGIE USUELLE EST :

1 comprimé dissoluble par jour.

Il ne sera administré que sur prescription médicale.

ASKARDIL® est réservé à l'adulte.

ASKARDIL® 75 mg n'est pas adapté aux situations d'urgence médicale.

b- Mode et voie d'administration :

Dissoudre le comprimé d'ASKARDIL® dans un verre d'eau.

doit être administré :
médecin.

médecin.

médecin en particulier s'il s'agit d'un enfant.
le omises continuer le traitement et aviser le

T CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER

lement : saignement des gencives, du nez,
ts.

lement du visage, du cou, une éruption
de baisse de l'audition peuvent

ne.
ement et avertir votre médecin.
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN POUR
SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE

mentionnée sur la boîte.

à l'abri de l'humidité.

mais son absorption n'est pas toujours sans

Autorisation Ministère de Santé : N°DA 20150206205DMP/21RQv2

A consommer de préférence avant fin / Best before end of :

Lot n° / Batch n° :

A UT. AV. FIN: 01/2024

LOT: 1

GINMAG B6 10 Ampoules

PPC : 124.00 DH

Ut Av :	Lot :
01/24	20/002

IPHADERM

ACL : 7671737

- Uricosuriques : diminution de l'effet uricosurique.
 - Méthotrexate utilisé à des doses > 15 mg/semaine, augmentation de la toxicité surtout hématologique.
 - Autres anti-inflammatoires : majoration du risque ulcérogène et hémorragique si l'aspirine est administrée à des doses > 3 g/j.
 - Héparine.
- SIGNEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A BASE D'ASPIRINE A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AFIN DE NE PAS DEPASSER LES DOSES MAXIMALES CONSEILLÉES.



3 525720 001481

V008 - 01/18 - ETGIMA148



3 525720 001481

V008 - 01/18 - ETGIMA148

alle votre médecin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance: suivez le traitement prescrit,
ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments; suivez ses conseils

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

NE LAISSEZ PAS LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS.

Laboratoires de Produits Pharmaceutiques d'Afrique du Nord

LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca

151009F56086P051212

Lot n° :

EXP :

PPV :

Lot n° :

EXP :

PPV :

Lot n° :

EXP :

PPV :

157,10

®

mg et 20 mg primés pelliculés

e avant de prendre ce médicament.

lire.
ute, demandez plus d'informations à votre

le donnez jamais à quelqu'un d'autre.
être nocif.
us remarquez un effet indésirable non
à votre pharmacien.

Par comprimé pelliculé	10,395 mg
	10,000 mg
	20,790 mg
	20,000 mg
microcristalline, Citrate de sodium, Stéarate	

7.

avec hypercholestérolémies pures (type II a
les) ou dyslipidémies mixtes (type II b), en
et aux autres traitements non pharmacolo-

- Hypercholesterolemie familiale homozygote, en complément d'un régime et d'autres traitements hypolipidémiant (notamment l'aphérèse des LDL) ou lorsque ces traitements ne sont pas appropriés.

Prévention des événements cardiovasculaires :

- Prévention des événements cardiovasculaires majeurs chez les patients estimés à haut risque de faire un premier événement cardiovasculaire, en complément de la correction des autres facteurs de risque.

5. POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Mode et voie d'administration :

Voie orale.

NOLIP® peut être administré à tout moment de la journée, indépendamment des repas.

Durée du traitement et fréquence d'administration:

Avant de débuter le traitement, le patient doit suivre un régime hypocoolestérolémiant adapté qu'il devra continuer pendant toute la durée du traitement.

La posologie sera adaptée selon l'objectif thérapeutique et la réponse du patient, en fonction des recommandations en vigueur.

Traitement des hypercholestérolémies :

La dose initiale recommandée est de 5 ou 10 mg une fois/jour par voie orale aussi bien chez les patients naïfs que chez les patients précédemment traités par un autre inhibiteur de l'HMG-CoA réductase. Pour un patient donné, le choix de la dose initiale devra tenir compte du taux de LDL-C, du risque cardiovasculaire potentiel ainsi que du risque de survenue d'effets indésirables.

Une augmentation de la posologie à la dose supérieure peut se faire après 4 semaines si besoin.

Compte tenu de l'augmentation du nombre d'effets indésirables observés à la dose de 40 mg par rapport aux doses plus faibles, une dose moyenne de 40 mg (2 fois 20 mg) ne sera épousée que

la normale.

- Insuffisance rénale sévère (clartance de la créatinine < 30 ml/min).
- Myopathie.
- Chez les patients recevant de la ciclosporine de façon concomitante.
- Grossesse, allaitement et chez les femmes en âge de procréer n'utilisant pas de moyens contraceptifs appropriés.

La dose de 40 mg est contre-indiquée chez les patients présentant des facteurs prédisposants de myopathie/rhabdomyolyse. Ces facteurs incluent :

- Insuffisance rénale modérée (clartance de la créatinine < 60 ml/min).
- Hypothyroïdie.
- Antécédents personnels ou familiaux de maladies musculaires génétiques.
- Antécédents personnels d'atteinte musculaire avec un autre inhibiteur de l'HMG-CoA réductase ou un fibrate.
- Consommation excessive d'alcool.
- Situations favorisant une élévation des taux plasmatiques de rosuvastatine.
- Patients asthmatiques.
- Association aux fibrates.

7. EFFETS INDESIRABLES

COMME TOUS LES MEDICAMENTS, CE MEDICAMENT PEUT PROVOQUER DES EFFETS INDESIRABLES, MAIS ILS NE SURVIENNENT PAS SYSTEMATIQUEMENT CHEZ TOUT LE MONDE.

- **Affections endocriniennes :** diabète de type II.
- **Affections du système nerveux :** céphalées et sensations vertigineuses.
- **Affections gastro-intestinales :** constipation, nausées et douleur abdominale.
- **Affections de la peau et du tissu sous cutané :** Prurit, rash et urticaire.
- **Affections musculosquelettiques et systémiques :** myalgie.
- **Problèmes généraux et anomalies au site d'administration :** asthénie.

SI UN DES EFFETS INDESIRABLES DEVIENT GRAVE OU SI VOUS REMARQUEZ DES EFFETS INDESIRABLES NON MENTIONNÉS DANS CETTE NOTICE, Veuillez EN INFORMER VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRÉCAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

Utiliser ce médicament avec précaution dans les cas suivants :

- **Effets rénaux :** une protéinurie a été observée chez les patients traités par de fortes doses de rosuvastatine en particulier à la dose de 40 mg. Des tests fonctionnels rénaux devront être envisagés régulièrement au cours du suivi des patients.

Effets musculaires : myalgies, myopathies et rarement rhabdomyolyses ont été observés chez des patients traités par rosuvastatine à toutes les doses, en particulier aux doses > 20 mg.

Dosage de la créatine phosphokinase (CPK) : si le taux initial de CPK > 5 fois la normale est confirmé, le traitement ne devra pas être débuté.

Effets hépatiques : une élévation des transaminases supérieure à 3 fois la limite supérieure de la normale doit conduire à l'arrêt du traitement ou à une diminution de la dose. Il est recommandé de pratiquer des tests fonctionnels hépatiques avant le début du traitement et 3 mois après.

Inhibiteurs de protéases : une augmentation de l'exposition systémique à la rosuvastatine a été observée chez les sujets recevant de façon concomitante de la rosuvastatine avec divers inhibiteurs de protéase en association avec le ritonavir.

Pneumopathie Interstellaire : en cas de suspicion de pneumopathie interstellaire chez un patient, le traitement par statine doit être interrompu.

Diabète : chez certains patients à risque élevé de survenue d'un diabète, les statines peuvent entraîner une hyperglycémie nécessitant l'instauration d'un traitement antidiabétique. Les patients à risques (glycémie à jeun comprise entre 5,6 à 6,9 mmol/l, IMC > 30 kg/m², augmentation du taux des triglycérides, hypertension) devront faire l'objet d'une surveillance clinique et biologique.

Lactose : l'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Sodium : ce médicament contient du sodium, à prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport en sodium.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

9. INTERACTIONS

Effet de l'administration concomitante de médicaments sur la rosuvastatine :

Dr Driss BENCHAKROUNE

Cardiologue - Rythmologue

Diplômé de la faculté de médecine de Rabat

Diplômé en rythmologie de l'université de Bordeaux

Ancien médecin des hôpitaux de Bruxelles

Ancien médecin de l'hôpital militaire de Rabat

دكتور بنينا: قرون ادريس

متخصص في أمراض القلب والشرايين

متخصص في اضطرابات نبضات القلب

خريج كلية الطب بالرباط و بوردو (فرنسا)

طبيب سابق بمستشفيات بروكسل (بلجيكا)

طبيب سابق بالمستشفى العسكري (بالرباط)

CABINET DE CONSULTATIONS

ET D'EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

Electrocardiogramme

Echographie cardiaque
trans-thoracique

03/06/2020

Echographie cardiaque
trans-oesophagienne

Echographie doppler
vasculaire

Holter rythmique

Holter tensionnel

Epreuve d'effort

Rythmologie diagnostique
et interventionnelle

Implantation de pacemaker

Implantation de
défibrillateur

Electrophysiologie
endocavitaire

Exploration des troubles
du rythme cardiaque
et palpitations

Mme BENCHAKROUNE Afifa

A droite :


- Carotide commune, carotide externe et carotide interne libres de sténose significative ou de thrombus.
- Surcharge athéromateuse modérée de la bifurcation et de l'origine de la carotide interne avec plaque non sténosante < 20%
- Vertébrale : sens du flux normal, pas de sténose
- Vélocités et index de résistances normales
- Epaisseur intima-media : 0.8 mm

A gauche :

- Carotide commune, carotide externe et carotide interne libres de sténose significative ou de thrombus.
- Surcharge athéromateuse modérée du bulbe, de la carotide interne et externe , sans retentissement hémodynamique
- Vertébrale : sens du flux normal, pas de sténose
- Vélocités et index de résistances normales
- Epaisseur intima-media : 0.8 mm

CONCLUSION :

- **Surcharge athéromateuse discrète bilatérale.**
- **Absence de sténose significative ou de thrombus.**



193, bd Oum Rabii - 2ème étage - Oulfa - Casablanca
شارع أم الريـعـ - ولـفـ - الـبـيـضاـ
(au dessus laboratoire ORBIO - Face Lydec)

Tel: 05 22 90 80 20

Portable/WhatsApp : 07 77 04 78 68

Email : driss.benchakroune@gmail.com



ECG

Nom benchakroune afif
Sex
SN 0007198 Case No.

Age
Lit No.

Clinique N
Date 06/03/2020

Section



Frequency:	1000 Hz	PR Interval:	186 ms
Sample Time:	21 s	QT Interval:	436 ms
HR:	56 bpm	QTc Interval:	419 ms
P Interval:	76 ms	P Axis:	84.65°Cb
QRS Interval:	126 ms	QRS Axis:	-124.28°Cb
T Interval:	194 ms	T Axis:	67.53°Cb

Prompt:
Total Beats 18 ,Normal Beats 18,SVE 0 ,VE 0 .

ans à Stetos

Fr 1

Ref

Dr. BENCHAKROUNE DRISS
Cardiologue - Rhythmologue
133, Bd. Oum Rabia Ouita Casablanca
Tel: 0522 90 30 20 - Urg.: 06 51 14 67 37
Signature Medecin :

Dr Driss BENCHAKROUNE

Cardiologue - Rythmologue

Diplômé de la faculté de médecine de Rabat

Diplômé en rythmologie de l'université de Bordeaux

Ancien médecin des hôpitaux de Bruxelles

Ancien médecin de l'hôpital militaire de Rabat

دكتور بنشررون ادريس

متخصص في أمراض القلب والشرايين

متخصص في اضطرابات نبضات القلب

خريج كلية الطب بباريس و بوردو (فرنسا)

طبيب سابق بمستشفيات بروكسل (بلجيكا)

طبيب سابق بالمستشفى العسكري (باريس)

CABINET DE CONSULTATIONS ET D'EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

Electrocardiogramme

Echographie cardiaque

trans-thoracique

Le 03.06.2020

COMPTE RENDU D'ECHOGRAPHIE DOPPLER CARDIAQUE

Mme BENCHAKROUNE AFIFA

Ventricule gauche de taille normale, à parois non hypertrophiées, de bonne contractilité globale et segmentaire, FEVG = 68 % SB

Pressions de remplissage du VG basses avec E/Ea < 8.

Ventricule droit non dilaté, de bonne fonction systolique, TAPSE = 19 mm, Onde Sa tric = 12 cm/s.

Oreillettes de taille normale.

Aorte ascendante non dilatée.

Péricarde sec

Veine cave inférieure fine et compliant.

Asence de thrombus intra-cavitaire ou de végétation décelable en ETT.

Sigmoïdes aortiques : 3 cusps, fines, souples, de bonne ouverture, absence de rétrécissement aortique ou de fuite aortique.

Valves mitrales souples, de bonne ouverture, appareil sous-valvulaire mitral non remanié, absence de rétrécissement mitral ou de fuite mitrale.

Profil mitral normal

Absence d'anomalie valvulaire pulmonaire ou tricuspidie.

Fuite tricuspidie minime physiologique, PAPS à 25 mmHg.

AU TOTAL : échocardiographie normale. FEVG à 68 %

Dr. BENCHAKROUNE Driss
Cardiologue - Rythmologue
193, Bd. Oum Rabii Oulfa - Casablanca
Tel: 0522 90 80 20 - Urg. : 06 61 14 87 87

193, bd Oum Rabii - 2ème étage - Oulfa - Casablanca

شارع أم الريـعـ - ولـفـا - الـبـيـضاـءـ




(au dessus laboratoire ORBIO - Face Lydec)

Tel: 05 22 90 80 20


Portable/WhatsApp : 07 77 04 78 68

Email : driss.benchakroune@gmail.com






LOKA DR BENCHAKROUNE D :BENCHAKROUNE A: A 03-06-20
13:20:54



LOKA DR BENCHAKROUNE D :BENCHAKROUNE A: A 03-06-20
13:19:52



LOKA DR BENCHAKROUNE D :BENCHAKROUNE A: A 03-06-20
13:19:29

