

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

icologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

UPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

UPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19-0040318/2383

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9383 Société : 247

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : DJANEH MOHAMMED

Date de naissance : 06/09/1951

Adresse : Villa 107 Résidence ASSAJOUBA

Boulevard Ben Menni

Tél. : 06 48 11 99 34 Total des frais engagés : 1530 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 1 / 09 / 20

Nom et prénom du malade : DJANEH MOHAMMED Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Signature de l'adhérent(e) :

Le 04 / 09 / 2020

04 SEP 2020

[illegible]

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	1/9/2020	756,00
	1/09/20	532,80



[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :



Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <th colspan="2">G</th> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </tbody> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	G		00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	G																	
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
			DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRACTICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRACTICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES		Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient														
					Coefficient des Travaux													
					Montants des Soins													
					Début d'exécution													
					Fin d'exécution													
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																
	<table><tr><th colspan="2">H</th></tr><tr><td>25533412</td><td>21433552</td></tr><tr><td>00000000</td><td>00000000</td></tr><tr><th>D</th><th>G</th></tr><tr><td>00000000</td><td>00000000</td></tr><tr><td>35533411</td><td>11433553</td></tr><tr><th colspan="2">B</th></tr></table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		Coefficient des Travaux
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			Montants des Soins														
				Date du Devis														
			Date de l'exécution															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXEC

Dr Abderrahim TAJAOUI

CARDIOLOGUE

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris
Spécialiste des Maladies du cœur et Vaisseaux
Exploration Cardio-Vasculaire
ECG- HOLTER TENSIONNEL
HOLTER RYTHMIQUE - ECHO-DOPPLER
CARDIAQUE - EPREUVE D'EFFORT



الدكتور عبد الرحيم تجوي
اختصاصي في أمراض القلب والشرابين
خريج كلية الطب بباريس
الفحص الآلي للقلب والشرابين
استكشاف الضغط وإيقاع النبضات
الفحص بالصدى للقلب

Mohammed, le

1.9.20

المحمدية في

م 7 May 2020

126,00 x 6 = 756,00

PHARMACIE AL KAWTAR
RÉS. ATLANTIC Rte MANSOURIA
Tél. 05 23 33 09 03

1 r 5 / 6


= 756,00

Dr. TAJAOUI ABDERRAHIM
28, Bd Mohammed V - Mohammedia
Tél. 05 23 31 23 23 - Fax : 05 23 32 44 00

Confiance

Sur rendez-vous

بالموعد



Faites attention avec DIPREZAR® 50 mg/12.5 mg, Comprimés pelliculés:

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pellicule :

- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants médicamenteux mentionnés dans la rubrique 6
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamides (par exemple autres diurétiques antihypertenseurs tels que le cotrimoxazole ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin)
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée,
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium corrigés par un traitement,
- Si vous souffrez de goutte,
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre de grossesse – voir rubrique « Grossesse »)
- Si votre fonction rénale est gravement altérée ou si vos reins ne produisent plus d'urine
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament qui agit sur la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU D'UN PHARMACIEN.

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12.5 mg, Comprimé pelliculé :

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIPREL ?

DIPREZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pre-



Comprimés pelliculez

10/22
Comprimés pelliculés ?

126DH00

لو زارتن + ادرود

DIPREZAR®


Hydrochlorothiazide 50 mg + 30 mg

comprimés pelliculés



6 118 000 01

34 1658 //



Faites attention avec DIPREZAR® 50 mg/12.5 mg, Comprimés pelliculés:

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pellicule :

- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants médicamenteux mentionnés dans la rubrique 6
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamide (par exemple autres diurétiques antihypertenseurs tels que le cotrimoxazole) ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée,
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium corrigé par un traitement,
- Si vous souffrez de goutte,
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre de grossesse – voir rubrique « Grossesse »)
- Si votre fonction rénale est gravement altérée ou si vos reins ne produisent plus d'urine
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament pour réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU D'UN PHARMACIEN.

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12.5 mg, Comprimé pelliculé :

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIPRE ?

DIPREZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pre-

apprime pellicule ET DANS QUELQUES
angiotensine II et diurétiques - co-
sité des récepteurs de l'angiotensin
Il est une substance produite par vo
ains entrainant leur contraction. Cela
ne la libération de l'angiotensine II à

Comprimés pelliculets

10/22

126DH00

له زارتن + ادرود


Si vous avez des questions, contactez votre pharmacien ou votre médecin. Ce médicament est un médicament de prescription. Il ne doit pas être utilisé sans avis médical. Le donateur de sang ne doit pas donner de sang pendant 6 semaines après la prise de ce médicament.

DIPREZAR®
Losartan 50

Hydrochlorothiazide 12.5 mg +
30 comprimés

[illegible]

04 1658



Faites attention avec DIPREZAR® 50 mg/12.5 mg, Comprimés pelliculés:

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pellicule :

- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants médicamenteux mentionnés dans la rubrique 6
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamide (par exemple autres diurétiques antihypertenseurs tels que le cotrimoxazole) ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée,
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium corrigé par un traitement,
- Si vous souffrez de goutte,
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre de grossesse – voir rubrique « Grossesse »)
- Si votre fonction rénale est gravement altérée ou si vos reins ne produisent plus d'urine
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament pour réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU D'UN PHARMACIEN.

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12.5 mg, Comprimé pelliculé :

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIPREL ?

DIPREZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pre-

Comprimés pelliculets

10/22
Comprimés pelliculés ?

126DH00

لوزارتن + ادرود

allure.


DIPREZAR®
Losartan

Hydrochlorothiazide 50 mg + 30 mg

12,5 mg
pelliculés

0 118 000 04 167

1058 //



Faites attention avec DIPREZAR® 50 mg/12.5 mg, Comprimés pelliculés:

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pellicule :

- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants médicamenteux mentionnés dans la rubrique 6
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamide (par exemple autres diurétiques antihypertenseurs tels que le cotrimoxazole ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin)
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée,
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium corrigé par un traitement,
- Si vous souffrez de goutte,
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre de grossesse – voir rubrique « Grossesse »)
- Si votre fonction rénale est gravement altérée ou si vos reins ne produisent plus d'urine
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament qui agit sur la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU D'UN PHARMACIEN.

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12.5 mg, Comprimé pellicule :

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIPRE ?

DIPREZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pre-

apprime pellicule ET DANS QUELQUES
angiotensine II et diurétiques - co-
sité des récepteurs de l'angiotensin
Il est une substance produite par vo
ains entrainant leur contraction. Cela
ne la libération de l'angiotensine II à ca

Comprimés pelliculets

10/22

126DH00

له زارتن + ادرود

Si vous avez des questions, contactez votre pharmacien ou votre médecin. Ils vous donneront des conseils personnalisés.

DIPREZAR®
Losartan 50

Hydrochlorothiazide 12.5 mg +
30 comprimés


47-6

Barcodes

Films pelliculés



04 1658



Faites attention avec DIPREZAR® 50 mg/12.5 mg, Comprimés pelliculés:

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pellicule :

- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants médicamenteux mentionnés dans la rubrique 6
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamide (par exemple autres diurétiques antihypertenseurs tels que le cotrimoxazole ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin)
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée,
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium corrigés par un traitement,
- Si vous souffrez de goutte,
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre de grossesse – voir rubrique « Grossesse »)
- Si votre fonction rénale est gravement altérée ou si vos reins ne produisent plus d'urine
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament qui agit sur la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU D'UN PHARMACIEN.

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12.5 mg, Comprimé pellicule :

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIPRE ?

DIPREZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pre-



Comprimés pelliculets

10/22
P.E.H.

126DH00

لوزارتن + ادرود

Si vous êtes un médecin ou un pharmacien, vous pouvez vous adresser à votre pharmacien ou à votre médecin pour obtenir des informations sur les médicaments et les produits de santé.

DIPREZAR®
Losartan


Hydrochlorothiazide 12.5
30 comp.

176



0118 000 04 1658

1000



Faites attention avec DIPREZAR® 50 mg/12.5 mg, Comprimés pelliculés:

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pellicule :

- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants médicamenteux mentionnés dans la rubrique 6
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamide (par exemple autres diurétiques antihypertenseurs tels que le cotrimoxazole) ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée,
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium corrigés par un traitement,
- Si vous souffrez de goutte,
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre de grossesse – voir rubrique « Grossesse »)
- Si votre fonction rénale est gravement altérée ou si vos reins ne produisent plus d'urine
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament pour réduire la pression artérielle contenant de l'aldiskiren.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU D'UN PHARMACIEN.

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12.5 mg, Comprimé pelliculé :

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIPRE ?

DIPREZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pre-

Il est une substance produite par vos reins entraînant leur contraction. Cela

Comprimés pelliculés

de prendre DIFEZAK - 50 mg
Comprimés pelliculés ?

06090

لوزارتن + ادرود

Si vous avez des questions ou des suggestions, contactez-nous à l'adresse suivante : info@lapresse.ca

DIPREZAR®
Losartan 50 mg

30 comprimés

47 6

6 118 002

000 1104 1658

Betaserc

24 mg dichlorhydrate de bétahistine

Con

Vet

mé

pou

• G

• Si

vo

• Ce

de

mé

vôtr

• Si vol

à votre

à tout effet

cette notice. Voir rubrique 4.

78,00



1. QU'EST-CE QU QUELS CAS ES

Classe pharmacothér

Ce médicament conti
bétahistine. Il appartie
anti-vertigineux. Il lutt
Il est indiqué dans cert

2. QUELLES SONT AVANT DE PRENDRE

BETASERC 24 MG
CP B30



Ne prenez jamais BETASERC 24 mg, comprimé :

- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une excroissance anormale de la glande médullo-surrénale qui peut provoquer une hypertension artérielle sévère (phéochromocytome).

Ne prenez jamais BETASERC si l'un des cas ci-dessus vous concerne. En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre BETASERC.

SULIAT® 80 mg / 5 mg

28 comprimés pelliculés



6 111800 072379

SULIAT®

80 mg/5 mg

80 mg/5 mg

80 mg/10 mg

14, 28 et 56

Valsartan / Amlodipine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que SULIAT® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
- 3- Comment prendre SULIAT® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver SULIAT® ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

Code ATC : C09DB01

Les comprimés de SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

- L'Amlodipine appartient à la classe des « inhibiteurs calciques ».

- L'Amlodipine empêche le calcium de traverser la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui empêche les vaisseaux sanguins de se rétrécir.

- Le Valsartan appartient à la classe des « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement

des vaisseaux sanguins, avec pour conséquence une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II.

Cette action sur ces deux substances contribue à empêcher le rétrécissement des vaisseaux sanguins, ce qui fait que les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle

3- COMMENT PRENDRE SULIAT® ?

Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie, Fréquence d'administration et Durée du traitement

- La dose usuelle de SULIAT® est de 1 comprimé par jour.
- Patients âgés (âgés de 65 ans et plus) : votre médecin doit prendre des précautions lorsqu'il augmente votre dose.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.

Selon la manière dont vous allez réagir au traitement, votre médecin pourra vous proposer une dose plus forte ou plus faible.

Mode et voie d'administration :

- Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour.
- Avalez les comprimés avec un verre d'eau.
- Vous pouvez prendre SULIAT® au cours ou en dehors des repas. Ne le prenez pas avec du complé-

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Un surdosage avec le valsartan et l'amlodipine peut provoquer une hypotension avec tachycardie.

Si vous avez pris plus de SULIAT®, comprimés que vous n'auriez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SULIAT®, comprimés :

- Prenez-les dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel.
- Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose oubliée.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre SULIAT®, comprimés :

- L'arrêt de votre traitement par SULIAT® peut entraîner une aggravation de votre maladie.
- N'arrêtez pas votre traitement sans avis contraire de votre médecin.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables.

Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention particulière.

Quelques patients ont présenté les effets indésirables graves suivants (pouvant affecter plusieurs organes) :

prévenez immédiatement votre médecin :

Réaction allergique avec des symptômes tels que : éruption, démangeaisons, gonflement (impression de s'évanouir, sensation de tête vide).

Autres effets indésirables possibles de ce médicament :

- Fréquence (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : grippe ; nez bouché, mal de gorge et

maux de gorge ; douleurs musculaires ; évanouissement ; vertiges ; sensation de chaleur ou de froid ; des maux, des

501319 a

81 VSV

SULIAT® 80 mg / 5 mg

28 comprimés pelliculés



6 111800 072379

SULIAT®

80 mg/5 mg

80 mg/5 mg

80 mg/10 mg

14, 28 et 56

Valsartan / Amlodipine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que SULIAT® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
- 3- Comment prendre SULIAT® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver SULIAT® ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

Code ATC : C09DB01

Les comprimés de SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

- L'Amlodipine appartient à la classe des « inhibiteurs calciques ».

- L'Amlodipine empêche le calcium de traverser la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui empêche les vaisseaux sanguins de se rétrécir.

- Le Valsartan appartient à la classe des « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement

des vaisseaux sanguins, avec pour conséquence une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II.

Cette action sur ces deux substances contribue à empêcher le rétrécissement des vaisseaux sanguins, ce qui fait que les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle

3- COMMENT PRENDRE SULIAT® ?

Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie, Fréquence d'administration et Durée du traitement

- La dose usuelle de SULIAT® est de 1 comprimé par jour.
- Patients âgés (âgés de 65 ans et plus) : votre médecin doit prendre des précautions lorsqu'il augmente votre dose.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.

Selon la manière dont vous allez réagir au traitement, votre médecin pourra vous proposer une dose plus forte ou plus faible.

Mode et voie d'administration :

- Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour.
- Avalez les comprimés avec un verre d'eau.
- Vous pouvez prendre SULIAT® au cours ou en dehors des repas. Ne le prenez pas avec du complé-

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Un surdosage avec le valsartan et l'amlodipine peut provoquer une hypotension avec tachycardie.

Si vous avez pris plus de SULIAT®, comprimés que vous n'auriez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SULIAT®, comprimés :

- Prenez-les dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel.
- Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose oubliée.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre SULIAT®, comprimés :

- L'arrêt de votre traitement par SULIAT® peut entraîner une aggravation de votre maladie.
- N'arrêtez pas votre traitement sans avis contraire de votre médecin.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables.

Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention particulière.

Quelques patients ont présenté les effets indésirables graves suivants (pouvant affecter plusieurs organes) :

prévenez immédiatement votre médecin :

Réaction allergique avec des symptômes tels que : éruption, démangeaisons, gonflement

(impression de s'évanouir, sensation de tête vide).

Autres effets indésirables possibles de ce médicament :

- Fréquence (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : grippe ; nez bouché, mal de gorge et

maux de gorge ; douleurs musculaires ; éruptions cutanées ; maux de tête ; vertiges ;

501319 a

81 VSV

SULIAT® 80 mg / 5 mg

28 comprimés pelliculés



6 111800 072379

SULIAT®

80 mg/5 mg

80 mg/5 mg

80 mg/10 mg

14, 28 et 56

Valsartan / Amlodipine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que SULIAT® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
- 3- Comment prendre SULIAT® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver SULIAT® ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

Code ATC : C09DB01

Les comprimés de SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

- L'Amlodipine appartient à la classe des « inhibiteurs calciques ».

- L'Amlodipine empêche le calcium de traverser la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui empêche les vaisseaux sanguins de se rétrécir.

- Le Valsartan appartient à la classe des « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement

des vaisseaux sanguins, avec pour conséquence une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II.

Cette action sur ces deux substances contribue à empêcher le rétrécissement des vaisseaux sanguins, ce qui fait que les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle

3- COMMENT PRENDRE SULIAT® ?

Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie, Fréquence d'administration et Durée du traitement

- La dose usuelle de SULIAT® est de 1 comprimé par jour.
- Patients âgés (âgés de 65 ans et plus) : votre médecin doit prendre des précautions lorsqu'il augmente votre dose.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.

Selon la manière dont vous allez réagir au traitement, votre médecin pourra vous proposer une dose plus forte ou plus faible.

Mode et voie d'administration :

- Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour.
- Avalez les comprimés avec un verre d'eau.
- Vous pouvez prendre SULIAT® au cours ou en dehors des repas. Ne le prenez pas avec du complé-

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Un surdosage avec le valsartan et l'amlodipine peut provoquer une hypotension avec tachycardie.

Si vous avez pris plus de SULIAT®, comprimés que vous n'auriez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SULIAT®, comprimés :

- Prenez-les dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel.
- Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose oubliée.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre SULIAT®, comprimés :

- L'arrêt de votre traitement par SULIAT® peut entraîner une aggravation de votre maladie.
- N'arrêtez pas votre traitement sans avis contraire de votre médecin.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables.

Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention particulière.

Quelques patients ont présenté les effets indésirables graves suivants (pouvant affecter plusieurs organes) :

prévenez immédiatement votre médecin :

Réaction allergique avec des symptômes tels que : éruption, démangeaisons, gonflement (impression de s'évanouir, sensation de tête vide).

Autres effets indésirables possibles de ce médicament :

- Fréquence (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : grippe ; nez bouché, mal de gorge et

maux de gorge ; évanouissement ; vertiges ; étourdissements ; sensation de chaleur ou de froid ; des maux, des

501319 a

81 VSV