

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR CTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Mutuelle de Prévoyance

& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Nº P19-

052318

ND: 39381

Optique

Autres

Matricule : 10551

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom : El Idrissi Abdellah

Date de naissance : 12.01.60


Adresse : Rue Rabat 7B Abdekkar

..... Almoussar

Tél. : 06 61 31 89 81

Total des frais engagés : 332,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin



Cachet du médecin :

Date de consultation : 13/09/2020

15 SEP. 2020

Nom et prénom du malade : El Idrissi Abdellah

Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Céphalées d'estomac

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13 02 20	C-4	x	130dh	Dr MALIKI Mohammed Médecine Générale Spécialiste en Echographie Téléphone : 0661 93 28 04

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE CHAWKI 33, Léonard de Vinci, BP 213 69360 Villeurbanne Tél : 04 72 25 62 06	INPE : 6206	13.7.2018 332,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de la

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

Dr. MALIKI Mohamed

الدكتور مالكي محمد

MEDECINE GENERALE

Diplômé en Echographie

de la Faculté de Médecine de Montpellier, France

الطب العام

حائز على شهادة الفحص بالموجات الصوتية

جامعة الطيبة بمنيابوليس

Gelt

M. G. S. J. S.

18

84, 85

الدروة، في : Deroua, le

10

ARRACKS **9** **CANADA**

8700

20

690

S.4

8910

10

~~Menschen~~

left hand
apple tree

draw

مobil phone number: 06 61 93 28 94 - مكتب ال دروة - رقم هاتف المحمول : ٠٦ ٦١ ٩٣ ٢٨ ٩٤

Centre Deroua (en face Centre de Santé) - DEROUA - Tél. Mobile : 06 61 93 28 94

MEZOR® 20mg & 40mg

Esomeprazole
Gélules gastro-résistantes

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la lire.

COMPOSITION:

Chaque gélule gastro-résistante contient soit 20mg soit 40mg de substance active, esomeprazole (sous forme de sel de magnésium dilué). La quantité exacte est indiquée sur la bouteille de MEZOR®.

Excipients : Sphères de sucre (sucroses), amidon de maïs), hydroxyéthyle, émulsion de diméthicone 35% (contenant diméthicone, propyl-p-hydroxybenzoate (E216), méthyl-p-hydroxybenzoate (E218), acrylate, benzote, benzoate de sodium, monolaurate de propylénoglycol sorbitane, octylphénol polyéthoxy, ethanol, eau purifiée et propylénoglycol), polyborate 80, manitol, Monoglycérides diacrylates, talc, dispersion 30% de copolymère d'acide polyisobutyrate 80, citrate de triethyl, Monoxyglycérides stéariques.

Composition de l'enveloppe de la gélule : pectine, oxyde de fer jaune E172, dioxyde de titane E171.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS :

MEZOR 20mg et 40mg est disponible en boîtes de 7, 14 et 28 gélules gastro-résistantes.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT :

Ce médicament est un inhibiteur de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

MEZOR 20mg est utilisé dans :

- Le traitement de l'oesophagite érosive par reflux (inflammation de l'œsophage)
 - La prévention des réchutes de certaines oesophagites
 - Le traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien (brûlures et remontées acides), le traitement de l'ulcère duodénal en cas d'infection par une bactérie appelée Helicobacter pylori.
 - Le traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
 - La prévention des ulcères de l'estomac et du duodénal associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
 - Le traitement du syndrome de Zollinger - Ellison
- MEZOR 40mg est utilisé dans :
- Le traitement de l'oesophagite érosive par reflux (inflammation de l'œsophage)
 - Le traitement du syndrome de Zollinger - Ellison.

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT :

Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, même ceux sans prescription médicale. Ne prenez JAMAIS ce médicament dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à l'un des constituants de MEZOR.
- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons.

Si vous prenez un médicament contenant de l'atazanavir ou du nefarravir (utilisés dans le traitement du VIH).

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Précautions d'emploi de MEZOR dans les cas suivants :

- Si vous prenez d'autre médicament contenant l'itraconazole ou le kétconazole (pour les infections fongiques), le diazépam (contre l'anxiété), la phénytoïne (pour l'épilepsie), la warfarine (pour les troubles de coagulation sanguine) ou le cisapride (pour des troubles liés à un retard de l'évacuation gastrique)
- Si vous avez des problèmes hépatiques graves. Vous devez en discuter avec votre médecin, il peut réduire la posologie.
- Si vous avez des problèmes rénaux graves. Vous devez en discuter avec votre médecin.
- Si une association de médicaments vous est prescrite pour l'éradication de Helicobacter pylori avec esomeprazole, ou si vous prenez esomeprazole dans le cadre d'un traitement à la demande, vous devez informer votre médecin des autres médicaments que vous prenez.

Ce médicament peut masquer les symptômes d'autres maladies. Par conséquent, si vous ressentez l'un des symptômes suivants ayant pris d'esomeprazole, ou pendant le traitement, prévenez votre médecin immédiatement :

- Perte de poids importante et difficile à avaler
- Douleurs gastriques ou indigestion
- Vomissement de sang ou d'écarts
- Selles noires (selles tachées de sang)

En cas de traitement à la demande vous devez prévenir votre médecin de toutes modifications des symptômes.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDÉCIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Il est important d'indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament notamment l'itraconazole, le kétconazole ou le voriconazole, le diazépam, la phénytoïne, la warfarine ou autres dérivés coumariniques, le citalopram, l'imipramine ou la clomipramine, l'atazanavir, la clarithromycine, l'amoxicilline ou le cisapride, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

IL FAUT SIGNALER SYSTÉMIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDÉCIN OU A VOTRE PHARMACIEN

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être ou si vous allez, dites le à votre médecin avant de prendre esomeprazole.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Il doit également être utilisé au cours de l'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDÉCIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

Esomeprazole n'est pas susceptible d'affecter l'aptitude de conduire ou d'utiliser des outils ou des machines.

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFETS NOTOIRS

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, du syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en sucre isomaltose (maladies métaboliques rares).

Ce médicament contient du « Parahydroxybenzoate » : propyl-p-hydroxybenzoate (E216), methyl-p-hydroxybenzoate (E218), et peut provoquer des réactions allergiques.

EFFETS NON SOUHAITÉS OU GENANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants.

Effets indésirables fréquents (chez 1 à 10% des sujets traités) :

Maux de tête, diarrhée, constipation, nausées, vomissement, douleurs abdominales, flatulence.

Effets indésirables peu fréquents (chez moins de 1% des patients traités) :

Sensation vertigineuse, œdème périphérique, paresthésie (sensation anormale dans une région cutanée ou profonde), somnolence, insomnie, augmentation des enzymes du foie, réactions cutanées (dermatite, rash, prurit, urticaïcie), malaise.

Effets indésirables rares (chez moins de 0,1% des patients traités) :

Confusion mentale, réversibilité, agitation, agressivité, dépression et hallucinations, particulièrement chez des patients présentant des pathologies sévères, gynécomastie (gonflement des seins chez l'homme), sécheresse de la bouche, stomatite (inflammation de la bouche), candidose gastro-intestinale (infection due à un champignon), diminution du nombre des cellules sanguines (globules rouges, globules blancs, plaquettes), encéphalopathie chez les patients ayant une insuffisance hépatique sévère préexistante, hépatite avec ou sans ictere (jaunisse),

insuffisance hépatique, douleurs articulaires ou musculaire, fatigue musculaire, photosensibilisation, réactions cutanées graves (réactions bulleuses), alopecie (chute de cheveux), réactions allergiques telles que gonflement du visage, des lèvres, du larynx et/ou de la langue, bronchospasme, choc anaphylactique, fièvre, néphrite intersticielle (atteinte rénale), augmentation de la sueur, vision trouble, perturbation du goût et diminution du taux de sodium dans le sang.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Mode d'emploi ou mode d'administration

Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et quand vous devez les prendre. Le dosage des gélules que vous prenez et la durée du traitement dépendront de l'importance des symptômes dont vous souffrez. Vous devez prendre vos gélules au cours d'un repas ou à jeun. Elles doivent être avalées entières avec un verre d'eau. Les gélules et leur contenu ne doivent pas être mâchés ni croqués. Les gélules contiennent des granules enrobés résistants à l'acidité de l'estomac. Il est important de ne pas endommager les granules.

- Si vous avez des difficultés à avaler les gélules :
 1. Ouvrez la capsule précautionneusement au dessus d'un verre d'eau non gazeuse et videz le contenu de la gélule (granules) dans le verre. N'utilisez aucun autre liquide ni boisson.
 2. Agitez. Ensuite buvez le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes. Toujours agitez le mélange avant de boire.
 3. Pour être sûr d'avoir bu tout votre médicament, rincez le verre avec la moitié de sa contenance en eau et buvez la. Les particules solides contiennent le médicament – ne pas mâcher ni écraser.

- Si vous ne pouvez pas du tout avaler, le contenu de la gélule peut être mélangé dans l'eau non gazeuse et introduit dans une cuillère. Le contenu de la seringue peut vous être administré via un tube directement dans votre estomac (sonde gastrique).

Posologie pour les gélules à 20mg :

1. Adultes et enfants à partir de 12 ans

- Traitement de l'œsophagite : 40mg une fois par jour pendant 4 semaines. Chez certains patients : la dose habituelle est de 20mg une fois par jour.
- Prévention des rechutes des oesophagites : 20mg une fois par jour.
- Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien (brûlures et remontées acides) et de l'ulcère duodénal : 40mg une fois par jour. Consulter votre médecin.

Par la suite, votre médecin peut vous recommander de prendre une gélule de 40mg. Le traitement à la demande, en fonction des besoins, n'est pas recommandé à plus de 40mg par jour.

2. Adultes

- Traitement de l'ulcère duodénal en cas d'infection par une bactérie appartenant à la famille des H. pylori : 40mg deux fois par jour pendant 7 jours.
- Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens : 20mg une fois par jour. Consulter votre médecin : la dose habituelle est de 20mg une fois par jour par jour pendant 7 jours.

3. Enfants de moins de 12 ans

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans en l'absence de données disponibles.

Posologie pour les gélules à 40mg :

4. Adultes et enfants à partir de 12 ans

- Traitement de l'œsophagite : 40mg une fois par jour pendant 4 semaines. Chez certains patients, un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour obtenir une guérison complète.
- 5. Adultes

- Traitement du syndrome de Zollinger - Ellison : la dose initiale recommandée est de 40mg deux fois par jour. La posologie doit être ajustée individuellement et le traitement poursuivi aussi longtemps que nécessaire cliniquement. Pour des posologies supérieures à 80mg par jour, la dose journalière devra être divisée en 2 prises.

6. Enfants de moins de 12 ans

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans en l'absence de données disponibles.

Posologie pour les gélules à 40mg :

7. Enfants de moins de 12 ans

Il faut consulter les instructions de votre médecin et si vous avez un doute, n'hésitez pas à lui demander conseil.

8. En cas d'oubli :

Si vous avez oublié de prendre votre dose, prenez le dès que vous vous en rappelez. Cependant, si vous êtes prêt à prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée mais poursuivez votre traitement normalement.

Demandez l'avis de votre médecin.

Conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de MEZOR que vous n'auriez dû, avertir immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

A conserver dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Tableau C (liste II)

CECI EST UN MÉDICAMENT.
UN MÉDICAMENT N'EST PAS UN PRODUIT COMME LES AUTRES.
Il vous concerne, vous et votre santé.
Le médicament est un produit actif.
Suivez strictement les instructions de votre médecin et si vous avez un doute, n'hésitez pas à lui demander conseil.
En cas d'oubli :
Si vous avez oublié de prendre votre dose, prenez le dès que vous vous en rappelez. Cependant, si vous êtes prêt à prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée mais poursuivez votre traitement normalement.
Demandez l'avis de votre médecin.
Conduite à tenir en cas de surdosage :
Si vous avez pris plus de MEZOR que vous n'auriez dû, avertir immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
UTILISEZ LES MÉDICAMENTS PRESCRITS COMME VOUS LE DIT VOTRE MÉDÉCIN.
Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin.
Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : Suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reportez pas de votre seule initiative.
VOTRE MÉDÉCIN CONNAÎT LES MÉDICAMENTS : suivez ses conseils.
Il ne sait pas pour vous de prendre beaucoup de médicaments.
Il ne sait pas pour vous de prendre trop de médicaments.
IL S'AGIT POUR VOUS DE PRENDRE LES MÉDICAMENTS DONT VOUS AVEZ BESOIN.



JMC PHARMA
Lot Bachouk, Rue 7, Lot 10. Casablanca.
Pharmacien responsable: O. MOTILI



Gélule
Voie orale

Relaxium® B6

Deva
Pharmaceutique

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin 260 mg

équivalent en magnésium 150 mg

Vitamine B6 1 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin 520 mg

équivalent en Magnésium 300 mg

Vitamine B6 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.,

FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 20 et 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien tout traitement en cours.


Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA2018180

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA2018180



Deva
Pharmaceutique

140-147, Zone Industrielle Le Mel - Caudanais

Fenolax

Charbon végétal activé Fenouil - Carvi

Synergie d'action - Soulagement rapide

PROPRIÉTÉS :

FENOLAX, grâce au charbon activé, élimine les gaz intestinaux, favorise un meilleur transit intestinal, diminue la sensation de ballonnement et lutte contre la constipation.

CARVI : antispasmodique et carminatif.

FENOUIL : facilite la digestion, favorise un confort digestif.

INDICATIONS :

Fenolax est donc recommandé pour :

- Confort digestif
- Faciliter le transit
- Soulager les lourdeurs digestives

COMPOSITION (en mg par gélule de 300 mg)

Ingrédient	En mg par gélule de (300 mg)
Charbon activé	200
Poudre de Carvi	20
Poudre de Fenouil	20
Carbonate de magnésium	20
Dioxyde de silicium	20

Gélules en gélatine bovine halal

POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINIS

Adultes : 2 gélules 2 fois par jour

Enfant : 1 à 2 gélules par jour à prendre après

grand verre d'eau.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

A l'abri de l'humidité, dans un endroit ne dépas-

ure moyenne de 25°C.

PRÉSENTATION :

Pilulier de 30 gélules

Poids net : 12.60 gr

Complément alimentaire n'est pas médicament



TOP'LEVURE^{EXTRA}

PROPRIETES :

TOP'LEVURE Extra est un complément alimentaire à base de plantes traditionnellement utilisées pour leur effet reconnu.

Propriétés médicinales des composants:

LEVURE DE BIERE :

- ✓ La levure de bière apporte de très nombreux probiotiques nécessaires pour régénérer toute la flore intestinale. La levure de bière est très utilisée par les médecins pour restaurer une flore intestinale détruite par les antibiotiques chimiques et les médicaments .elle apporte de nombreux probiotiques . C'est-à-dire des bactéries bénéfiques au renforcement de la flore intestinale, idéales pour lutter contre la constipation chronique, les diarrhées importantes, les gastro-entérites, les obstructions intestinales. Son action sur le foie, l'estomac et les intestins permet de lutter contre intoxications alimentaires ou médicamenteuses. La levure de bière combat également toutes les inflammations et irritations présentes dans les intestins et le colon. Elle diminue ainsi les inflammations importantes comme la maladie de crohn, le syndrome de l'intestin irritable, la colite ulcéruse et le syndrome de l'intestin perméable (Hyperperméabilité des parois intestinales) .sous forme de crue de plusieurs semaines, la levure de bière va agir en profondeur pour restaurer les équilibres profonds de la flore intestinale, et pour cicatriser, nourrir et réparer les muqueuses et parois digestives importantes.
- ✓ La levure de bière est très efficace pour lutter contre les brûlures d'estomac, les remontées acides et les douleurs gastriques. Elle reminéralise et alcalinise l'organisme en profondeur. Elle est hépatoprotectrice, elle renforce donc l'action du foie et de la vésicule biliaire, permettant de lutter contre les intoxications alimentaires, les hépatites, les constipations chroniques, et est idéale pour diminuer les excès de viandes. Elle diminue ainsi les douleurs digestives et les constipations graves, empêchant la bonne circulation des nutriments dans le corps. La levure de bière renforce l'action de tous les organes digestifs majeurs qui sont les intestins, les reins, le côlon, le foie, l'estomac, le pancréas. Elle va agir en profondeur, pour restaurer les équilibres digestifs, cicatriser les parois intestinales et améliorer la qualité de la flore intestinale.
- ✓ La levure de bière est exceptionnelle pour augmenter la croissance des muscles, des os, la poussée des cheveux, des ongles et des dents, très nombreuses études scientifiques ont montré que la levure de bière était parfaite pour la croissance des jeunes enfants, des adolescents, des muscles des sportifs, ceci grâce à sa très grande richesse en vitamine B (plus grand source de vitamines B dans toutes les vitamines du groupe B selon l'OMS).
- ✓ La levure de bière augmente grandement la vitalité et l'énergie.
- ✓ La levure de bière va surtout agir sur les intestins en renouvelant la flore intestinale en chassant les parasites intestinaux comme les vers intestinaux , les champignons candida-albicans et l'Helicobacter pylori qui sont à l'origine de nombreuses dérives .elle apporte aussi des outifimes et envie incessante de manger du sucre, des pâtes et des gâteaux. La levure de bière apporte ainsi l'équilibre au niveau digestif et cela se ressent au niveau des envies alimentaires. Elle permet un meilleur contrôle de soi face aux excès de sucreries, de bonbons, de gluten, de gâteaux, de sel et de produits néfastes pour l'organisme.