

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Traitements :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation	: contact@mupras.com
Prise en charge	: pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut	: adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

210166

Déclaration de Maladie : N° P19- 0023181

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 1726 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

MOURATIB. Abderrahim Date de naissance : 28/01/1978

Adresse :


Pl. 115, N° 18, Ain Chok, Casablanca

Tél. : 06 6134 6824

Total des frais engagés : 150 + 375,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade : Mouratib. Abderrahim Age : 31

Lien de parenté :

Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

Diabète HTA Hypercholesterolemie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

16 SEP. 2020


RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03/08	01	1	150,-	<p>Docteur Mohamed AATIK Médecin du Sport Néurologue Expert assurément Tél: 0522 21 05 11 06 20 06 84 78</p>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie ELYACOUCI Ain Chock - Casablanca Tel: 0522 50 76 39	03/08/20	375,80

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				CCEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				CCEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECU

Docteur Mohamed AATIK
Docteur en Médecine

بسم الله الرحمن الرحيم

الشافي هو الله

الدكتور محمد عتيق
دكتور في المحب



Dr. YACOUT HALIQUA

- الطب العام
- حائز على شهادة الطب الرياضي
- العافية - التغذية الرياضية
- الطب الفيزيائي - الترويض الطبي
- الطب الطبيعي
- حائز على شهادة الخبرة الطبية
- والتعويض القانوني للضرر الجسدي
- خبير قضائي مخلف لدى المحاكم

- Médecine Générale
- Diplômé en Médecine de Sport Nutrition Diététique Sportive
- Kinésithérapie Rééducation
- Médecine Naturelle
- Diplômé en Expertise Médicale et Réparation Juridique du dommage Corporel
- Expert Judiciaire Assermenté auprès des Tribunaux

3500 x 2 ————— 7000
850 ————— 850
4530 ————— 4530
2340 ————— 2340
27,50 ————— 27,50

Xedulel 25-septembre
Drucker 30 → 8 ep
1 ep-y
Drucker 8h 8h 8h
hopen geluk
8 mesin ————— 8
27,50 30

Dr. YACOUT HALIQUA
Médecin du sport
Naturopathie
Expert pessimum 88
Tél: 0522.21.63.11 / 0522.06.84.78

حي مولاي عبد الله، بشارع العليل، الزقة 83، رقم 6 - عن السق
05 22 50 84 03 - 05 22 21 85 11 - الماكس : 05 22 50 76 39

Hay My Abdellah, Bd. Al-Khalil, Rue 132 N° 6 - Ain Chock
20480 - Casablanca - Tél.: 05 22 21 85 11 - Fax : 05 22 50 84 03

F = 375,80

DIAMICRON® 30 mg

Gliclazide

Comprimé à Libération Modifiée

00'68

Veuillez lire et prendre ce médicament.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez toutes d'informations à ce sujet.
- Ce médicament est recommandé à d'autres personnes dont la maladie sont identiques.
- Si vous ressentez des effets indésirables ou votre pharmacien qui ne serait pas mentionné.



DIAMICRON 30 mg

Gliclazide

60 Comprimés à Libération Modifiée

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que Diamicron 30 mg, comprimé à libération modifiée ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Diamicron 30 mg, comprimé à libération modifiée ?
3. Comment prendre Diamicron 30 mg, comprimé à libération modifiée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Diamicron 30 mg, comprimé à libération modifiée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DIAMICRON 30 MG, COMPRIMÉ À LIBÉRATION MODIFIÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : sulfamide hypoglycémiant – dérivé de l'urée, code ATC : A10BB09

DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée est un médicament qui réduit le taux de sucre dans le sang (antidiabétique oral appartenant à la classe des sulfonylurées).

DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée est indiqué dans certaines formes de diabète (diabète de type 2 non insulino-dépendant) chez l'adulte, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids seuls ne sont pas suffisants pour obtenir une glycémie (taux de sucre dans le sang) normale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIAMICRON 30 MG, COMPRIME À LIBÉRATION MODIFIÉE ?

Ne prenez jamais DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée :

- si vous êtes allergique au gliclazide ou à l'un des autres composants contenus dans DIAMICRON 30 mg, ou à d'autres médicaments de la même classe (sulfonylurées), ou à d'autres médicaments apparentés (sulfamides hypoglycémiants) ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (de type 1) ;
- si vous avez des corps cétoniques et du sucre dans vos urines (ce qui peut signifier que vous avez une acido-cétose diabétique), un pré-coma ou un coma diabétiques ;
- si vous souffrez d'insuffisance rénale ou hépatique sévères ;
- si vous prenez des médicaments pour traiter des infections fongiques (miconazole) (Cf. «Autre médicaments et Diamicron 30 mg, comprimé à libération modifiée») ;
- si vous allaitez (Cf. «Grossesse, Allaitement et fertilité»).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Diamicron 30 mg, comprimé à libération modifiée.

Vous devez respecter le traitement prescrit par votre médecin pour atteindre une glycémie normale. Cela signifie qu'à part la prise régulière du traitement, vous respectez un régime alimentaire, faites de l'exercice physique et, quand cela est nécessaire, perdez du poids.

Durant le traitement par gliclazide, un contrôle régulier de votre taux de sucre dans le sang (et éventuellement dans les urines), et également de votre hémoglobine glyquée (HbA1c), est nécessaire.

Dans les premières semaines de traitement, le risque d'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) peut être augmenté. Dans ce cas, un contrôle médical rigoureux est nécessaire.

Une hypoglycémie (baisse du taux de sucre dans le sang) peut survenir :

- si vous prenez vos repas de manière irrégulière ou si vous sautez un repas,
- si vous jeûnez,
- si vous êtes malnutris,
- si vous changez de régime alimentaire,
- si vous augmentez votre activité physique et que votre apport en hydrates de carbone ne compense pas cette augmentation,

XEDILOL® 6,25 mg et 25 mg,

Comprimé sécable

Carvédilol

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce méri-

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informa-
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, consultez votre médecin ou à votre pharmacien.

Demandez à votre pharmacien de vous donner une copie de cette notice.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE XEDILOL, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE XEDILOL ?
3. COMMENT PRENDRE XEDILOL, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER XEDILOL, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE XEDILOL, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du carvédilol: un alpha et bêtabloquant.

Il est préconisé dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique (l'insuffisance cardiaque).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE XEDILOL ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrés, contactez-le :

Ne prenez jamais XEDILOL, comprimé sécable dans les cas suivants:

- Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée par les traitements avec signes de surcharge liquide dans le ventre, difficulté respiratoire) pouvant nécessiter un traitement par voie parentérale.
- Insuffisance hépatique
- Bradycardie sévère (ralentissement du rythme cardiaque, rythme cardiaque < 50 battements/min)
- Certains troubles de la conduction cardiaque (blocs auriculo-ventriculaires du 2^e et 3^e degrés)
- Phénomène de Raynaud (refroidissement des extrémités)
- En cas de traitement par la floctafénine (médicament de la douleur), le sultopride (médicament du système nerveux), la cimétidine (médicament anti-ulcérage), ou les antiarythmiques de classe Ia (disopyramide, hydroquinidine, quinidine) et Ic (cibenzoline, flécaïnide, propafenone),
- Allergie connue à l'un des composants ([voir Que contient XEDILOL, comprimé sécable ?](#)) ou antécédents de réaction allergique
- Asthme ou problèmes respiratoires sévères
- Choc d'origine cardiaque.

Ce médicament ne doit GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas de:

- Association avec les antagonistes du calcium, les antihypertenseurs centraux, les autres bêta-bloquants sous forme de collyre
- AllaITEMENT.

Faites attention avec XEDILOL, comprimé sécable:

Ce traitement doit être instauré pendant les premières semaines par un spécialiste en cardiologie ou en médecine interne et la posologie ne doit pas être modifiée sans l'avis de ce médecin. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie initiale faible puis progressivement croissante.

En effet, une surveillance médicale stricte doit être effectuée à chaque augmentation de dose, particulièrement chez le sujet âgé et chez les patients avec insuffisance cardiaque.



08/58



XEDILOL® 6,25 mg et 25 mg,

Comprimé sécable

Carvédilol

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce méri-

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informa-
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, consultez votre médecin ou à votre pharmacien.

Demandez à votre pharmacien de vous donner une copie de cette notice.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE XEDILOL, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE XEDILOL ?
3. COMMENT PRENDRE XEDILOL, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER XEDILOL, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE XEDILOL, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du carvédilol: un alpha et bêtabloquant.

Il est préconisé dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique (l'insuffisance cardiaque).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE XEDILOL ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrés, contactez-le :

Ne prenez jamais XEDILOL, comprimé sécable dans les cas suivants:

- Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée par les traitements avec signes de surcharge liquide dans le ventre, difficulté respiratoire) pouvant nécessiter un traitement par voie parentérale.
- Insuffisance hépatique
- Bradycardie sévère (ralentissement du rythme cardiaque, rythme cardiaque < 50 battements/min)
- Certains troubles de la conduction cardiaque (blocs auriculo-ventriculaires du 2^e et 3^e degrés)
- Phénomène de Raynaud (refroidissement des extrémités)
- En cas de traitement par la floctafénine (médicament de la douleur), le sultopride (médicament du système nerveux), la cimétidine (médicament anti-ulcérage), ou les antiarythmiques de classe Ia (disopyramide, hydroquinidine, quinidine) et Ic (cibenzoline, flécaïnide, propafenone),
- Allergie connue à l'un des composants (voir Que contient XEDILOL, comprimé sécable ?) ou antécédents de réaction allergique
- Asthme ou problèmes respiratoires sévères
- Choc d'origine cardiaque.

Ce médicament ne doit GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas de:

- Association avec les antagonistes du calcium, les antihypertenseurs centraux, les autres bêta-bloquants sous forme de collyre
- AllaITEMENT.

Faites attention avec XEDILOL, comprimé sécable:

Ce traitement doit être instauré pendant les premières semaines par un spécialiste en cardiologie ou en médecine interne et la posologie ne doit pas être modifiée sans l'avis de ce médecin. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie initiale faible puis progressivement croissante.

En effet, une surveillance médicale stricte doit être effectuée à chaque augmentation de dose, particulièrement chez le sujet âgé et chez les patients avec insuffisance cardiaque.



08/58



ترميبوتين®

ترميبوتين

150 ملغ



حبوبات لتحضير الشراب

كيسا 20

عن طريق الفم



Pharmed
Laboratoires Pharmaceutiques

LOT : 8206
UT. AV : 03-25
P.P.V : 45 DH 90

LOPERIUM®

Lopéramide

PRESENTATION

LOPERIUM : gélule blanche ; boîte de 20

COMPOSITION

	Par gélule
Lopéramide (DCI) Chlorhydrate	2 mg

INDICATIONS

C'est un antidiarrhéique qui agit en ralentissant les sécrétions intestinales.

Il est utilisé dans le traitement symptomatique

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans :

- crise aiguë de rectocolite hémorragique,
- enfant de moins de 8 ans.

ATTENTION

Des précautions sont nécessaires en cas de :

Ce médicament n'est pas adapté au traitement des infections bactériennes et aux antibiotiques.

Une diarrhée qui s'accompagne de torpeur, de selles molles ou liquides nécessite rapidement un avis médical. Lorsque la diarrhée cesse, les selles recommencent à être formées. L'utilisation prolongée expose à un risque de constipation importante.

Si vous devez conduire, ou utiliser une machine dangereuse, assurez-vous préalablement que ce médicament n'altère pas votre vigilance.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Les études actuellement disponibles n'ont pas mis en évidence de problème particulier lors de l'utilisation ponctuelle de ce médicament chez la femme enceinte.

LOPERIUM®
Chlorhydrate de Lopéramide

Diarrhée aiguë

bottu 5.3.
K. Alte des Comptoirs - Aix-Nicla - Chambéry
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

P P V 2 3-D-H 4 0
P E R 0 3 / 2 2
L O T 1 7 6 2



