

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Reclamation : [contact@mupras.com](mailto:contact@mupras.com)
- Prise en charge : [pec@mupras.com](mailto:pec@mupras.com)
- Adhésion et changement de statut : [adhesion@mupras.com](mailto:adhesion@mupras.com)

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

## Déclaration de Maladie

N° W19-545357

40159 RA

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11463

Société : Royal Air Maroc

☒ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre

Nom & Prénom : DARI KADAL

Date de naissance : 14/07/1975

Adresse : 11 rue Ibn Mouni Farah 1 Settat

Tél. : 0661706475 Total des frais engagés : # 1082,20 # Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

**DOCTEUR ADIL FATHALLAH**  
Généraliste  
Groupe Résidence Agas Imm. 65 CH. 7  
OULEA - CASABLANCA  
Tél. : 05 22 91 60 30 - Urgences : 06 65 42 76 57

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : Kamel L. Lecien

Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même

☐ Conjoint

☒ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : MOUASSER 14/09/2020

Signature de l'adhérent(e) :

### VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° W19-545357

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.  
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 11463

Nom de l'adhérent(e) : # 1082,20 #

Total des frais engagés : DARI KADAL

Date de dépôt : 14/09/2020

| RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES |                   |                       |                                 |                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dates des Actes                | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes                                |
| 31/08/2020                     | 2                 | 1                     | Gratuit                         | INP<br>Dr. ANH PATHALLAN<br>Bakette<br>Pharmacie Immm. 65 CH. 7<br>SABLANCA<br>06 66 48 75 67 |

| EXECUTION DES ORDONNANCES                 |            |                       |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Cachet du Pharmacien<br>ou du Fournisseur | Date       | Montant de la Facture |
|                                           | 31/08/2025 | 1089,00               |
|                                           |            |                       |
|                                           |            |                       |
|                                           |            |                       |
|                                           |            |                       |

| ANALYSES - RADIOGRAPHIES                               |      |                                 |                           |
|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|
| Cachet et signature du<br>Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des<br>Coefficients | Montant<br>des Honoraires |
|                                                        |      |                                 |                           |
|                                                        |      |                                 |                           |
|                                                        |      |                                 |                           |
|                                                        |      |                                 |                           |
|                                                        |      |                                 |                           |

[illegible]

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

| SOINS DENTAIRES               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dents<br>Traitées | Nature des<br>Soins | Coefficient         | INP : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|---|--|--------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     | COEFFICIENT DES TRAVAUX                                                                                                                                                                                                       | <input type="text"/> |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     | MONTANTS DES SOINS                                                                                                                                                                                                            | <input type="text"/> |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     | DEBUT D'EXECUTION                                                                                                                                                                                                             | <input type="text"/> |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     | FIN D'EXECUTION                                                                                                                                                                                                               | <input type="text"/> |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| O.D.F.<br>PROTHESES DENTAIRES | DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                     | COEFFICIENT DES TRAVAUX                                                                                                                                                                                                       | <input type="text"/> |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | <div style="text-align: center;"> <p>H</p> <table border="0"> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D ————— G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> </table> </div> |                   |                     |                     | 25533412                                                                                                                                                                                                                      | 21433552             | 00000000 | 00000000 | D ————— G |  | 00000000 | 00000000 | 35533411 | 11433553 | B |  | MONTANTS DES SOINS | <input type="text"/> |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 25533412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21433552          |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 00000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00000000          |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | D ————— G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 00000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00000000          |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 35533411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11433553          |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | [Création, remont, adjonction]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     | DATE DU DEVIS                                                                                                                                                                                                                 | <input type="text"/> |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     | DATE DE L'EXECUTION | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                          |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |           |  |          |          |          |          |   |  |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Docteur Adil Fathallah

## Pédiatre

Ordonnance

le

31/08/2020

Dekhor Sene

18x60, 00

Perplex.



1 place x 21 j x 3 ltr

1:1080, 00

~~Docteur Adil FATHALLAH  
Pédiatre~~

Groupe Résidentiel Hay Al Houda Immi. 65 Cmt. 7  
OULEA - COUADLANCA  
Tél: 05 22 91 60 30 - Urgences: 06 65 43 75 61

~~PHARMACIE AKAFAT  
ASMOUN Samir  
Docteur en Pharmacie  
Rue ASSALAM Hay Al Houda  
BERRECHID  
Tél: 05 22 32 84 94~~

**FERPLEX® 40 mg****Fer protéine succinylate****Boîte de 10 Falcons buvables****PPV 60,00 Dhs****6 118001 440016****وية أخرى :**

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون و تراسيسكيلين .  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

**نشرة :**

**فيريلكس 40 ملغ**  
**بروتين سينسيلات الحديد**

**الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء .**

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى .
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني .
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً . لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك .
- في حالة تقاوم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه .

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله .
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة .
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
6. معلومات إضافية .

**1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد .  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد .

**2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

**لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :**

- إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء .
  - إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب .
  - إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية) .
  - إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد .
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :**
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء .

**البيوفسفونات .**

- البيسفوسفونات عند استعمالها لالتهاب **الفصال** (التهاب المفاصل) .
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم .
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط) .
- لفودوبا و كاربودوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي .
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة .
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة .
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي) .
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم .
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبازول و بانتوبازول .
- مخاطر التداخل في الإختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز .

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ .

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء .  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها .

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات .

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

**FERPLEX® 40 mg****Fer protéine succinylate****Boîte de 10 Falcons buvables****PPV 60,00 Dhs****6 118001 440016****وية أخرى :**

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون و تراسيسكيلين .  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

**نشرة :**

**فيريلكس 40 ملغ**  
**بروتين سينسيلات الحديد**

**الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء .**

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى .
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني .
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً . لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك .
- في حالة تقاوم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه .

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله .
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة .
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
6. معلومات إضافية .

**1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد .  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد .

**2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

**لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :**

- إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء .
  - إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب .
  - إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية) .
  - إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد .
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :**
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء .

**البيوفسفونات .**

- البيسفوسفونات عند استعمالها لالتهاب **الفصال** (التهاب المفاصل) .
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم .
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط) .
- لفودوبا و كاربودوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي .
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة .
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة .
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي) .
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم .
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبازول و بانتوبازول .
- مخاطر التداخل في الإختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز .

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ .

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء .  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها .

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات .

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

**FERPLEX® 40 mg****Fer protéine succinylate****Boîte de 10 Falcons buvables****PPV 60,00 Dhs****6 118001 440016****وية أخرى :**

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون و تراسيسكيلين .  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

**نشرة :**

**فيريلكس 40 ملغ**  
**بروتين سينسيلات الحديد**

**الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء .**

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى .
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني .
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً . لا تناوله لشخص آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك .
- في حالة تقاوم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه .

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله .
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة .
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
6. معلومات إضافية .

**1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد .  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد .

**2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

**لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :**

- إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء .
  - إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب .
  - إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية) .
  - إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد .
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :**
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء .

**البيوفسفونات .**

- البيسفوسفونات عند استعمالها لالتهاب **الفصال** (التهاب المفاصل) .
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم .
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط) .
- لفودوبا و كاربودوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي .
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة .
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة .
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي) .
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم .
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبازول و بانتوبازول .
- مخاطر التداخل في الإختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز .

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ .

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء .  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها .

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات .

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

**FERPLEX® 40 mg****Fer protéine succinylate****Boîte de 10 Falcons buvables****PPV 60,00 Dhs****6 118001 440016****وية أخرى :**

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون و تراسيسكيلين .  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

**نشرة :**

**فيريلكس 40 ملغ**  
**بروتين سينسيلات الحديد**

**الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء .**

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى .
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني .
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً . لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك .
- في حالة تقاوم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه .

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله .
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة .
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
6. معلومات إضافية .

**1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد .  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد .

**2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

**لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :**

- إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء .
  - إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب .
  - إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية) .
  - إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد .
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :**
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء .

**البيوفسفونات .**

- البيسفوسفونات عند استعمالها لالتهاب **الفصال** (التهاب المفاصل) .
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم .
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط) .
- لفودوبا و كاربودوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي .
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة .
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة .
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي) .
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم .
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبازول و بانتوبازول .
- مخاطر التداخل في الإختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز .

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ .

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء .  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها .

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات .

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

**FERPLEX® 40 mg****Fer protéine succinylate****Boîte de 10 Falcons buvables****PPV 60,00 Dhs****6 118001 440016****وية أخرى :**

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون و تراسيسكيلين .  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

**نشرة :**

**فيريلكس 40 ملغ**  
**بروتين سينسيلات الحديد**

**الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء .**

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى .
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني .
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً . لا تناوله لشخص آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك .
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه .

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله .
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة .
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
6. معلومات إضافية .

**1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد .  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد قياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد .

**2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

**لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :**

- إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء .
  - إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب .
  - إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريزي و داء ترسب الأصبغة الدموية) .
  - إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد .
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :**
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء .

**البيوفسفونات .**

- البيسفوسفونات عند استعمالها لالتهاب **الفصال** (التهاب المفاصل) .
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم .
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط) .
- لفودوبا و كاريدوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي .
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة .
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة .
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي) .
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم .
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول و لنزوبازول و بانتوبازول .
- مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز .

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ .

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج .

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء .  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها .

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات .

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

**FERPLEX® 40 mg****Fer protéine succinylate****Boîte de 10 Falcons buvables****PPV 60,00 Dhs****6 118001 440016****وية أخرى :**

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون و تراسيسكيلين .  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

**نشرة :**

**فيريلكس 40 ملغ**  
**بروتين سينسيلات الحديد**

**الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء .**

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى .
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني .
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً . لا تناوله لشخص آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك .
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه .

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله .
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة .
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
6. معلومات إضافية .

**1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد .  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد قياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد .

**2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

**لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :**

- إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء .
  - إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب .
  - إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية) .
  - إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد .
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :**
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء .

**البيوفسفونات .**

- البيسفوسفونات عند استعمالها لالتهاب **الفصال** (التهاب المفاصل) .
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم .
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط) .
- لفودوبا و كاربودوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي .
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة .
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة .
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي) .
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم .
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجذر العدي الريني مثل أوميبرازول و لنزوبازول و بانتوبرازول .
- مخاطر التداخل في الإختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز .

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ .

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء .  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها .

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات .

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

**FERPLEX® 40 mg****Fer protéine succinylate****Boîte de 10 Falcons buvables****PPV 60,00 Dhs****6 118001 440016****وية أخرى :**

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون و تراسيسكيلين .  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

**نشرة :**

**فيريلكس 40 ملغ**  
**بروتين سينسيلات الحديد**

**الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء .**

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى .
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني .
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً . لا تناوله لشخص آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك .
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه .

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله .
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة .
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
6. معلومات إضافية .

**1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد .  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد قياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد .

**2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

**لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :**

- إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء .
  - إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب .
  - إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية) .
  - إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد .
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :**
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء .

**البيوفسفونات .**

- البيسفوسفونات عند استعمالها لالتهاب **الفصال** (التهاب المفاصل) .
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم .
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط) .
- لفودوبا و كاربودوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي .
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة .
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة .
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي) .
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم .
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدني مثل أوميبرازول و لنزوبازول و بانتوبرازول .
- مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز .

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ .

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج .

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء .  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها .

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات .

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

**FERPLEX® 40 mg****Fer protéine succinylate****Boîte de 10 Falcons buvables****PPV 60,00 Dhs****6 118001 440016****وية أخرى :**

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون و تراسيسكيلين .  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

**نشرة :**

**فيريلكس 40 ملغ**  
**بروتين سينسيلات الحديد**

**الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء .**

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى .
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني .
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً . لا تناوله لشخص آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك .
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه .

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله .
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة .
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
6. معلومات إضافية .

**1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد .  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد قياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد .

**2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

**لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :**

- إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء .
  - إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب .
  - إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريزي و داء ترسب الأصبغة الدموية) .
  - إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد .
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :**
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء .

**البيوفسفونات .**

- البيسفوسفونات عند استعمالها لالتهاب **الفصال** (التهاب المفاصل) .
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم .
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط) .
- لفودوبا و كاريدوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي .
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة .
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة .
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي) .
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم .
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول و لنزوبازول و بانتوبازول .
- مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز .

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ .

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج .

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء .  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها .

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات .

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

**FERPLEX® 40 mg****Fer protéine succinylate****Boîte de 10 Falcons buvables****PPV 60,00 Dhs****6 118001 440016****وية أخرى :**

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون و تراسيسكيلين .  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

**نشرة :**

**فيريلكس 40 ملغ**  
**بروتين سينسيلات الحديد**

**الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء .**

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى .
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني .
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً . لا تناوله لشخص آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك .
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه .

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله .
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة .
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
6. معلومات إضافية .

**1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد .  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد قياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد .

**2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

**لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :**

- إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء .
  - إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب .
  - إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية) .
  - إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد .
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :**
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء .

**البيوفسفونات .**

- البيسفوسفونات عند استعمالها لالتهاب **الفصال** (التهاب المفاصل) .
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم .
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط) .
- لفودوبا و كاريدوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي .
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة .
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة .
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي) .
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم .
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبازول و بانتوبرازول .
- مخاطر التداخل في الإختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز .

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ .

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج .

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء .  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها .

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات .

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

**FERPLEX® 40 mg****Fer protéine succinylate****Boîte de 10 Falcons buvables****PPV 60,00 Dhs****6 118001 440016****وية أخرى :**

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون و تراسيسكيلين .  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

**نشرة :**

**فيريلكس 40 ملغ**  
**بروتين سينسيلات الحديد**

**الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء .**

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى .
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني .
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً . لا تناوله لشخص آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك .
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه .

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله .
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة .
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
6. معلومات إضافية .

**1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد .  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد قياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد .

**2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

**لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :**

- إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء .
  - إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب .
  - إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريزي و داء ترسب الأصبغة الدموية) .
  - إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد .
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :**
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء .

**البيوفسفونات .**

- البيسفوسفونات عند استعمالها لالتهاب **الفصال** (التهاب المفاصل) .
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم .
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط) .
- لفودوبا و كاريدوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي .
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة .
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة .
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي) .
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم .
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول و لنزوبازول و بانتوبرازول .
- مخاطر التداخل في الإختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز .

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ .

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء .  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها .

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة القيادة واستعمال الآلات .

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

**FERPLEX® 40 mg****Fer protéine succinylate****Boîte de 10 Falcons buvables****PPV 60,00 Dhs****6 118001 440016****وية أخرى :**

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون و تراسيسكيلين .  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

**نشرة :**

**فيريلكس 40 ملغ**  
**بروتين سينسيلات الحديد**

**الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء .**

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى .
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني .
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً . لا تناوله لشخص آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك .
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه .

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله .
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة .
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
6. معلومات إضافية .

**1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد .  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد قياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد .

**2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

**لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :**

- إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء .
  - إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب .
  - إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريزي و داء ترسب الأصبغة الدموية) .
  - إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد .
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :**
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء .

**البيوفسفونات .**

- البيسفوسفونات عند استعمالها لالتهاب **الفصال** (التهاب المفاصل) .
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم .
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط) .
- لفودوبا و كاريدوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي .
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة .
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة .
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي) .
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم .
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول و لنزوبازول و بانتوبازول .
- مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز .

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ .

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج .

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء .  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها .

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات .

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

**FERPLEX® 40 mg****Fer protéine succinylate****Boîte de 10 Falcons buvables****PPV 60,00 Dhs****6 118001 440016****وية أخرى :**

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون و تراسيسكيلين .  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

**نشرة :**

**فيريلكس 40 ملغ**  
**بروتين سينسيلات الحديد**

**الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء .**

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى .
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني .
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً . لا تناوله لشخص آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك .
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه .

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله .
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة .
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
6. معلومات إضافية .

**1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد .  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد قياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد .

**2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

**لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :**

- إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء .
  - إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب .
  - إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية) .
  - إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد .
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :**
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء .

**البيوفسفونات .**

- البيسفوسفونات عند استعمالها لالتهاب **الفصال** (التهاب المفاصل) .
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم .
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط) .
- لفودوبا و كاريدوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي .
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة .
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة .
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي) .
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم .
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبازول و بانتوبرازول .
- مخاطر التداخل في الإختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز .

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ .

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء .  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها .

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات .

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

**FERPLEX® 40 mg****Fer protéine succinylate****Boîte de 10 Falcons buvables****PPV 60,00 Dhs****6 118001 440016****وية أخرى :**

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون و تراسيسكيلين .  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

**نشرة :**

**فيريلكس 40 ملغ**  
**بروتين سينسيلات الحديد**

**الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء .**

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى .
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني .
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً . لا تناوله لشخص آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك .
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه .

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله .
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة .
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب .
6. معلومات إضافية .

**1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد .  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد قياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد .

**2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

**لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :**

- إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء .
  - إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب .
  - إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريزي و داء ترسب الأصبغة الدموية) .
  - إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد .
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :**
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء .

**البيوفسفونات .**

- البيسفوسفونات عند استعمالها لالتهاب **الفصال** (التهاب المفاصل) .
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم .
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط) .
- لفودوبا و كاريدوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي .
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة .
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة .
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي) .
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم .
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول و لنزوبازول و بانتوبازول .
- مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز .

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ .

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء .  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها .

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات .

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

**FERPLEX® 40 mg**

Fer protéinisé glycylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

وية أخرى :

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون وترايسيكلين.  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

نشرة :

**فيريلكس 40 ملغ**  
بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تقاوم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. **ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد قياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. **ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

البفوسفونات.

- البيسفوسفاتين عند استعمالها لالتهاب الفصال (التهاب المفاصل).
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).
- لفودوبا و كاربودوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي)
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبازول و بانتوبازول.
- مخاطر التداخل في الإختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ من مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

**FERPLEX® 40 mg**

Fer protéinisé glycylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

وية أخرى :

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون وترايسيكلين.  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

نشرة :

**فيريلكس 40 ملغ**  
بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تقاوم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. **ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد قياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. **ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

البفوسفونات.

- البيسفوسفاتين عند استعمالها لالتهاب الفصال (التهاب المفاصل).
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).
- لفودوبا و كاربودوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي)
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبازول و بانتوبرازول.
- مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ من مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

**FERPLEX® 40 mg**

Fer protéinisé glycylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

وية أخرى :

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون وترايسيكلين.  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

نشرة :

**فيريلكس 40 ملغ**  
بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله لشخص آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تقاوم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. **ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد قياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. **ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

البفوسفونات.

- البيسيفلامين عند استعمالها لالتهاب الفصال (التهاب المفاصل).
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).
- لفودوبا و كاربودوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي)
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبازول و بانتوبرازول.
- مخاطر التداخل في الإختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ من مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

**FERPLEX® 40 mg**

Fer protéinisé glycylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

وية أخرى :

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون وترايسيكلين.  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

نشرة :

**فيريلكس 40 ملغ**  
بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تقاوم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. **ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد قياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. **ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

البفوسفونات.

- البيسيفلامين عند استعمالها لالتهاب الفصال (التهاب المفاصل).
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).
- لفودوبا و كاربودوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي)
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبازول و بانتوبازول.
- مخاطر التداخل في الإختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

**FERPLEX® 40 mg**

Fer protéinisé glycylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

وية أخرى :

ت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم  
مقة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني :  
سنتفحص كينولون وترايسيكلين.  
أخرى لعلاج مشاكل العظام (تخلخل العظم) مثل

نشرة :

**فيريلكس 40 ملغ**  
بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تقاوم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. **ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد قياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. **ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

البفوسفونات.

- البيسفوسفاتين عند استعمالها لالتهاب الفصال (التهاب المفاصل).
- الفاميتيل دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
- تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الحرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).
- لفودوبا و كاربودوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.
- انخفاض الامتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أعلاه، لا بد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي)
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبازول و بانتوبرازول.
- مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

**تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ من مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.  
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة القيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سكرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،