

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
 - Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
 - La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
 - L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
 - En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
 - Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
 - Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Béédération :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
 - Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
 - La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
 - La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 - Prise en charge : pec@mupras.com
 - Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS :Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (L.G.) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

Nº W19-433154

000829A01

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule : 07470	Société : Uo586		
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre	
Nom & Prénom : ASNI Abderra lmane.			
Date de naissance :	06-01-1962		
Adresse :	Re 9 Imm 19 Apt 5 Rajolo Cosa		
Tél. : 0672228333	Total des frais engagés :		Dhs

Cadre réservé au Médecin	 Dr. A. BENE AFINI Spécialiste en Gynécologie Obstétrique 3d Oum Rabii Rés. Abouab Oum Rabii 93100 Culfa, Casablanca - Tél: 252-12-00
Cachet du médecin :	
Date de consultation :	10/08/2000
Nom et prénom du malade :	Asma Mamita Age: 59
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même <input checked="" type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :	affection gynécologique
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :	
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.	

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :.....

1. **What is the primary purpose of the study?**

sur la présente déclaration. Je déclare que les informations personnelles

—
—

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10-08-1998 E	100% DS		2	INP : 09125326

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Dr. TIRI Dr. HASSAN Tél: 022 911 11 11 PHARMACIE D'EXCELENCE TÉL: 022 911 11 11</i>	<u>10.8.2020.</u>	<u>381.30</u>
	<u>17.9.2020.</u>	<u>270.90</u>

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<p>Dr. Hind AL ATAWNA Anatomo-Cyto-pathologiste Centre de Pathologie 17 Avenue centrale n° 14 Bd. Abdelmoumen Tél: 0522 12 12 12</p>	24/08/20		200 DA

fax: 0520 283300 CASO MEDICALIX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'OOF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 B 00000000 11433553		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Amelie BENDAHMAN

Spécialiste en gynécologie-obstétrique

Suivi de grossesse - Accouchement

Stérilité du couple - Echographie - Diagnostic prénatal

Chirurgie gynécologique

Colposcopie - Hystéroskopie - Cœliochirurgie

Maladie et chirurgie du sein

Ancien médecin chef du centre de dépistage

du cancer du sein et du col - El Fida -



الدكتورة أمينة بندمان

اختصاصية في أمراض النساء والتوليد

مراقبة الحمل - الولادة

العمق عند الزوجين - الفحص بالصدري

الجراحة النسائية والجراحية بالمنظار

تنظير عنق الرحم

أمراض و جراحة الثدي

طبيبة رئيسية سابقاً للمركز المرجعي لمحاربة سرطان الثدي

وعنق الرحم - القداء -

Casablanca Le :

10 - 08 - 80 b

ame Asmi Yamila

98.00xl

+ 30.88el (x 2)

10.80 x 15

500

98.00

Alcasten

PHARMACIE POLYCLINIQUE
Dr TIR Abdelaziz
Riv. Hay Thami - Hay Hassani
Tél. 02 90.21.67 - CASA

87.50

der m fix crème

381.80

d. Flucon 100g

الدكتورة أمينة بندمان
Dr Amelie BENDAHMAN
Spécialiste en Gynécologie Obstétrique
Bd Oum Rabii Rés. Abouab Oum Rabii - 1^{er} étage 3 App. 9 - CASABLANCA
Tél. 05 22 91 02 02 - 06 61 41 44 44 - E-mail : bendahmangyn@gmail.com

Bd Oum Rabii - Rés. Abouab Oum Rabii - 1^{er} étage 3 App. 9 - CASABLANCA

05 22 91 02 02 - 06 61 41 44 44 - bendahmangyn@gmail.com

FIX® Crème conazole

Composition :

Sertaconazole nitrate
Excipients (dont E218)

Propriétés :

Le Sertaconazole est
- levures pathogènes
- dermatophignons (trichosporon)
- champignons opportunistes
- germes résistants à d'autres anti-mycosiques
- bactéries gram+ (Staphylococques et Streptococques)

Indications thérapeutiques :

Traitements topiques des mycoses superficielles de la peau telles que dermatophytoses : Tinea pedis (pied d'athlète), Tinea cruris (Eczéma marginé de Hebra), Tinea corporis (Herpès circiné), Tinea barbae (Sycosis), et Tinea manus, Candidoses (Minilliote) et Pityriasis versicolor (Pityrosporum orbiculare).

Effets indésirables :

Le Sertaconazole présente une innocuité totale et une excellente tolérance : aucun cas de toxicité ou de réaction de photosensibilité n'a été relevé. Seul un érythème léger peut survenir lors des premières applications n'entraînant jamais la suspension du traitement.

Conditions particulières d'emploi :

Dermofix ne convient pas à l'usage ophthalmique.

Après l'application dermique de grandes quantités, on ne détecte pas de niveaux plasmatiques. Malgré cela, son innocuité n'a pas été démontrée chez le nouveau-né et chez la femme enceinte ou allaitante.

Posologie usuelle, voie et mode d'administration :

Voie topique.

Appliquer la crème une fois par jour (de préférence le soir) ou deux fois (matin et soir), doucement et uniformément, en essayant de couvrir 1 cm de peau saine (environ) autour de la zone à traiter.

La durée du traitement varie d'un patient à l'autre en fonction de l'agent étiologique et de la localisation de l'infection.

En général, on recommande quatre semaines de traitement afin d'assurer une guérison clinique et microbiologique complète et d'éviter ainsi toute récidive, cette guérison clinico-microbiologique peut apparaître entre deux et quatre semaines de traitement.

Pityriasis versicolor : 2 semaines

Dermatophytose : 2 à 4 semaines

Candidose : 2 à 4 semaines

Formes et autres présentations :

Dermofix® crème 2% tube de 30 g

Dermofix® poudre flacon de 30 g

Dermofix® Solution 2% flacon de 30 ml

Dermofix® Gel 2% flacon de 50 g

Dermofix® Gel 2% flacon de 100 g

Gyno-dermofix® 300 mg boîte de 1 ovule.

Liste I (Tableau A)

FRANCE

8, Rue CHRISTOPHE COLOMB, 75008 PARIS
LABORATOIRES JUVA SANTE

- Flacon de 250 ml
- Flacon de 125 ml

PRESSENTATION :

Aqua, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Lauryl Betaine, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Polysorbate 20, Arctium majus Root Extract, Salicylic Acid, Sodium Glycoolate, Lavandula angustifolia oil, Magnesium Chloride, Methylisothiazolinone, Hydroxide, Methylchloroisothiazolinone, Magnesium Nitrate, Sodium Benzoate, Etanercept.

Eviter tout contact avec les yeux, en cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire.
A utiliser sur la peau et les muqueuses préalablement mouillées, puis rincer à l'eau. Usage extrême.

CONSEILS D'UTILISATION :

ALCASTER® est un soin lavant anti-odeurs. Il laisse une odeur agréable sur les muqueuses et la peau.
ALCASTER® est reconnue pour ses propriétés adoucissantes et calmantes des irritations. Permettant un lavage quotidien des muqueuses et des peaux sensibles. La Bardane est recommandée pour ses démanagements et les irritations. Ses actifs très doux en adoucissent les traitements antimicrobiens.

ALCASTER®, grâce à son pH alcalin, est un produit adapté pour l'hygiène intime

PROPRIETE:

minimise les risques de réactions aigres.
en, hypoallergénique, à pH alcalin,

AMZ1 L7M
LOT 0223
Prix PER
00-986

EMENTS
ES

ERLL

بليسل® 50 ميكروغرام/غرام، جل مهيلي

تسمية عاملية مشتركة : إستريول

الفحوص الطبية

بمجرد ابتداء العلاج بالهرمونات البديلة، استشروا الطبيب بانتظام.

خلال هذه المراقبات، قد ينافس طيبك معك فوائد ومخاطر استمرار العلاج بالهرمونات البديلة.

لا يستعمل بليسل:

إذا كان لديك، أو إذا كان شبيه لديك وجود درم التدي.

• إذا كان لديك أو تشك بآن لديك درم حساس لمهرمون الاستروجين، مثل درم بطانة الرحم (بطانة الرحم).

• إذا كان لديك نزيف مهيلي غير متوقع.

• إذا كان لديك سماكة مفرطة بطانة الرحم (فترم تسنج بطانة الرحم) ليس في العلاج.

• إذا كان لديك أو كان لديك خثر الوريد في المراضي (تشكل)، على سبيل المثال في الساقين

(تشكل الأوردة العميقية) أو في الرئتين (الادساد الريوي).

• إذا كان لديك مشاكل مع نظام الخثرة (كعلى سبيل المثال، نقص البروتين C، بروتين S أو مضاد الترومين).

• إذا كان لديك أو أصبت مؤخراً بمارض ناجمة عن تخثر الشريان، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو النوبة العصرية:

• إذا كنت تعاني من أمراض كبدية في الماخي وتم استقرار عمل الكبد بعد العلاج بجرعات مرتفعة بالاستروجينات.

• إذا كان لديك اضطراب نادر في الدم يسمى البوروفيريا (وهذا حالة وراثية).

• إذا كنت تعاني من حساسية (فترم الحساسية) في إستريول أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (انظر المراجع)، وهو ضعف أو

بطانة الرحم، وكذلك جلطات الدم في

يكون من جرائم جد مخحفة من أصل

جداً، إذا كنت قلقاً من هذه الأخطاء.

تحذير والاحتياطات

يعطي هذا الدواء عن طريق إدخال مؤشر في المهبل. هذا يمكن أن يسبب تهيج أو

ازتعاج لدى النساء اللواتي لديهم ضمور المهبل الشديد (ترقق أو اتهاب في جدران

المهبل).

• إذا كان لديك، إذا أصبت، أو إذا طيبك شك في سرطان الثدي أو سرطان الرحم.

• إذا كنت حاملاً أو تفكرين أن تكون حاملاً.

• إذا كان لديك نزف مهبلي غير طبيعي.

• إذا كان لديك أو غيرها في التسنج المخاطي الرحمي (فترم تسنج بطانة

الرحم)،

• إذا كنت تعاني من جلطات الدم في أوردة الساقين (خثار وردي عميق)،

أو في الرئتين (انصمام رئوي).

• إذا كان لديك، أو لديك مشاكل في القلب مؤخراً مثل الذبحة الصدرية أو نوبة قلبية.

• إذا كان لديك مرض حاد في الكبد، أو إذا كنت تعاني من مرض في الكبد و ظائف

الكبد تم تعدى إلى طبيعتها.

• إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) للإستريول أو إحدى مكونات بليسل،

إذا كنت تعاني من البوروفيريا (مرض استقلالي نادر)،

أيضاً طيبك إذا كان لديك أو إذا عانيت من الأمراض التالية (الأمراض التالية أو

حالات نادرة، يمكن أن تذكر أو تتفاقم خلال فترة العلاج بليسل):

• اضطرابات قلبية أو دموية.

• فترم في الكوليستيرول أو مواد ذهنية أخرى في الدم.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

• حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراراتها مرة أخرى.

• إذا كان لديك أي سلالة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طيبك أو صيدلياتك.

• هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخص آخر أبداً ولو في وجود أغراض مماثلة، قد يضره ذلك.

• في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلع طيبك أو صيدلياتك عليه.

فهرس النشرة

1. ما هو بليسل 50 ميكروغرام، جل مهيلي وفي أي الحالات يجب استعماله

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ بليسل 50 ميكروغرام، جل

مهيلي

3. كيفية استخدام بليسل 50 ميكروغرام، جل مهيلي

4. ما هي تأثيرات الجاذبية المختلطة

5. كيف يتم تخزين بليسل 50 ميكروغرام، جل مهيلي

6. معلومات إضافية

1. ما هو بليسل 50 ميكروغرام، جل مهيلي وفي أي الحالات يجب استعماله

المجموعة العيالنية العامة :

بليسل يحتوى على إستريول، وهو هرمون سلائى يشبه هرمون بيتنج طبيعياً من قبل الجسم، يسمى هرمون أستروجين.

بليسل يستعمل: لما يشكلوا التأثير المباين عن نفس هرمون الاستروجين.

هذا النقص يمكن أن يقلل من جدار المهبل، وبالأضافة إلى ذلك، يمكن تطوير الالتهابات المهبلية. يمكن

تلقيح هذه المشاكل عن طريق استخدام الأدوية مثل بليسل، الذي يحتوى على هرمون الاستروجين.

قد يستغرق الأمر عدة أيام أو أسبوعين قبل ملاحظة حدوث تحسن.

يوصف بليسل لعلاج حفاف المهبل الذي يرجع إلى نقص هرمون الاستروجين بعد سن اليأس.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ بليسل

مع كل الموارد. (العلاج الهرموني (الستيباري) له مخاطر معينة، والتي يجب عليك أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن بدء العلاج، أو الاستمرار.

قبل بدء العلاج الهرموني (الستيباري)

يجب على طيبك أن سألك أسلطاً من تاريخك الطبي الشخصي والعائلي. ويجوز له أيضاً أن يفرج قصص ثديك أو بطنه، كما يمكنه إجراء فحص داخلي، وسوف يفعل ذلك إلا إذا أراد المأمور بالنسبة لك، أو في حالات خاصة.

* أخير طيبك إذا كان لديك مشاكل أو أمراض طيبة.

أذلي سادة الأنابيب، واعكسي السادة و استخدمي الطرف الحاد لكسر لاصق عن الأنابيب.

1

Lot:

906

EXP:

03-2021

PPV:

98,00 Dhs


4

أزيكي أنابيب

3

كيفية استعمال بليسل :

التعليمات التالية تبين كيفية استعمال جل
من خلال الصورة التالية يمكن رؤية جميع مكونات الأنابيب وأداة
التطبيق (المكبس و أنابيب الحقن)



بليسل® 50 ميكروغرام/غرام، جل مهيلي

تسمية عاملية مشتركة : إستريول

الفحوص الطبية

بمجرد ابتداء العلاج بالهرمونات البديلة، استشروا الطبيب بانتظام.

خلال هذه المراقبات، قد ينافس طيبك معك فوائد ومخاطر استمرار العلاج بالهرمونات البديلة.

لا يستعمل بليسل:

إذا كان لديك، أو إذا كان شبيه لديك وجود درم التدي.

• إذا كان لديك أو تشك بآن لديك درم حساس لمهرمون الاستروجين، مثل درم بطانة الرحم (بطانة الرحم).

• إذا كان لديك نزيف مهيلي غير متوقع.

• إذا كان لديك سماكة مفرطة بطانة الرحم (فترم تسنج بطانة الرحم) ليس في العلاج.

• إذا كان لديك أو كان لديك خثر الوريد في المراضي (تشكل)، على سبيل المثال في الساقين

(تشكل الأوردة العميقية) أو في الرئتين (الادساد الريوي).

• إذا كان لديك مشاكل مع نظام الخثرة (كعلى سبيل المثال، نقص البروتين C، بروتين S أو مضاد الترومين).

• إذا كان لديك أو أصبت مؤخراً بمارض ناجمة عن تخثر الشريان، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو النوبة العصرية:

• إذا كنت تعاني من أمراض كبدية في الماخي وتم استقرار عمل الكبد بعد العلاج بجرعات مرتفعة بالاستروجينات.

• إذا كان لديك اضطراب نادر في الدم يسمى البوروفيريا (وهذا حالة وراثية).

• إذا كنت تعاني من حساسية (فترم الحساسية) في إستريول أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (انظر المراجع)، وهو ضعف أو

بطانة الرحم، وكذلك جلطات الدم في

يكون من جرائم جد مخحفة من أصل

جداً، إذا كنت قلقاً من هذه الأخطاء.

تحذير والاحتياطات

يعطي هذا الدواء عن طريق إدخال مؤشر في المهبل. هذا يمكن أن يسبب تهيج أو

ازتعاج لدى النساء اللواتي لديهم ضمور المهبل الشديد (ترقق أو اتهاب في جدران

المهبل).

• إذا كان لديك، إذا أصبت، أو إذا طيبك شك في سرطان الثدي أو سرطان الرحم.

• إذا كنت حاملاً أو تفكرين أن تكون حاملاً.

• إذا كان لديك نزف مهبلي غير طبيعي.

• إذا كان لديك أو غيرها في التسنج المخاطي الرحمي (فترم تسنج بطانة

الرحم)،

• إذا كنت تعاني من جلطات الدم في أوردة الساقين (خثار وردي عميق)،

أو في الرئتين (انصمام رئوي).

• إذا كان لديك، أو لديك مشاكل في القلب مؤخراً مثل الذبحة الصدرية أو نوبة قلبية.

• إذا كان لديك مرض حاد في الكبد، أو إذا كنت تعاني من مرض في الكبد و ظائف

الكبد تم تعدى إلى طبيعتها.

• إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) للإستريول أو إحدى مكونات بليسل،

إذا كنت تعاني من البوروفيريا (مرض استقلالي نادر)،

أيضاً طيبك إذا كان لديك أو إذا عانيت من الأمراض التالية (الأمراض التالية أو

حالات نادرة، يمكن أن تذكر أو تتفاقم خلال فترة العلاج بليسل):

• اضطرابات قلبية أو دموية.

• فترم في الكوليستيرول أو مواد ذهنية أخرى في الدم.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

• حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراراتها مرة أخرى.

• إذا كان لديك أي سلالة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طيبك أو صيدلياتك.

• هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخص آخر أبداً ولو في وجود أغراض مماثلة، قد يضره ذلك.

• في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مدرج في هذه النشرة، اطلع طيبك أو صيدلياتك عليه.

فهرس النشرة

1. ما هو بليسل 50 ميكروغرام، جل مهيلي وفي أي الحالات يجب استعماله

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ بليسل 50 ميكروغرام، جل

مهيلي

3. كيفية استخدام بليسل 50 ميكروغرام، جل مهيلي

4. ما هي تأثيرات الجاذبية المختلطة

5. كيف يتم تخزين بليسل 50 ميكروغرام، جل مهيلي

6. معلومات إضافية

1. ما هو بليسل 50 ميكروغرام، جل مهيلي وفي أي الحالات يجب استعماله

المجموعة العيالنية العامة :

بليسل يحتوى على إستريول، وهو هرمون سلائى يشبه هرمون بيتنج طبيعياً من قبل الجسم، يسمى هرمون أستروجين.

بليسل يستعمل: لما يشكلوا التأثير المباين عن نفس هرمون الاستروجين.

هذا النقص يمكن أن يقلل من جدار المهبل، وبالأضافة إلى ذلك، يمكن تطوير الالتهابات المهبلية. يمكن

تلقيح هذه المشاكل عن طريق استخدام الأدوية مثل بليسل، الذي يحتوى على هرمون الاستروجين.

قد يستغرق الأمر عدة أيام أو أسبوعين قبل ملاحظة حدوث تحسن.

يوصف بليسل لعلاج حفاف المهبل الذي يرجع إلى نقص هرمون الاستروجين بعد سن اليأس.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ بليسل

مع كل الموارد. (العلاج الهرموني (الستيباري) له مخاطر معينة، والتي يجب عليك أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن بدء العلاج، أو الاستمرار.

قبل بدء العلاج الهرموني (الستيباري)

يجب على طيبك أن سألك أسلطاً من تاريخك الطبي الشخصي والعائلي. ويجوز له أيضاً أن يفرج قصص ثديك أو بطنه، كما يمكنه إجراء فحص داخلي، وسوف يفعل ذلك إلا إذا أراد المأمور بالنسبة لك، أو في حالات خاصة.

* أخير طيبك إذا كان لديك مشاكل أو أمراض طيبة.

أذلي سادة الأنابيب، واعكسي السادة و استخدمي الطرف الحاد لكسر لاصق عن الأنابيب.

1

Lot:

906

EXP:

03-2021

PPV:

98,00 Dhs


4

أزيكي أنابيب

3

كيفية استعمال بليسل :

التعليمات التالية تبين كيفية استعمال جل
من خلال الصورة التالية يمكن رؤية جميع مكونات الأنابيب وأداة
التطبيق (المكبس و أنابيب الحقن)



Dr Amina BENDAHMAN

Spécialiste en gynécologie-obstétrique

Suivi de grossesse - Accouchement

Stérilité du couple - Echographie - Diagnostic prénatal

Chirurgie gynécologique

Colposcopie - Hystéroskopie - Cœliochirurgie

Maladie et chirurgie du sein

Ancien médecin chef du centre de dépistage

du cancer du sein et du col - El Fida -



الدكتورة أمينة بندحان

اختصاصية في امراض النساء والتوليد

مراقبة الحمل - الولادة

العمق عند الزوجين - الفحص بالصدى

الجراحة النسائية والجراحية بالمنظار

تنظير عنق الرحم

أمراض و جراحة الثدي

طبيبة رئيسيّة سابقاً للمركز المرجعي لمحاربة سلطان الثدي

وعنق الرحم - الفداء -

Casablanca Le :

17 SEPT 2020

4750X3 - 70c Asni Tamim
longevigance 200

6740

100 10x20

3930 20 lyg 200

PHARMACIE POLYCLINIQUE
DE RLR Abderrazak
El M. Hay Thami - Hay Hassan
Tél: 022 90.21.67 - CASA

22.70.

- establis 200

270 90 1.8 x 5j x 10

الدكتورة أمينة بندحان

Dr A. BENDAHMAN

Spécialiste en Gynécologie Obstétrique
Bd Oum Rabii Rés. Abouab Oum Rabii Etg 3 N°
Oulfa, Casablanca - Tél: 0522 91 02 02

Bd Oum Rabii - Rés. Abouab Oum Rabii - Imm.C étage 3 App. 9 - CASABLANCA

📞 05 22 91 02 02 - 06 61 41 44 44 📩 bendarhmangyn@gmail.com

longamycine®

Doxycycline

PRESENTATION

Longamycine 10

Longamycine 2

boîte de 10 comprimés

boîte de 8 comprimés

FORMULE :

Longamycine

DOXYCYCLINE monohydrate
de doxycycline base.

Excipients Q.S.P. un comprimé

Longamycine 200

DOXYCYCLINE monohydrate quantité correspondant à 200 mg
de doxycycline base.

Excipients Q.S.P. un comprimé.

PROPRIETES :

LONGAMYCINE est un antibiotique bactériostatique à large spectre de la famille des tétracyclines.

INDICATIONS :

- Brucellose
- Pasteurelloses
- Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae
- Infections pulmonaires et génito-urinaires à mycoplasmes
- Rickettsioses
- Infections à Coxiella burnetii (fièvre Q)
- Gonococcie
- Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aigües des bronchites chroniques
- Tréponèmes (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines)
- Spirochètes (maladie de lyme, leptospirose)
- Choléra
- Acné (manifestations cutanées associées à propionibacterium acnes)

CONTRE-INDICATIONS :

Allergie aux tétracyclines.

L'emploi de ce médicament est à éviter chez l'enfant de moins de huit ans (risque de dyschromie dentaire), ainsi que chez la femme enceinte ou allaitant (risque d'anomalie du bourgeon dentaire ou de dyschromie dentaire chez l'enfant).

- En association avec les rétinoïdes.



longamycine®

Doxycycline

PRESENTATION

Longamycine 10

Longamycine 2

boîte de 10 comprimés

boîte de 8 comprimés

FORMULE :

Longamycine

DOXYCYCLINE monohydrate

de doxycycline base.

Excipients Q.S.P. un comprimé

Longamycine 200

DOXYCYCLINE monohydrate quantité correspondant à 200 mg de doxycycline base.

Excipients Q.S.P. un comprimé.

PROPRIETES :

LONGAMYCINE est un antibiotique bactériostatique à large spectre de la famille des tétracyclines.

INDICATIONS :

- Brucellose
- Pasteurelloses
- Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae
- Infections pulmonaires et génito-urinaires à mycoplasmes
- Rickettsioses
- Infections à Coxiella burnetii (fièvre Q)
- Gonococcie
- Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aigües des bronchites chroniques
- Tréponèmes (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines)
- Spirochètes (maladie de lyme, leptospirose)
- Choléra
- Acné (manifestations cutanées associées à propionibacterium acnes)

CONTRE-INDICATIONS :

Allergie aux tétracyclines.

L'emploi de ce médicament est à éviter chez l'enfant de moins de huit ans (risque de dyschromie dentaire), ainsi que chez la femme enceinte ou allaitant (risque d'anomalie du bourgeon dentaire ou de dyschromie dentaire chez l'enfant).

- En association avec les rétinoïdes.



longamycine®

Doxycycline

PRESENTATION

Longamycine 10

Longamycine 2

boîte de 10 comprimés

boîte de 8 comprimés

FORMULE :

Longamycine

DOXYCYCLINE monohydrate
de doxycycline base.

Excipients Q.S.P. un comprimé

Longamycine 200

DOXYCYCLINE monohydrate quantité correspondant à 200 mg
de doxycycline base.

Excipients Q.S.P. un comprimé.

PROPRIETES :

LONGAMYCINE est un antibiotique bactériostatique à large spectre de la famille des tétracyclines.

INDICATIONS :

- Brucellose
- Pasteurelloses
- Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae
- Infections pulmonaires et génito-urinaires à mycoplasmes
- Rickettsioses
- Infections à Coxiella burnetii (fièvre Q)
- Gonococcie
- Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aigües des bronchites chroniques
- Tréponèmes (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines)
- Spirochètes (maladie de lyme, leptospirose)
- Choléra
- Acné (manifestations cutanées associées à propionibacterium acnes)

CONTRE-INDICATIONS :

Allergie aux tétracyclines.

L'emploi de ce médicament est à éviter chez l'enfant de moins de huit ans (risque de dyschromie dentaire), ainsi que chez la femme enceinte ou allaitant (risque d'anomalie du bourgeon dentaire ou de dyschromie dentaire chez l'enfant).

- En association avec les rétinoïdes.





POLYGYNAX®

CAPSULE VAGINALE

Sulfate de néomycine / Sulfate de polymyxine / Nystatine

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donner jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE POLYGYNAX, capsule vaginale, ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER POLYGYNAX, capsule vaginale ?
3. COMMENT UTILISER POLYGYNAX, capsule vaginale ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER POLYGYNAX, capsule vaginale ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE POLYGYNAX, capsule vaginale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTI-INFECTIEUX et ANTISEPTIQUES à USAGE GYNECOLOGIQUE

Si vous oubliez de prendre POLYGYNAX, capsule vaginale :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, POLYGYNAX, capsule vaginale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Possibilité d'eczéma allergique de contact ou à distance du lieu d'application, en cas d'emploi prolongé.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement auprès de l'autorité de santé compétente en matière de pharmacovigilance dans votre pays. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir d'avantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER POLYGYNAX, capsule vaginale ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser POLYGYNAX, capsule vaginale après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.



POLYGYNAX®

Sulfate de néomycine / Sulfate de polymyxine / Nystatine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donner jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE POLYGYNAX, capsule vaginale, ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER POLYGYNAX, capsule vaginale ?
 3. COMMENT UTILISER POLYGYNAX, capsule vaginale ?
 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
 5. COMMENT CONSERVER POLYGYNAX, capsule vaginale ?
 6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE POLYGYNAX, capsule vaginale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTI-INFECTIEUX et ANTISEPTIQUES à USAGE GYNECOLOGIQUE

Si vous oubliez de prendre POLYGYNAX, capsule vaginale :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, POLYGYNAX, capsule vaginale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Possibilité d'eczéma allergique de contact ou à distance du lieu d'application, en cas d'emploi prolongé.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement auprès de l'autorité de santé compétente en matière de pharmacovigilance dans votre pays. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir d'avantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER POLYGYNAX, capsule vaginale ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser POLYGYNAX, capsule vaginale après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

INT'L GIS®

LOT : 19099 PER : 08/2022
PPV : 22,70 DH

Ibuprofène 200 mg

COMPRIMÉ PELLICULÉ

COMPOSITION

Ibuprofène 200 mg
Amidon prégelatinisé ,Carboxyméthylamidon sodique, Povidone, Silice colloïdale anhydre , Acide stéarique.
Pelliculage : Hypromellose, polyoxy-8-stéarate, Hydroxypropylcellulose, éthanol dénaturé, dioxyde de titane.
Pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé .Boîte de 20 Comprimés.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Ce médicament est un ANTALGIQUE (il calme la douleur) ET ANTIPYRÉTIQUE (il fait baisser la fièvre).

DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : l'ibuprofène.

Il est indiqué dans le traitement de courte durée chez l'adulte (à partir de 15 ans) :-de la fièvre,-des douleurs d'origines diverses telles que maux de tête, douleurs dentaires, douleurs d'origine musculaire, articulaire, tendineuse ou ligamentaire,-des règles douloureuses.

ATTENTION ! DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Allergie connue à l'ibuprofène ou à un médicament apparenté (autres anti-inflammatoires ou aspirine),
- Ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, -Maladie grave du foie, -Maladie grave des reins,-Asthme,
- Enfants de moins de 15 ans.
- Demier trimestre de la grossesse
- Allaitement.

Lors de la varicelle, il est prudent d'éviter l'utilisation de ce médicament.

NE PAS ASSOCIER AVEC UN AUTRE ANTI-INFLAMMATOIRE, NI AVEC L'ASPIRINE, EN CAS DE DOUTE,
IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MISES EN GARDE SPECIALES

A fortes doses, supérieures à 1200 mg, soit 6 comprimés par jour, ce médicament possède des propriétés anti-inflammatoires et peut provoquer des inconvénients parfois graves qui sont observés avec les médicaments anti-inflammatoires.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament AVEC PRECAUTION en cas de : -maladie du cœur, du foie ou du rein, -allergie ancienne ou de crise d'asthme lors de la prise d'aspirine ou d'un anti-inflammatoire, -contraception par stérilet, - grossesse. EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT

INT'L GIS®

LOT : 19099 PER : 08/2022
PPV : 22,70 DH

Ibuprofène 200 mg

COMPRIMÉ PELLICULÉ

COMPOSITION

Ibuprofène 200 mg
Amidon prégelatinisé ,Carboxyméthylamidon sodique, Povidone, Silice colloïdale anhydre , Acide stéarique.
Pelliculage : Hypromellose, polyoxy-8-stéarate, Hydroxypropylcellulose, éthanol dénaturé, dioxyde de titane.
Pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé .Boîte de 20 Comprimés.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Ce médicament est un ANTALGIQUE (il calme la douleur) ET ANTIPYRÉTIQUE (il fait baisser la fièvre).

DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : l'ibuprofène.

Il est indiqué dans le traitement de courte durée chez l'adulte (à partir de 15 ans) :-de la fièvre,-des douleurs d'origines diverses telles que maux de tête, douleurs dentaires, douleurs d'origine musculaire, articulaire, tendineuse ou ligamentaire,-des règles douloureuses.

ATTENTION ! DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Allergie connue à l'ibuprofène ou à un médicament apparenté (autres anti-inflammatoires ou aspirine),
- Ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, -Maladie grave du foie, -Maladie grave des reins,-Asthme,
- Enfants de moins de 15 ans.
- Demier trimestre de la grossesse
- Allaitement.

Lors de la varicelle, il est prudent d'éviter l'utilisation de ce médicament.

NE PAS ASSOCIER AVEC UN AUTRE ANTI-INFLAMMATOIRE, NI AVEC L'ASPIRINE, EN CAS DE DOUTE,
IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MISES EN GARDE SPECIALES

A fortes doses, supérieures à 1200 mg, soit 6 comprimés par jour, ce médicament possède des propriétés anti-inflammatoires et peut provoquer des inconvénients parfois graves qui sont observés avec les médicaments anti-inflammatoires.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament AVEC PRECAUTION en cas de : -maladie du cœur, du foie ou du rein, -allergie ancienne ou de crise d'asthme lors de la prise d'aspirine ou d'un anti-inflammatoire, -contraception par stérilet, - grossesse. EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT

Dr Amina BENDAHMAN

Spécialiste en gynécologie-obstétrique

Suivi de grossesse - Accouchement

Stérilité du couple - Echographie - Diagnostic prénatal

Chirurgie gynécologique

Colposcopie - Hystéroskopie - Cœliochirurgie

Maladie et chirurgie du sein

Ancien médecin chef du centre de dépistage

du cancer du sein et du col - El Fida -



الدكتورة أمينة بندحمان

اختصاصية في أمراض النساء والتوليد

مراقبة الحمل - الولادة

العمق عند الزوجين - الفحص بالصدى

الجراحة النسائية والجراحة بالمنظار

تنظير عنق الرحم

أمراض وجراحة الثدي

طبيبة رئيسية سابقاً لمركز المرجعي لمحاربة سرطان الثدي

وعنق الرحم - القداء

Casablanca Le :

10-08-2020
Dr ASMA BENDAHMAN

consulter le → 800

Echo gynéco → 0

400 00

الدكتورة أمينة بندحمان
Dr A. BENDAHMAN
Spécialiste en Gynécologie Obstétrique
Bd Oum Rabii Rés. Abouab Oum Rabii Etg 3 N°
Oulfa, Casablanca - Tél: 0522 91 02 02

Bd Oum Rabii - Rés. Abouab Oum Rabii - Imm.C étage 3 App.9 - CASABLANCA

📞 05 22 91 02 02 - 06 61 41 44 44 📩 bendarhmangyn@gmail.com



CENTRE DE PATHOLOGIE
IBN ZOHR

CENTRE DE PATHOLOGIE IBN ZOHR

مركز تشريح الخلايا والأنسجة ابن زهر

Dr. Hind ALATAWNA

RECU LE : 24/08/2020
EDITE LE : 26/08/2020

NOM & PRENOM : ASNI JAMILA
PRESCRIPTEUR : DR BENDAHMAN.A
Age : 59 ANS
N/REF : C00824101

Nature du prélèvement : Frottis monocouche

Renseignements cliniques :

COMPTE RENDU

TECHNIQUE MONOCOUCHE :

Qualité du frottis : optimale.

Diagnostic descriptif :

1) Evaluation hormonale :

Atrophie .

2) Microbiologie :

Inflammation sévère avec polynucléaires neutrophiles sans agent mycélien ou parasitaire identifiable. Flore de Doderlein modérée.

3) Cellules pavimenteuses :

Intermédiaires + parabasales normales.

4) Cellules glandulaires :

Présence de cellules cylindriques endocervicales normales, disposées en amas monocouche, ailleurs en métaplasie malpighienne mature et immature.

CONCLUSION :

Frottis cervical jonctionnel, atrophique sévèrement inflammatoire avec métaplasie malpighienne mature et immature, sans signe de dysplasie ou de néoplasie

Signé : Dr. Hind ALATAWNA

Dr. Hind ALATAWNA
Anatomo-Cyto-Pathologiste
Centre de Pathologie Ibn Zohr
17 Louvre Center n° 1 Angle
Bd. Abdelmoumen et Bachir Lakej Casab
Tel: 0522 23 37 50 Fax: 0522 23 39 50

17, Louvre Center, Angle Bd Abdelmoumen et Rue Bachir El Alj, App : N° 1 - Casablanca

Tél : 05 22 23 37 50 - 06 66 39 39 60 - Fax : 05 22 23 39 50

E-mail : patho.ibnzohr@gmail.com - ICE : 001864938000053



CENTRE DE PATHOLOGIE IBN ZOHR

مختبر تشريح الخلايا والأنسجة ابن زهر

Dr. Hind ALATAWNA

Casablanca, le 07/09/2020

Nom & Prénom : ASMI JAMILA
Référence : C00824101
Date de facturation : 24/08/2020

FACTURE N° 20/1980

Nature du prélèvement	Cotation	Montant TTC
Cytologie		200,00 Dhs
Frottis monocouche		

Arrêtée la présente facture à la somme de Deux cents Dirhams

Signé :

Dr. Hind ALATAWNA
Anatomo-Cyto-Pathologiste
Centre de Pathologie Ibn Zohr
17 Louvre Centre n° 1 Angle
Bd. Abdelmoumen et Bachir Latéef Casab
Tél: 0522 23 37 50 Fax: 0522 23 39 50

Patente N° 34 70 83 72

ICE : 001864938000053

INPE : 091151944

17, Louvre Centre, Angle Bd Abdelmoumen et Rue Bachir El Alj, App : N° 1
(Tramway, Station Abdelmoumen) - Casablanca

Tél. : 05 22 23 37 50 - Fax : 05 22 23 39 50 - Email : patho.ibnzohr@gmail.com



CENTRE DE PATHOLOGIE IBN ZOHR

CENTRE DE PATHOLOGIE
IBN ZOHR

Dr. Hind ALATAWNA

DEMANDE D'EXAMEN ANATOMO-CYTOPATHOLOGIQUE

Ordonnance du Docteur :

Nom et prénom : Asma Yamina Mr Mme Mlle ENF

Age : 59 ans

Référence :

Siège et nature du prélèvement :

Cytologie :

- Frottis de dépistage : Vagin Exocol Endocol Endomètre

- Date des dernières règles :

- Traitements éventuels :

Renseignements cliniques et paracliniques :

Radiographies :

Dr. Hind ALATAWNA - 08 - Signature :

Anatomo-Cyto-Pathologiste
Centre de Pathologie Ibn Zohr
17 Louvre center n° 1 Angle r
Bd. Abdelmoumen et Bachir Latif
Tél: 0522 23 37 50 Fax: 0522 23 39 30 Dr. Hind Alatawna.