

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-537826

40815

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 4244

Société :

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre

Nom & Prénom : TAHRI

Abdelkadir

Date de naissance : 1956

Adresse :

Tél. : 06 66702910

Total des frais engagés :

1200,00

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : Tahri Abdelkadir

Age :

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☒ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

Affection Longue Durée

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le :

Signature de l'adhérent(e) :

VOI ET ADHERENT

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (U.G.) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

[illegible]

INP 09/19/135

Dr. Khaleel HALLOU
Spécialiste des Maladies
de l'Appareil Digestif
Chirurgie Anal
Rue Boudjahed, Bd. Mohammed V
St. D-2 660

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	10. oct. 2000	566.00

Date _____

Montant de la Facture

		EXE
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur		
		1

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	12/08/20	K30 Cholestérol ALCOHOL	400

Date _____

Montant
des Honoraires

Khaled HALLOUL
 Spécialiste des Maladies
 de l'Appareil Digestif
 et du Cholestérol
 7, Rue Bonchamps, Bld. Mohamed
 05 22 47 16 61

[illegible]


Date des Soins

Nombre


Montant détaillé
des Honoraires

--

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F.
PROTHESES DENTAIRES



Tracce

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINSDEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H	
25533412		21433552
00000000		00000000
D		C
00000000		00000000
35533411		11433553
	B	

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINSDATE DU
DEVISDATE DE
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Khaliel Hallouly

Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif
Estomac - Intestins - Foie

CHIRURGIE ANALE

HEMORROIDES - FISTULE - FISSURE

Fibroscopie Digestive

Ancien Chef du Service de Gastro-Entérologie

الدكتور خالد الحلولي

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي

المعدة - الأمعاء - الكبد

أمراض وجراحة المخرج

البواسير و الدميل

الكشف بالمنظار

رئيس شعبة تقسيم أمراض الجهاز الهضمي

10 AOUT 2020

Casablanca, le

Tahiri Abdel

243,00 Aliviar (2x9)

245,60 Ipsin 40 (122,80 x 2)

77,40 38,70 x 2
566,00 25 ou 25 gels
78ms

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



Laroxyl 25 mg, comprimé pelliculé

Amitriptyline

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTIDÉPRESSEUR / INHIBITEUR NON SELECTIF DE LA RECAPTURE DE LA MONOAMINE - code ATC : N06AA09
Ce médicament est un antidépresseur.

Il est indiqué :

- dans les épisodes dépressifs.
- dans les douleurs neuropathiques périphériques de l'adulte.
- dans l'énurésie nocturne de l'enfant (émission involontaire d'urines la nuit), dans le cas où toute maladie organique a été exclue.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à l'amitriptyline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- s'il y a un risque connu de glaucome par fermeture de l'angle (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil),
- en cas de difficulté pour uriner d'origine prostatique ou autre,
- en cas d'infarctus du myocarde récent,
- en cas de traitement par un autre antidépresseur (iproniazide, nialamide) ou par le sultopride.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé.

Mises en garde spéciales

Ne pas interrompre brutalement le traitement.

Comme pour tous les autres antidépresseurs, l'action de ce médicament ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours. Il est donc important de poursuivre le traitement régulièrement, même en l'absence d'amélioration immédiate, sauf avis contraire de votre médecin.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



Laroxyl 25 mg, comprimé pelliculé

Amitriptyline

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTIDÉPRESSEUR / INHIBITEUR NON SELECTIF DE LA RECAPTURE DE LA MONOAMINE - code ATC : N06AA09
Ce médicament est un antidépresseur.

Il est indiqué :

- dans les épisodes dépressifs.
- dans les douleurs neuropathiques périphériques de l'adulte.
- dans l'énurésie nocturne de l'enfant (émission involontaire d'urines la nuit), dans le cas où toute maladie organique a été exclue.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à l'amitriptyline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- s'il y a un risque connu de glaucome par fermeture de l'angle (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil),
- en cas de difficulté pour uriner d'origine prostatique ou autre,
- en cas d'infarctus du myocarde récent,
- en cas de traitement par un autre antidépresseur (iproniazide, nialamide) ou par le sultopride.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé.

Mises en garde spéciales

Ne pas interrompre brutalement le traitement.

Comme pour tous les autres antidépresseurs, l'action de ce médicament ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours. Il est donc important de poursuivre le traitement régulièrement, même en l'absence d'amélioration immédiate, sauf avis contraire de votre médecin.

IPPSium® 20 mg et 40 mg Gélules gastro-résistantes Boîtes de 7, 14 et 28 ESOMEPRAZOLE

Consultez l'avis d'accompagnement intégré de cette notice avant de prendre ce médicament.

• Gardez cette notice vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus

de détails à votre médecin ou à votre pharmacien. Ne le donnez jamais à

quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être

nuisible.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet

indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre

pharmacien.

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Composition qualitative et quantitative.

Esomeprazole (DCL) sous forme d'Esomeprazole magnésique trihydrate : 20 mg

par gélule.

Expédients communs : 40 mg

Expédients à effet Nourriture : 40 mg

Classes pharmaco-thérapeutiques : 1 gélule

LES GÉLULES À UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Gélule à 20 mg.

Adultes

Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au

niveau de l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne

une douleur, une inflammation et des brûlures.

• L'usage de l'estomac ou du duodénum (premier grêle) en cas d'infection par une

bactérie appelée Helicobacter pylori. Si vous êtes dans cette situation, votre

médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection

et permettre à l'acide de coexister.

Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise

de médicaments (NSAID) et des ulcères gastroduodénaux.

• Si vous prenez des médicaments (NSAID) pour soulager les douleurs

causées par l'arthrose, l'ostéoporose ou d'autres affections.

• Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

Adultes

Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au

niveau de l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne

une douleur, une inflammation et des brûlures.

• L'usage de l'estomac ou du duodénum (premier grêle) en cas d'infection par une

bactérie appelée Helicobacter pylori. Si vous êtes dans cette situation, votre

médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection

et permettre à l'acide de coexister.

Adultes

Le traitement de l'œsophage érosive par reflux lorsque l'acide de l'estomac

remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac) et

entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

Adultes âgés de 12 ans et plus

Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au

niveau de l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une

douleur, une inflammation et des brûlures.

CONSEILS POUR UN BON USAGE

• Si vous prenez ce médicament depuis longtemps, votre médecin ou votre

pharmacien vous a dit. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien

si besoin.

• Si vous prenez ce médicament depuis longtemps, votre médecin ou votre

pharmacien vous a dit. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien

si besoin.

• Si vous prenez ce médicament depuis longtemps, votre médecin ou votre

pharmacien vous a dit. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien

si besoin.

• Si vous prenez ce médicament depuis longtemps, votre médecin ou votre

pharmacien vous a dit. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien

si besoin.

• Si vous prenez ce médicament depuis longtemps, votre médecin ou votre

pharmacien vous a dit. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien

si besoin.

• Si vous prenez ce médicament depuis longtemps, votre médecin ou votre

pharmacien vous a dit. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien

si besoin.

• Si vous prenez ce médicament depuis longtemps, votre médecin ou votre

pharmacien vous a dit. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien

si besoin.

général complet.

• La dose recommandée après occasion de

d'IPPSium 20 mg une fois par jour.

• Si vous avez des symptômes de reflux

de l'estomac, obtenez votre médecin peut vous

prescrire IPPSium 20 mg une fois par jour.

• Si vous avez de graves problèmes

digestifs, obtenez votre médecin peut vous

prescrire IPPSium 40 mg une fois par jour.

• Si vous avez de graves problèmes

digestifs, obtenez votre médecin peut vous

prescrire IPPSium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 20 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

ium 40 mg une fois par jour.

• La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPS-

IPPSium 20mg/14
dans 82,10 Dh

IPPSIUM® 20 mg et 40 mg Gélules gastro-résistantes Boîtes de 7, 14 et 28 **ESOMEPRAZOLE**

• Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nuisible.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT Composition qualitative et quantitative.

par gélule 20 mg
Esomeprazole (DCI) sous forme d'Esomeprazole magnésique trihydrate 40 mg
ou 1 gélule

q.s.p

Excipients (communs)

Saccharose et Mannitol

Classe pharmacothérapeutique :

Antisécrétoires gastro-intestinaux

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Gélule à 20 mg.

Adultes

• Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

• L'ulcère duodénal ou duodénite (inflammation) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation, votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.

• Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). IPPSIUM peut aussi être utilisé pour stopper la formation d'ulcères si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

• Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

• Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

• L'ulcère duodénal ou duodénite (inflammation) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation, votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.

Gélule à 40 mg.

• Le traitement de l'œsophagite érosive par reflux lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

• Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

• Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Instructions pour un bon usage

Prenez toujours ce médicament exactement, comme votre médecin ou votre pharmacien vous l'a dit. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si vous en avez besoin.

• Si vous prenez ce médicament depuis longtemps (en particulier depuis plus d'un an), votre médecin devra vous le prescrire à la dose de 20 mg par jour.

• Si vous devez prendre ce médicament à la dose de 40 mg par jour, votre médecin devra vous le prescrire à la dose de 40 mg par jour pendant 4 semaines.

• Si vous devez prendre ce médicament à la dose de 20 mg par jour, votre médecin devra vous le prescrire à la dose de 20 mg par jour pendant 4 semaines.

• Si vous devez prendre ce médicament à la dose de 40 mg par jour, votre médecin devra vous le prescrire à la dose de 40 mg par jour pendant 4 semaines.

• Si vous devez prendre ce médicament à la dose de 20 mg par jour, votre médecin devra vous le prescrire à la dose de 20 mg par jour pendant 4 semaines.

• Si vous devez prendre ce médicament à la dose de 40 mg par jour, votre médecin devra vous le prescrire à la dose de 40 mg par jour pendant 4 semaines.

• Si vous devez prendre ce médicament à la dose de 20 mg par jour, votre médecin devra vous le prescrire à la dose de 20 mg par jour pendant 4 semaines.

• Si vous devez prendre ce médicament à la dose de 40 mg par jour, votre médecin devra vous le prescrire à la dose de 40 mg par jour pendant 4 semaines.

• Si vous devez prendre ce médicament à la dose de 20 mg par jour, votre médecin devra vous le prescrire à la dose de 20 mg par jour pendant 4 semaines.

• Si vous devez prendre ce médicament à la dose de 40 mg par jour, votre médecin devra vous le prescrire à la dose de 40 mg par jour pendant 4 semaines.

• Si vous devez prendre ce médicament à la dose de 20 mg par jour, votre médecin devra vous le prescrire à la dose de 20 mg par jour pendant 4 semaines.

guérison complète.

• La dose recommandée après coadministration d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour.

• Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour.

• Si vous avez des symptômes de reflux gastro-œsophagien, la dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

• Si vous avez des symptômes de reflux gastro-œsophagien, la dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

En cas d'infection par la bactérie appelée *Helicobacter pylori*, la dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

La dose recommandée est d'une Gélule d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour, en bon état de santé.

DCI : Sulpiride

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

6. Informations supplémentaires.

- Indications :

MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral.

Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients âgés atteints de

DCI : Sulpiride

non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral.

Le médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients âgés atteints de

DCI : Sulpiride

non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral.

-Antiparkinsonien

Docteur Khalid Hallouly

Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif
Estomac - Intestins - Foie

CHIRURGIE ANALE

HEMORROIDES - FISTULE - FISSURE

Fibroscopie Digestive

Ancien Chef du Service de Gastro-Entérologie

الدكتور خالد الحلوي

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي

المعدة - الأمعاء - الكبد

أمراض وجراحة المخرج

البواسير و الدميل

الكشف بالمنظار

رئيس سابق لقسم أمراض الجهاز الهضمي

Casablanca, le
10/08/2020

NOTE D' HONORAIRES
DE Mr. TAHRI ABDELKABIR

Echographie abdominale : K30.....400,00 DH

Avec mes meilleures salutations.

Dr. Khalid Hallouly
Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif
CHIRURGIE ANALE
FIBROSCOPIE DIGESTIVE
Bendahan - Bd. Mohammed V - Casablanca
Tél.: 05 22 47 16 80 - Fax: 05 22 27 88 54

Docteur Khaled Hallouly

Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif
Estomac - Intestins - Foie

CHIRURGIE ANALE

HEMORROIDES - FISTULE - FISSURE

Fibroscopie Digestive

Ancien Chef du Service de Gastro-Entérologie

الدكتور خالد الحلولي

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي

المعدة - الأمعاء - الكبد

أمراض وجراحة المخرج

البواسير والدمل

الكشف بالمنظار

رئيس سابق لقسم أمراض الجهاز الهضمي

Casablanca, le

10/08/2020

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE DE MR. TAHRI ABDELKABIR

- * Les différentes coupes réalisées montrent :
- * Un foie d'échostructure homogène et de volume normal.
- * La vésicule biliaire est échotransparente, sa paroi est fine.
- * La voie biliaire principale est de calibre normal.
- * Les deux reins, pancréas et la rate sont échographiquement normaux.
- * Le rein gauche présente un kyste sereux. ✕
- * Pas d'épanchement péritonéal.
- * Pas d'adénopathies profondes.
- * A compléter par Bilan biologique.

DR. HALLOULY
Khaled Hallouly
Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif
CHIRURGIE ANALE
FISTULE - FISSURE
HEMORROIDES
Fibroscopie Digestive
Ancien Chef du Service de Gastro-Entérologie
Casablanca