

Déclaration de Maladie

Nº P19- 0043255

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule :

29.50

Société :

40808

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Redaute

Nom & Prénom :

Wadeh Miloud

Date de naissance :

19.6.6

Adresse :

Boulevard am 37 n° 26 casse

Tél. : 06.91.65.12.69

Total des frais engagés

3 056 40

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. EL HAIBA Abdella

Pneumologue

74. Angle Bd de Fes Bd 2 Mars

Casab. Tél. 03.22.50.11

MUPRAS

21 SEP. 2020

ACCUEIL

Date de consultation : 14.10.2020

Nom et prénom du malade : MAAL Zineb Age: 1951

Lien de parenté : Lui-même Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Affection de la partie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 21.10.2020

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant la validité des Actes
14/07/2020	Cs		250,00	Dr. HABIBA Abdellah Pneumologue
	+ Rx Therm		200,00	17 Angle Bd de Fes Rn?
			450,00	Dr. HABIBA Abdellah Pneumologue

13/08/2020

GRAFH

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE OSCAR Dr. LAMOUNI Khadija CASA - Tél: 05 22 52 04 46	13/08/2020	901,00
HARMAGIE OSCAR Dr. LAMOUNI Khadija CASA - Tél: 05 22 52 04 46	14/07/2020	505,40

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE ANALYSE RADILOGIE Dr. HABIBA Abdellah Pneumologue	12/08/20	B8004p	9.100,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

Docteur Abdellah El Haiba

SPECIALISTE EN
PNEUMOPHTISIOLOGIE

Diplômé de l'Université de Paris
Membre de la société Française
de Tabacologie

الدكتور عبد الله الهيبة

اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسى

Diplômé d'Echographie
Diplômé de Taabacologie
Maladies de Poumons - Asthme
Tuberculose - Allergie respiratoire
Aide au servage tabagique

Casablanca, le 14/10/2020 الدار البيضاء، في

7AAZ Znib

157,00

① Lebanox 1g



18x21, x 38

38,20

② Throxol sans sucre



124,60

16 x 31

③ ESAC 46



PHARMACIE OSCAR
Dr. LAMANI Khadija
Hay Andalousia 3 Rue 7 N° 127
CASA - Tél: 05 22 52 04 46

185,00 T.CP/

④ Saffa 250



26x21 T: 505,40

Dr. EL HAIBA Abdellah
Pneumologue
7 Angle Boulevard Fès et Boulevard 2 Mars
Casab. Tél: 05 22 50 79 15

Docteur Abdellah El Haiba

SPECIALISTE EN
PNEUMOPHTISIOLOGIE

Diplômé de l'Université de Paris
Membre de la société Française
de Tabacologie

الدكتور عبد الله الهيبة

اختصاصي في أمراض الجهاز التنفس

Diplômé d'Echographie
Diplômé de Taabacologie
Maladies de Poumons - Asthme
Tuberculose - Allergie respiratoire
Aide au servage tabagique

Casablanca, le 13/07/2002 الدار البيضاء، في

802,00

JAA S 2 heb

Pylera

15

3cp aprs le 3 regnes

Pr 3cp le mi en wonder

pdlt noj

22,00

15

odds 20 g

1gel mal

1gel le san

T. 901,00

PHARMACIE OSCAR
Dr. LAMKIMA Khadija
Haj Abdellah
H.C.A.S.A. Tel: 05 22 52 04 46

Dr. Abdellah El Haiba
Pneumologue
74, Zawia شارع فاس و شارع 2 مارس، عين الشق - الدار البيضاء - الهاتف: 05 22 50 79 15 - الفاكس: 05 22 21 46 06
Angle Boulevard de Fès et Boulevard 2 Mars - Aïn choc - Casablanca - Tél.: 05 22 50 79 15 - Fax: 05 22 21 46 06

ESAC® 40 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

Composition

Esoméprazole 40,00 mg

Sous forme d'ésoméprazole magnésium trihydraté.

Excipients dont et saccharose : q.s.p 1 gélule gastrorésistante

Qu'est-ce qu'ESAC 40 mg et dans quel cas est-il utilisé ?

Ce médicament se présente sous forme de gélules contenant des microgranules gastro-résistants.

ESAC est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

ESAC est utilisé dans :

- Reflux gastro-oesophagien : traitement de l'oesophagite érosive par reflux.

Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

Quelles sont les informations nécessaires avant de prendre ESAC 40 mg ?

Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, même ceux sans prescription médicale.

Ne pas utiliser ESAC 40 mg dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à l'un des constituants d'ESAC,

- si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons,

- si vous prenez un médicament contenant de l'atazanavir (utilisé dans le traitement du VIH).

Prendre des précautions particulières avec ESAC 40 mg dans les cas suivants :

- si vous prenez d'autres médicaments comme l'itraconazole ou le kétococonazole

gastro-duodénal.

Adultes :

- **Traitement de l'ulcère du duodénum en cas d'infection appelée Helicobacter pylori :**

La dose initiale est de 20 mg associé à deux antibiotiques clarithromycine 500 Mg) deux fois par jour pendant 7 jour

- **Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens :**

La dose habituelle est de 20 mg une fois par jour. La durée à 8 semaines.

- **Prévention des ulcères de l'estomac et du duodénum d'anti-inflammatoires non stéroïdiens :**

20 mg une fois par jour.

ESAC ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de données disponibles.

Suivez strictement les instructions de votre médecin et n'hésitez pas à lui demander conseil.

Si vous avez pris plus d'ESAC 40 mg que vous n'auriez
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharm.

Si vous avez oublié de prendre ESAC 40 mg :

Prenez-le dès que possible.

Cependant, si vous êtes prêt à prendre la dose suivante, ne vous avez oubliée mais poursuivez votre traitement norm

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ESAC 40 mg est occasionnellement des effets indésirables chez certaines Ces effets indésirables sont généralement d'intensité légè du traitement.

Effets indésirables fréquents

LOT : 20002

PER : 01/22

PPV : 122DH80



وينبغى مراقبة اعراضكم جيداً عند
اذا كان هذا هو الحال. يجوز للطبيب
اليوم وهكذا يمكن تخفيف جرعة عن 1440 مل^3 الى 1320 مل^3 في
تناول جعة في المساء اذا كانت له
 350 مل^3 الصمام اذا كانت له 180 مل^3

إذا تفاقم الريو أو ضيق تتفقّس
إذا كنتم تستمعون صفيرًا في الشّ
تشعرون في كثير من الأحيان بضيـ
تشعرون غالباً إنكم في حاجة إلى اـ
القصبات الهوائية. يجب الاستقرـ

الصيغات الموجة
عدد النفحات يمكن أن تزداد حالات
ان تكونوا في حالة أكثر مرضية
فقد تحتاجون لعلاج إضافي
تعميلات كيفية الاستعمال
ن: بعضكم طبึกم او معر

بلاستيك مزود بطرف يدخل في الماء

التحقق من تشغيل الجهاز:

- عند استخدام الجهاز لأول مرة
- يجب إزالة غطاء الطرف الذي يدخل في الماء
- برفق، بين الإيمان والسيادة ثم اسْتَوْدِعْ

برقة
2. اللذك من انه يعلم، يجب تد
الذى يدخل فى القم واوضاعها عل
الهوا، كبرى هذه الخطوات، وانت
عن كل نعمة، اى لم تستعملوا ح
عن نعمتين من ^{٤٣} سوقى الهوا
^{٤٤} الهوا

بسطه اذ
فدا جلا
الذى يبدأ
خل فى

ذى يدخل
يدخل فى
طرف الذ
ن الفم م
 فى اند

Cipla
Etiquette li
Bien agiter avant

٣٥

سال فلم 250، 125، 50®

معلق للإستئثار لويكاسون + سالنبرول

اقررووا بانتهاء هذه المذكرة بالكامل قبل الشرح فيتناول هذا الدواء
احتقظ بهذه المذكرة. فقد تخلّى إعاده قراءتها
إذا كانت لم يتم تساؤلات أخرى أو لم يتمكّن بذلك. اطلبوا المزيد من
المعلومات من طبيبك أو صيدليتك.

المعلومات من طبقكم أو صياغتكم
لقد تم وصف هذا الماء لكم بمصفة ملخصية. لا تناولوه أبداً الشخص
آخر ولو في حالة اعراض مصابة به لأن ذلك قد يضره.
إذا أصبح أحد الآثار غير المرغوب تحقيرها أو إذا أحستتم بآثار غير مرغوب
إلا في هذه المذكرة. أخربوا بذلك طبقكم أو صياغتكم.

٦. التعريف بالدواء :
لهم تنشر إلينه هذه المذكرة، أخيراً، بعد

ملحق للأسسنسينسي - ١٥			
بركيبيه : المادة النذرية :			
مسقط 250	مسقط 125	مسقط 50	برويونات بروكسيكابون كمية معاينة من
μg 250	μg 125	μg 50	بروكسيكابون (التسمية المدارلة دولياً)
μg 25	μg 25	μg 25	المسالمندرويل (التسمية المدارلة دولياً) كز تغافر، كمية معاينة من المسالمندرويل

السوانح: كمية كافية لجرعة واحدة.
الصنف الصيدلاني العلاجي:
2- موسعة قد

الحقوق والواجبات
الاقلية
بروبيونات فلويتاكسون كورتيكويد يقلل من الالتهاب والتهيج في
الرئتين
في الحالات يستعمل الا

الرقيقين.

إرشادات :
 طبيك وصف لك هذا الد
 اضطرابات الجهاز التنفسى
 يجب استعمال سافلو كل ما
 من التحكم في الريو بشكل
 يساعد سافلو على تخفيف حد
 أثرا إذا كنت تعانون سلفا م
 الحالات، يجب عليكم استعما
 "احتياطيا" سرير المفعوا
 (salbutamol)

كانت لديك حساسية من (salmétérol)، بروبيتات (fluticasone) أو من أحد (HFA-134A).
نورفلوران (norfloksan) في حالة الشك، بلزنج وجوهاً اسماً احتقانات عند الاستعمال. تحدثنا

Cipla Maroc

Etiquette Inviolabilité

Bien agiter avant chaque utilisation

PPV (DH) :

LOT N° :

UT. AV. :

38,80

موكسول

أميروكسول

بدون سكر

LEVAMOX®

(Amoxicilline + acide clavulanique)

DENOMINATION DU MEDICAMENT

- LEVAMOX® 1 g/125 mg Comprimé effervescent adulte, boîte de 12, 16 et 24.
- LEVAMOX® 500 mg/62,5 mg Comprimé effervescent enfant, boîte de 12 et 24.
- LEVAMOX® 1 g/125 mg Poudre pour suspension buvable adulte en sachet-dose, boîte de 12 et 16.
- LEVAMOX® 500 mg/62,5 mg Poudre pour suspension buvable enfant en sachet-dose, boîte de 12.
- LEVAMOX® 100 mg/12,5 mg par ml Poudre pour suspension buvable nourrisson en flacon de 30 ml
- LEVAMOX® 100 mg/12,5 mg par ml Poudre pour suspension buvable enfant en flacon de 60 ml

(Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que LEVAMOX® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVAMOX® ?
3. Comment prendre LEVAMOX® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVAMOX® ?
6. Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE LEVAMOX® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

LEVAMOX® est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter d'être efficaces (être inactivés). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

- Indications thérapeutiques

LEVAMOX® est utilisé chez l'adulte, chez l'enfant et chez le nourrisson pour traiter les infections suivantes :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LEVAMOX® ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

LEVAMOX® contient de l'aspartam, si votre médecin vous a informé(e) d'une int de prendre ce médicament.

cations)

amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la ntenus dans LEVAMOX®.

ergique grave (d'hypersensibilité) à un

on cutanée ou un gonflement du visage

u développé un ictère (jaunissement de

ns l'une des situations mentionnées

nédecin ou votre pharmacien avant de

en garde spéciales et précautions

tre pharmacien avant de prendre ce

aux reins,

me déclin ou votre pharmacien avant de

à votre enfant.

ra rechercher le type de bactérie responsable

de l'infection.
Selon les résultats, LEVAMOX® ou un a
Réactions nécessita LEVAMOX® peut a
graves, notamment gros intestin. Lorsq
surveiller certains sy
Tests sanguins et ur
Si vous effectuez ou
rouges ou explorati
glucose), vous deve
enfant prend LEVA
types de tests.
Tenir compte, au be

- Enfants et adole

Demandez conseil a

ce médicament à vo

• souffre de monon

• est traité(e) pour o

• n'urine pas réguli

En cas de doute,

d'administrer LEVA

- Prises d'autres m

Prise ou utilisa

Si vous ou votre m

parlez-en à votre m

sans ordonnance, e

Si vous prenez ou v

LEVAMOX®, le risq

Si vous prenez ou v

médecin peut décide

Si des médicame

warfarine) sont pr

peuvent être requi

LEVAMOX® peut

traiter le cancer ou

LEVAMOX® peut

prévenir le rejet de

- Aliments et boi

Sans objet

- Interactions ave

Sans objet

- Utilisation pend

Si vous êtes encei

devez en informer

Demandez conseil

quelconque médic

- Sportifs

Sans objet

- Effets sur l'aptit

Poudre pour sus

1 g/125 mg

Conduite de véhi

LEVAMOX® peut

à conduire

- Excipients à eff

- Aspartam :

LEVAMOX® cont

Celle-ci peut être

« phénylettonurie

- Potassium :

Les comprimés e

buvable contienn

régime pauvre en

- Sodium :

Les comprimés e

sodium, en tenir c

3- COMMENT PRENDRE LEVAMOX® ?

- Instruction nou

Respecter

En pren

Dans le



see Warnings and Precautions [see Warnings and Precautions (5.14)].

6.6 Lithium

In patients stabilized on relatively high doses of lithium, short-term use of PYLERA may cause elevation of serum lithium concentrations and signs of lithium toxicity due to the interaction between metronidazole and lithium. Serum lithium and serum creatinine concentrations should be monitored several days after beginning treatment with PYLERA to detect any increase that may precede clinical symptoms of lithium toxicity [see Warnings and Precautions (5.14)].

6.7 Antacids, Multivitamins, or Dairy Products

The absorption of PYLERA may be reduced if administered with antacids containing aluminium, calcium, or magnesium; preparations containing iron, zinc, or sodium bicarbonate; or milk or dairy products due to the interaction between these products and tetracycline. These products should not be consumed concomitantly with PYLERA. However, the clinical significance of reduced tetracycline systemic exposure is unknown as the relative contribution of systemic versus local antimicrobial activity against *Helicobacter pylori* has not been established.

7.8 Busulfan

Metronidazole has been reported to increase plasma concentrations of busulfan, which can result in an increased risk for serious busulfan toxicity. Do not administer PYLERA concomitantly with busulfan unless the benefit outweighs the risk. If no therapeutic alternatives to PYLERA are available, and concomitant administration with busulfan is medically needed, monitor for busulfan toxicity and busulfan plasma concentrations and adjust the busulfan dose accordingly [see Warnings and Precautions (5.14)].

7.9 Inhibitors of CYP450 liver enzymes

The simultaneous administration of PYLERA and drugs that inhibit microsomal liver enzymes, such as cimetidine, may result in a prolonged half-life and decreased plasma clearance of metronidazole.

7.10 Inducers of CYP450 liver enzymes

The simultaneous administration of PYLERA and drugs that induce microsomal liver enzymes, such as phenytoin or phenobarbital, may accelerate the elimination of metronidazole, resulting in reduced plasma concentrations of metronidazole. Impaired clearance of phenytoin has also been reported.

10⁶⁰

COLLECTOR: J. R. HANSON
DATE: 1970
LOCALITY: 100' E. of
M. S. 1/4 of Section 10
T. 10 N. R. 10 E.

Docteur Abdellah El Haiba

SPECIALISTE EN
PNEUMOPHTSISIOLOGIE

Diplômé de l'Université de Paris
Membre de la société Française
de Tabacologie

الدكتور عبد الله الهيبة

اختصاصي في أمراض الجهاز التنفس

Diplômé d'Echoigraphie
Diplômé de Taabacologie
Maladies de Poumons - Asthme
Tuberculose - Allergie respiratoire
Aide au servage tabagique

Casablanca, le

١٤١٠٧٢٠٢٠
الدار البيضاء، في

Dr Abdellah El Haiba

- Serologie H. pylori
- Troponine - D. diméne
- Prothrombine

LABORATOIRE HIBIQUE
ANALYSES
Dr Abdellah El Haiba
Boulevard Fès et Boulevard 2 Mars
Tel.: 0522 52 29 61

Dr. EL HABIB Abdellah
Pneumologue
Ain Chock - Fès Bd 2 Mars
Tél.: 05 22 50 79 15

Docteur Abdellah El Haiba

SPECIALISTE EN
PNEUMOPHTISIOLOGIE

Diplômé de l'Université de Paris
Membre de la société Française
de Tabacologie

الدكتور عبد الله الهيبة

اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسى

Diplômé d'Echographie
Diplômé de Taabacologie
Maladies de Poumons - Asthme
Tuberculose - Allergie respiratoire
Aide au servage tabagique

Casablanca, le

٢٤/١٢/٢٠٢٠ الدار البيضاء، في

٢٠٢٠ - ٢٠٢١

Re: Mme. Far

Opacité parenchymatique
droite

à l'âge de 08 ans.

Far - Far - Far - Far -

Dr. EL HABIB Abdellah
Pneumopathologue
74, Angle Bd de Fès et Bd 2 Mars
Casab. Tél: 05 22 50 79 15 Fax: 05 22 21 46 06



الدكتور (النوازي) محمد
أخصائي في التحاليل الطبية

مختبر التحاليل الطبية بانوراميك

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

Dr. KADIRI Mohamed
Biologiste

Diplomé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique
Diagnostique Biologique et Parasitaire
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris
Ex. Attaché des Hopitaux de France

Dossier ouvert le : 12/08/20.
Prélèvement effectué à 07:55

Mme MAAS ZINEB
Docteur ABDELLAH EL HAIBA
Dossier N° :20H1039

HEMOSTASE

TAUX de PROTHROMBINE : 93,00 %

70 - 100

traitement anticoagulant:25-35

* D-DIMERE : 9 250,00 ng/ml

< 500

technique Vidas

Soit un I.N.R. à : 1,05

2 à 4,5

-Prévention d'une thrombose veineuse INR: 2-3

-Traitement d'un accident thromboembolique ou prévention des thromboses veineuses récidivantes INR:2,5-3,5

-Prophylaxie des accidents thromboemboliques artériels, prothèses valvulaires artificielles INR:3-4,5

NB: pour les patients sous AVK, ne tenir compte que de la valeur de l'INR

*NB : Aliments riches en vitamine K à éviter pendant le traitement
(chou, choucroute, chou fleur, épinards, brocolis, persil, coriandre, légumes verts)*

IMMUNOLOGIE

TROPONINE us : 0,010 ng/ml

< 0,02

LABORATOIRE PANORAMIQUE
ANALYSES MEDICALES
Dr. KADIRI Mohamed
Tél: 0522 52 29 61
Fax: 0522 50 47
Patente: 34033937 - I.F.: 51360060 - C.N.S.S.: 6070445 - ICE: 001714638000061 - INPE: 093002053

197, شارع بانوراميك، زاوية شارع 2 مارس - عين الشق - الدار البيضاء
197, Bd Panoramique, Angle Bd 2 Mars - Ain Chock - Casablanca

الفاكس: 05 22 52 26 59 | الهاتف: 05 22 87 50 47 | Fax: 05 22 52 26 59

Patente: 34033937 - I.F.: 51360060 - C.N.S.S.: 6070445 - ICE: 001714638000061 - INPE: 093002053



الدكتور (النواري) محمد
أخصائي في التحاليل الطبية

مختبر التحاليل الطبية بانوراميك

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

Dr. KADIRI Mohamed
Biologiste

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique
Diagnostique Biologique et Parasitaire
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris
Ex. Attaché des Hopitaux de France

Facture N° : 13125

Casablanca le mercredi 12 août 2020
A l'attention de : **Mme MAAS ZINEB**

Analyses :

Taux de Prothrombine -----	B	40
D -dimere -----	B	400
Troponine -----	B	250
Helicobacter Pylori -----	B	200

Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5
-----------	----	-----

Total dossier : 1 200,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Mille Deux Cents Dirhams

LABORATOIRE PANORAMIQUE
ANALYSES MEDICALES
Dr KADIRI Mohamed
Bd Panoramique , Casablanca
Tel: 0522 52 29 61

شارع بانوراميك، زاوية شارع 2 مارس - عين الشق - الدار البيضاء
197 , Bd Panoramique , Angle Bd 2 Mars - Ain Chock - Casablanca

الفاكس: 05 22 52 26 59 / Fax : 05 22 52 26 59

Patente : 34033937 - I.F.: 51360060 - C.N.S.S : 6070445 - ICE : 001714638000061 - INPE : 093002053



الدكتور (الغaurي) محمد أخصائي في التحاليلات الطبية

مختبر التحاليلات الطبية بانوراميك

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

**Dr. KADIRI Mohamed
Biologiste**

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique
Diagnostique Biologique et Parasitaire
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris
Ex. Attaché des Hopitaux de France

Dossier ouvert le : 12/08/20.
Prélèvement effectué à 07:55

Mme MAAS ZINEB
Docteur ABDELLAH EL HAIBA
Dossier N° :20H1039

** SEROLOGIE **

Serologie Helicobacter Pylori

Anticorps IgG Index: 3,61

< 0,75 : négatif
0,75-1,1 : équivoque
>1,1 : positif

LABORATOIRE PANORAMIQUE
ANALYSES MEDICALES
Dir. : 2814-0366
Panor. : 2814-0362
Tél. : 03 22 52 29 01

شارع بانوراميك، زاوية شارع 2 مارس - عين الشق - الدار البيضاء
197, Bd Panoramique , Angle Bd 2 Mars - Ain Chock - Casablanca

الfax: 05 22 52 26 59 | الهاتف: 05 22 87 50 47 | تلفون: 05 22 52 29 61 | Tél : 05 22 52 29 61 / 05 22 87 50 47 |fax: 05 22 52 26 59

Patente : 34033937 - I.F.: 51360060 - C.N.S.S : 6070445 - ICE : 001714638000061 - INPE : 093002053

DOCTEUR EL HAIBA ABDELLAH

Casablanca, le : 14/07/2020

**SPECIALISTE des Maladies Respiratoires
Et allergiques.**

Diplômé de la faculté de Médecine de Paris

Mr/Mme/Melle : MAAS ZINEB

Reçu :

Radio thorax

Z₁₂ = 200.00 dhs

Cachet du médecin

*Dr. EL HAIBA Abdellah
Pneumologue
74 Angle Bd de Fès Bd 2 Mars
Casab. Tel: 05.22.50.79.15*

74,Angle Bd 2 Mars& Bd de Fès –Casablanca Tél. : 05-22-50-79-15 fax :05-22-21-46-06

DOCTEUR EL HAIBA ABDELLAH

Casablanca : 14/07/2020

SPECIALISTE des Maladies Respiratoires
Et allergiques.
Diplômé de la faculté de Médecine de Paris

Mr/Mme/Melle : MAAS ZINEB

Radiographie thoracique

- Parenchyme pulmonaire bien aéré
- Hiles libres.
- Culs de sac pulmonaire bien visibles.
- Pas de cardiomégalie.

Conclusion : RX thorax normale

Cachet du médecin

Dr. EL HAIBA Abdellah
Pneumologue
74 Angle Bd de Fès Bd 2 Mars
Casab. Tél: 05 22 50 79 15
Fax: 05 22 21 46 06
74 Angle Bd 2 Mars & Bd de Fès - Casablanca

74,Angle Bd 2 Mars& Bd de Fès –Casablanca Tél. : 05-22-50-79-15 fax :05-22-21-46-06