

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 3208

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Retraite

Nom & Prénom :

DRIS BENJELLOUN

Date de naissance :

03/07/1951

Adresse :

HAY AL WALAK 1HM.2 NR 17 TR 12
SECT. 02 SIDI Moumen CASA

Tél. :

06 74 27 30 01 Total des frais engagés : 1073,8 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. MOKRI Mohamed
NEURO CHIRURGIN
Bd. Mohamed Bouzid Rés. 3ème étage
Km.4 App. N° 2 Sidi Othman
Tel: 0522 551 092 / 067 125 196

Date de consultation : 17/09/2022

Nom et prénom du malade : chafik Habiba Age: 53 Ans

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : app. luron

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'intention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA

Signature de l'adhérent(e) : B.E

MUPRAS
22 SEP. 2020

MOUSSA
Le : 20/09/2020

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
17/09/2023	CS	250 d	250 d	DR. MOKRI NEURO CHIRURGIEN Bd. Mohand Bouzian Rés. Farhatine Imm. A App. N° 2 Sidi Othman Tel: 0522 551 092 / 0667 125 796
17/09/2023	CG	450 d	450 d	DR. MOKRI Mohamed NEURO CHIRURGIEN Bd. Mohand Bouzian Rés. Farhatine Imm. A App. N° 2 Sidi Othman Tel: 0522 551 092 / 0667 125 796

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. Mokri Mohamed	17/09/2023	379,80

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient des Travaux
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			MONTANTS DES SOINS
	H 25533412 00000000	21433552 00000000	G 35533411 11433553	DATE DU DEVIS
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DE L'EXECUTION
	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS			VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Mohamed MOKRI
NEUROCHIRURGIEN

Chirurgie et maladies du crâne,
Système nerveux et de la colonne vertébrale.
Traitement de l'épilepsie
Electroencéphalographie

Ex. Médecin principal à l'hôpital Mohamed 5 - Meknès
Ex. Praticien au CHU Ibn Rochd - Casablanca



الدكتور محمد المكري

إختصاصي في جراحة وأمراض الرأس،
الأعصاب و العمود الفقري
علاج داء الصرع (الكبار و الصغار)
التخطيط الكهربائي للدماغ

طبيب رئيسي سابق بمستشفى محمد الخامس - مكناس
جراح سابق بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد - الدار البيضاء

Casablanca, le : 17/09/2022

chose krik Habib

379,80 Ⓛ

Paracetamol 500 mg x 2

1/2

1

98,13 Ⓛ

Alfynil 30 mg x 2

0

357,70 Ⓛ

Alprazolam 0,5 mg x 2

0

67,80 Ⓛ

Tanakon 80 mg x 2

0

46,00 Ⓛ

TPV 500 mg x 2

0

stomol Amp x 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

</div





ALPRAZ 0,5 mg et 1 mg

Comprimés sécables

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?

3. COMMENT PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ALPRAZ, comprimé sécable ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

ANXIOLYTIQUE

Ce médicament appartient à la classe des benzodiazépines.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?

Contre-indications

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance au sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

- N
S
-
ou
- ir
une
musc
En ca
demar
votre p
Précau
spéciale
- intolérance au sucre,
 - syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil),
 - insuffisance hépatique grave,
 - myasthénie.

Alpraz® 0,5 mg,
28 comprimés sécables



6 118000 020530

Ce traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre l'anxiété.

Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,
- dose,
- antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires,

mais on peut observer agitation, une irritabilité, un engourdissement des extrémités, une au bruit, à la lumière physiques, etc...

Les modalités de l'administration doivent être définies

l'imposition très précoce et l'espace

présentent la meilleure

phénomène de sevrage

d'autant plus

traitement aura été plus

Malgré la décroissance des doses, un phénomène

gravité peut se produire

TRANSITOIRE des symptômes

qui avaient justifié le

traitement.

Des troubles de l'humeur

altérations des fonctions

sont susceptibles de se produire

heures qui suivent la prise

Chez certains sujets, il peut

provoquer des réactions

recherché : insomnie, anxiété

, nervosité, tension, modification

de l'humeur, voire des comportements

dangereux (agressivité, violence)

ou son entourage, ainsi que

du comportement automatiques).

Si une ou plusieurs réactions

surviennent, contactez

possible votre médecin.

Les benzodiazépines doivent

être utilisées avec précaution

le sujet âgé, en raison de la

somnolence et/ou de l'insomnie

qui peuvent favoriser des

conséquences souvent graves.

Chez certains sujets, il peut

provoquer des réactions

recherché : insomnie, anxiété

, nervosité, tension, modification

de l'humeur, voire des comportements

dangereux (agressivité, violence)

ou son entourage, ainsi que

du comportement automatiques).

En raison de la présence

du médicament ne doit pas

être pris par les personnes

de galactosémie, malabsorption du glucose

ou de déficit en enzymes

métaboliques rares).

Précautions d'emploi

La prise de ce médicament

doit être suivie d'un suivi

médical renforcé

d'insuffisance rénale, hépatique

ou foie, d'alcoolisme

ou de troubles respiratoires.

tanakan 40mg/ml

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

solution buvable

Veuillez lire attentivement

avant de prendre

contient des ingrédients

pour votre traitement

Si vous avez d'ailleurs

un doute, demandez à

votre médecin ou à

un pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.



Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE TANAKAN 40 mg/ml, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg/ml, solution buvable ?
3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40mg/ml, solution buvable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER TANAKAN 40 mg/ml, solution buvable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE TANAKAN 40 mg/ml, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

VASODILATATEUR PERIPHERIQUE

(C: système cardio-vasculaire)

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg/ml, solution buvable ?

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg/ml, solution buvable dans le cas suivant :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans le cas suivant : allergie à l'un des constituants de la solution buvable.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Faites attention avec TANAKAN 40 mg/ml, solution buvable :

Mises en garde spéciales

ATTENTION : LE TITRE ALCOOLIQUE DE CE MEDICAMENT EST DE 57% V/V, SOIT 0,45 g D'ALCOOL PAR UNITE DE PRISE (POUR 1 DOSE).

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

- كباقي الأدوية، هذا الدواء قد يسبب بعض الأعراض
- نعاس.
 - جفاف الفم.
 - الإمساك.
 - تชาير.
 - تشنجات.
 - زيادة في الوزن.
 - آلام في المفاصل.
 - تورم.
 - آلام في العضلات.
 - ارتفاع إنزيمات الكبد، اضطراب في وظائف

أضداد الكربيرات البهيج

دم في المقلع، علامات ا

من دقات القلب) أو انت

فرى ذات تردد غير معر

بالإضافة إلى ذلك، ترتبط بعض التأثيرات غير المكانية حدوث اضطرابات نفسية أو مراجحة أو الإبلاغ عن الآثار الجانبية إذا أحست بأي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة

7. تذبذبات خاصة واحتياطات الاستعمال

التحذيرات والاحتياطات تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أقراص تذبذبات خاصة

كجميع الأدوية المضادة للأكتناب، لا تهرب فالضروري الاستمرار في العلاج بمحض منتظمة طبيبك.

الأفكار الانتحارية وتفالق الأكتناب أو الأضطرابات إذا كنت تعاني من الأكتناب وأو الأضطرابات

يتفوّضك أو حتى الانتحار، هذه الأفكار قد تزداد للإكتناب (مضاربات للأكتناب) لأن جميع تلك

بين أسبوعين أو أكثر قبل أن يبدأ معهلاها وقد تتعزز بشكل أكبر لملأ هذه الأفكار في

* إذا كانت قد تواردتك في الماشرني ذكرة الحال

* إذا كانت شاب في مقتبل العمر، فقد أشارت بالفرقة الانتحارية لدى الشباب الأقل من 25

علاجه بواسطة مضادات الأكتناب.

فيما راودتك في وقت ما فكرة إلحاق الضرر بمن توجه مبادرته للمستشفى

وقد يكون من المقييد أحياناً أن تخبر أحد أصدق

طلب منه قراءة هذه النشرة، كما يمكن أن تزداد وطأة أو إذا يشعر بالقلق ما من جراء التقو

الاستعمال للأطفال والراغفين أقل من 18

لا ينبغي استعمال أقراص لعلاج الأطفال والمر

عمرهم عن 18 سنة ترتفع بهم نسبة احتمال

(وهي الأساس الميل للدوائية، و السلوك المع

العلاجية

مع ذلك يمكن أن يصف لك طبيبك أقراص أدوية أخرى

في مصلحتك، فإذا وصف الطبيب أدوية أخرى

الطبيب فلا تتردد في الاتصال به إذا ظهر أحد

أقراص لدى المريض دون 18 سنة، ينبغي إدخ

أثيل 30 ملخ

أقراص ملصقة قابلة للكسر - علبة من 20
كلوريدات الميابانسيرين

يرجى الاطلاع بانتهاء على هذه النشرة قبل تناول هذا الدواء.
احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى قرائتها من جديد.

إذا كانت لديك أسلطة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.

لقد تم وصف هذا الدواء
أعراض مشابهة، لأن
إذا أصبح أحد المرضى
في هذه النشرة، ا

1. مكونات الدواء
المادة النشطة
كلوريدات الميابانسيرين
سوغاتان

تشا البطاطس، السيليكا الماء
أحادي الهيدروجين، إير

السواغات ذات التأثير

2. الصنف الصيدلي
هذا الدواء مضاد
الصنف الصيدلي

3. دواعي الاستعمال
يوصى هذا الدواء لعلاج

4. الجرعة
الزنم شدة بوصفة الطبيب.

لا توقف علاجك بدون رأي طبي، حتى لو أحسست
في بعض الحالات، يمكن لطبيبك أن يكتفي تدريجياً الجرعة

في جميع الحالات، الزنم بشدة بوصفة طبيبك.
إذا لاحظت أن أثار أثيل 30 ملخ ترقص ملبيس قابل للكسر أقوى أو أضعف، استشر طبيبك أو

الصيدلي لأن طريقة الاستعمال

عن طريق الفم

ينبع الأقراص مع كأس من الماء دون مضيقها.

توقف الاستعمال
يمكن للجرعة اليومية أن تقسم خلال اليوم أو تأخذ من الأفضل مسافة عند النوم.

في جميع الحالات، الزنم بشدة بوصفة طبيبك.

5. موانع الاستعمال
يكون العلاج عادة خلال عدة أشهر (حوالي 6 أشهر).

الزنم بشدة بوصفة الطبيب، ولا توقف أثر هذا الدواء بدون رأي الطبيب.

في جميع الحالات إلزام الزنم بشدة بوصفة طبيبك.

6. تأثيرات غير المرغوب فيها

استعمال مع الكحول (انتظر القرفة: التفاعلات مع أدوية أخرى)

في حالة الشك، من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي

6. التأثيرات غير المرغوب فيها



Paroxetine Win®

Paroxétine chlorhydrate anhydre

20 mg

Comprimé pelliculé sécable

Voie Orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

• Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la lire si vous avez toute a d'informations vous a été pr d'autre, même nocif. • Si l'un un effet indésirable médicinal ou à

Si vous avez plus alement qu'un à être irquez votre

PAROXETINE WIN 20 MG
CP PELL SEC B30

P.P.V : 132DH00



6 118000 062301

alliculé

1. QU'EST-CE

sécurable ET DANS QUOI L'EST-CE-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

PAROXETINE WIN est un traitement destiné aux adultes souffrant de dépression et/ou de troubles anxieux.

indications thérapeutiques

Les troubles anxieux dans lesquels PAROXETINE WIN peut être prescrit sont les suivants : • troubles obsessionnels compulsifs (pensées répétitives, obsessionnelles avec comportement incontrôlable), • trouble panique (attaques de panique, y compris celles causées par la peur des lieux publics, l'agoraphobie), • trouble anxieté sociale (peur ou rejet de situations où vous devez être en société), • état de stress post-traumatique (anxiété causée par un événement traumatisant), • anxiété généralisée.

PAROXETINE WIN appartient à la classe de médicaments appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS).

Les personnes souffrant de dépression ou d'anxiété présentent un taux de sérotonine (substance présente dans le cerveau) diminué.

Le mécanisme d'action de PAROXETINE WIN et des autres ISRS n'est pas complètement connu, mais ils augmenteraient le taux de sérotonine dans le cerveau.

Bien traiter votre dépression ou votre trouble anxieux est important pour vous aider à vous sentir mieux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?

Contre-indications

Ne prenez jamais PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable :

• Si vous prenez ou avez pris au cours des 2 dernières semaines un médicament appelé IMAO (inhibiteur de la monoamine oxydase, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthioninium (bleu de méthylène)). Votre médecin vous dira comment débuter le traitement avec la paroxétine une fois que vous aurez arrêté le traitement par IMAO. • Si vous prenez un anti-psychotique appelé thioridazine ou un anti-psychotique appelé pimozide. • Si vous êtes allergique à la paroxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Si vous êtes concerné par l'un de ces points, ne prenez pas PAROXETINE WIN et informez-en votre médecin.

Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre PAROXETINE WIN 20mg, comprimé pelliculé sécable.

• Si vous prenez un autre traitement (voir rubrique ci-dessous « Prise ou utilisation d'autres médicaments »). • Si vous prenez du tamoxifène pour traiter un cancer du sein. PAROXETINE WIN pouvant diminuer l'efficacité du tamoxifène, votre médecin pourra préférer un autre traitement antidiépresseur. • Si vous avez des problèmes de reins, de foie ou de cœur.

• Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous avez eu dans le passé des convulsions ou des crises. • Si vous avez déjà eu un épisode « maniaque » (excitation incontrôlable et hyperactivité). • Si vous avez eu une sismothérapie (électrochoc). • Si vous avez des troubles de la coagulation, des ecchymoses (bleus) ou si vous saignez facilement, ou si vous prenez un médicament qui peut augmenter les saignements comme la warfarine, des antipsychotiques comme la perphenazine ou la clozapine, des antidiépresseurs tricycliques, des médicaments contre la douleur ou l'inflammation appelés Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS) comme l'aspirine, l'ibuprofène, le célecoxib, l'étodolac, le diclofénac, le méoxicam.

• Si vous êtes diabétique. • Si vous suivez un régime pauvre en sel. • Si vous souffrez de glaucome (hypertension au niveau de l'œil). • Si vous êtes enceinte ou envisagez de l'être ou si vous allaitez (voir rubriques « Grossesse » et « Allaitement »). • Si vous avez moins de 18 ans (voir rubrique ci-dessous « Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans »).

Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans :
PAROXETINE WIN ne doit habituellement pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Les patients de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets indésirables tels que tentative de suicide, pensées suicidaires ou comportement hostile (comportement agressif, d'opposition et colère) lorsqu'ils sont traités par la paroxétine.

Néanmoins, il est possible que votre médecin décide de prescrire PAROXETINE WIN à des patients de moins de 18 ans si il/elle décide que c'est dans l'intérêt du patient.

Si votre médecin vous a prescrit (ou à votre enfant) PAROXETINE WIN et que vous désirez en discuter avec lui, adressez-vous à lui. Vous devez informer votre médecin si l'un des symptômes ci-dessus apparaît ou s'aggrave lors de la prise de PAROXETINE WIN par un patient de moins de 18 ans.

Dans cette tranche d'âge, la sécurité à long terme de la paroxétine concernant la croissance, la maturation et le développement cognitif et comportemental n'a pas encore été établie.

Dans les études chez des patients de moins de 18 ans, les effets secondaires fréquents qui affectaient moins de 1 enfant/adolescent sur 10 étaient les suivants : augmentation des pensées suicidaires et des tentatives de suicide, agressivité envers soi-même, comportement hostile, agressif ou inanctal, manque d'appétit, tremblements, transpiration excessive, hyperactivité, agitation, des fluctuations de l'humeur et accès de pleurs et des ecchymoses ou des saignements inhabituels (par exemple des saignements de nez). Dans ces études, les symptômes décrits ci-dessus ont également affecté les enfants et adolescents qui avaient reçu du placebo, mais à une fréquence moindre.

Dans ces études, certains patients de moins de 18 ans ont présenté des effets indésirables lors de la diminution de doses ou de l'arrêt de la paroxétine. Ces effets étaient similaires à ceux observés chez l'adulte à l'arrêt de la paroxétine. (Voir rubrique 3 « Comment prendre PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ? »).

De plus, les patients de moins de 18 ans ont présenté assez fréquemment (moins de 1 patient sur 10) des douleurs abdominales, une nervosité, et des fluctuations de l'humeur (accès de pleurs, agressivité envers soi-même, pensées suicidaires et tentatives de suicide).

Idées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux

Si vous souffrez de dépression et/ou de troubles anxieux, vous pouvez parfois avoir des idées d'auto-agression (agressivité envers vous-même) ou de suicide. Ces manifestations peuvent être majorées au début d'un traitement par antidiépresseur, car ce type de médicament n'agit pas tout de suite mais seulement après 2 semaines ou plus de traitement.

Vous êtes plus susceptible de présenter ce type de manifestations dans les cas suivants : • si vous avez déjà eu des idées suicidaires ou d'auto-agression dans le passé, • si vous êtes un jeune adulte. Les études cliniques ont montré que le risque de comportement suicidaire était accru, chez les adultes de moins de 25 ans présentant une maladie psychiatrique et traités par antidiépresseur.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, contactez immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital.

Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de vous signaler s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète d'un changement dans votre comportement.

Effets indésirables importants observés avec la paroxétine

Des patients traités par la paroxétine développent une réaction appelée akathisie, qui comprend le fait de se sentir agité et de ne pas pouvoir rester assis ou debout tranquillement. D'autres développent un syndrome sérotoninergique, comportant certains ou la totalité des symptômes suivants : confusion mentale, agitation, transpiration, tremblement, frissons, hallucinations (vision ou sons étranges), contractions involontaires des muscles ou rythme cardiaque accéléré. Si vous remarquez un de ces symptômes, contactez votre médecin. Pour plus d'information sur les effets indésirables de PAROXETINE WIN, lire ci-dessous la rubrique 4. « Quels sont les effets indésirables éventuels ? ».

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Dr. Mohamed MOKRI
NEUROCHIRURGIEN

Chirurgie et maladies du crâne,
Système nerveux et de la colonne vertébrale.
Traitement de l'épilepsie
Electroencéphalographie

Ex. Médecin principal à l'hôpital Mohamed 5 - Meknès
Ex. Praticien au CHU Ibn Rochd - Casablanca



الدكتور محمد المكري

اختصاصي في جراحة وأمراض الرأس،
الأعصاب و العمود الفقري
علاج داء الصرع (الكبار و الصغار)
التخطيط الكهربائي للدماغ

طبيب رئيسي سابق بمستشفى محمد الخامس - مكناس
جراح سابق بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد - الدار البيضاء

Casablanca, le : 17/09/2023

charak Habib

Fadil

CS : 250 dl
EEG : 450 dh

Total : 700 dl

Dr. MOKRI Mohamed
NEURO CHIRURGIEN
Bd. Mohamed Bouziane Rés. Farhatine
Imm.4 Appt. N° 2 Sidi Othman
Tél: 0522 551 092 / 0667 125 796

شارع محمد بوزيان، إقامة فرحتين، عمارة 4 ، شقة 2- الطابق الأول، سيدى عثمان - الدار البيضاء - (قرب أسيما سيدى عثمان)

Bd. Mohamed Bouziane Résidence Farhatine, Imm.4 Appt.2
1er étage - Sidi Othmane - Casablanca (près de Acima Sidi Othmane)

Tél.: 0522.551.092

GSM.: 0667.125.796

Dr. Mohamed MOKRI
NEUROCHIRURGIEN

Chirurgie et maladies du crâne,
Système nerveux et de la colonne vertébrale.
Traitement de l'épilepsie
Electroencéphalographie



Ex. Médecin principal à l'hôpital Mohamed 5 - Meknès
Ex. Praticien au CHU Ibn Rochd - Casablanca

الدكتور محمد المقربي

اختصاصي في جراحة وأمراض الرأس،
الأعصاب و العمود الفقري
علاج داء الصرع (الكبار و الصغار)
التخطيط الكهربائي للدماغ

طبيب رئيسي سابق بمستشفى محمد الخامس - مكناس
جراح سابق بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد - الدار البيضاء

Casablanca, le : 17/09/2003

chakif Habiba

EEG :

compte rendu

- trou de veille, en repos, yeux fermés
rythme de fond régulier, d'ondes delta, peu régulier
synchrone, symétrique, 8-10 normal

- KPP normal
- Absence d'ondes delta

où cheilos

Dr. MOHAMED MOKRI
NEUROCHIRURGIEN
Bd. Mohamed Bouziane Résidence Farhatine
Imm.4 Appt. N° 2 Sidi Othmane
Tél: 0522.551.092 / 0667.125.796

شارع محمد بوزيان، إقامة فرحتين، عمارة 4، شقة 2- الطابق الأول، سيدى عثمان - الدار البيضاء - (قرب أسيما سيدى عثمان)

Bd. Mohamed Bouziane Résidence Farhatine, Imm.4 Appt.2
1er étage - Sidi Othmane - Casablanca (près de Acima Sidi Othmane)

Tél.: 0522.551.092

GSM.: 0667.125.796