

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèse :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19-0031599

ND: 43482

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0506 - Société : RAM

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre : retraite

Nom & Prénom : H. Ben Abdellah Jilali

Date de naissance : 14.04.1942 - Age : 19 + N° 35

Adresse : 1942 - Casa

Tél. : 0650 569519 Total des frais engagés : 1018,00 - Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. EL FILALI ADIB
Cardiologue Interventionnel
120, Bd. My Idriss - Résidence My Idriss
2ème Etage - N° 4 CASABLANCA
Tél: 0522 86 20 74 - Fax: 0522 86 20 76
ICE : 001625537000091

Date de consultation : 06/08/20

Nom et prénom du malade : Ben Abdellah Jilali Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Cardiopathie ischémique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : MUPRAS

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa - Le : 12/12/2020

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
06.08.20	G		30900	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
صيدلية العائلية هشام فاخر مولى عبد الله رفقة 18 رقم 5 2221 83 15 الهاتف INPE : 092028166	01/08/20	1818,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient		
				COEFFICIENT DES TRAVAUX	
					MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION	
				FIN D'EXECUTION	
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX	
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 G 00000000 35533411 11433553 B				MONTANTS DES SOINS
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS	
					DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXE



Dr Hind EL FILALI ADIB

Cardiologue

Cardiologue Interventionnelle

Diplômée de la faculté de médecine de Bordeaux

Epreuve d'effort-Echographie cardiaque
Réadaptation cardiaque

M. BENBEDDA JILALI

الدكتورة هند الفيلالي أديب

أخصائية في أمراض القلب والشرائين

أخصائية في قسطرة أمراض القلب والشرائين

خريجة كلية الطب ببوردو

فحص القلب بالصدى - اختبار الجهد

إعادة التأهيل القلبي

le : 06/08/2020

Ordonnance

KARDEGIC 160mg , Comprimé pelliculé 1SCHT/J LE MATIN

CARDENSIEL 2.5mg 1/2CP LUNDI ET VENDREDI

COVERSYL 10mg 1CP/J LE MATIN

AMEP 10mg 1CP/J LE MATIN

TAHOR 40mg 1CP/J LE SOIR

OEDES 20mg 1GEL/J LE MATIN A JEUN

REGIME PEU SALE

QSP 3 MOIS RENOUVELABLE

Dr. Hind EL FILALI ADIB
Cardiologue
Cardiologue Interventionnelle
120, Bd. My Idriss 1er- Résidence My Idriss
2ème étage, N° 4 CASABLANCA
Tél: 0522 86 20 74 - Fax: 0522 86 20 78
ICE : 001625537000091
INPE : 091169466

Docteur Hind EL FILALI

كوفرسيل® 10 ملغ

بيرانند ويريل أرجنين ، حبات ملتبسة

2,48,000

• الأدوية المستعملة في علاج هبوط الضغط (ليفيدرين أو نورادريانين أو أدريانين).
• الأمراض الحثيئة وخاصة الحقنة عبر الوريد (المسروماتودي).
• حبات ملتبسة مع الطعام والشراب
• يستحسن أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة قبل وجبة الطعام.
• الحمل والرضاعة
إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، أو تعتقدين أنك حامل أو تخططين للإحجاب، عليك باستشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل تعاطي هذا الدواء.
• الحمل
من المهم أن تعلمي طبيبكِ إن كنت تخطين بآهلك حامل (أو إن كنت تتوقعين الحمل).
فقد يطلب منك الطبيب التوقف عن أخذ كوفرسيل 10 ملغ حبات ملتبسة قبل وقوع الحمل أو بمجرد ظهوره. كما سيصف لك دواءً آخراً بدلاً عن كوفرسيل 10 ملغ حبات ملتبسة.
لا ينصح بأخذ كوفرسيل 10 ملغ حبات ملتبسة في بداية الحمل، كما يُحظر أخذه قطعاً بعد الشهر الثالث من الحمل، حيث أنه يُشكل خطراً على الجنين.
• الرضاعة
أعلمي طبيبكِ إن كنت ترضعين (أو على وشك الإرضاع).
لا يجوز استعمال كوفرسيل 10 ملغ حبات ملتبسة لدى المرأة المرضع. فإن كنت مرضعة على الإرضاع، فسوف ينفذ لك طبيبكِ علاجاً آخر، وخاصة إن كان مطلق حديث الولادة أو إن كانت ولادته مبكرة.

بالنسبة لقيادة السيارات والعمل على الآليات
إن كوفرسيل 10 ملغ حبات ملتبسة لا يؤثر على اليقظة، لكن قد يظهر إحساس بالدوار أو بالتعب لدى بعض المرضى نتيجة لسيطرة هبوط الضغط الشرياني. لذا فقد تخف القدرة على قيادة السيارات أو العمل على الآليات.
• يحتوي كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة على سكر الحليب (لاكتوز)
في حالة أعلمتك طبيبك بأن جسمك لا يتقبل بعض أنواع السكر، عليك بمراجعته قبل أخذ هذا الدواء.

3. كيف يؤخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة ؟
عليك دائماً الالتزام بتناول هذا الدواء بالطريقة التي وصفها لك طبيبكِ. فإن لم تكن متأكدًا، فاستشر طبيبك.
تتبع لك الطبيب معك كارت من كارت من الماء، وتستحسن أخذه يومياً في نفس الميعاد أي في الصباح قبل وجبة الإفطار.
إن طبيبك هو الذي يقرّر مقدار الجرعة المناسبة لوضعك.
يتراوح مقدار الجرعة الموصى بها كالآتي:

ارتفاع الضغط الشرياني: إن الجرعة الاعتيادية في بادئ العلاج وجرعة الوقاية عبارة عن 5 ملغ في اليوم. إن تطلب الأمر، يمكن رفع هذه الجرعة، بعد شهر من العلاج، إلى 10 ملغ في اليوم وهي الجرعة القصوى لإشمار إلى علاج ارتفاع الضغط الشرياني.
إن كنت متجاوزاً 65 سنة من العمر، تكون الجرعة الاعتيادية في بادئ العلاج عبارة عن 2.5 ملغ في اليوم. يمكن رفعها، بعد شهر من العلاج، إلى 5 ملغ في اليوم. إن تطلب الأمر، يمكن رفعها، بعد شهر من العلاج، إلى 10 ملغ في اليوم وهي الجرعة القصوى لإشمار إلى علاج ارتفاع الضغط الشرياني في بادئ العلاج عبارة عن 5 ملغ في اليوم. يمكن رفعها، بعد أسبوعين من العلاج، إلى 10 ملغ في اليوم وهي الجرعة القصوى لإشمار إليها في هذا العلاج.

إن كنت متجاوزاً 65 سنة من العمر، تكون الجرعة الاعتيادية في بادئ العلاج عبارة عن 2.5 ملغ في اليوم. يمكن رفعها، بعد أسبوعين من العلاج، إلى 5 ملغ في اليوم. إن تطلب الأمر، يمكن رفعها، بعد أسبوعين من العلاج، إلى 10 ملغ في اليوم وهي الجرعة القصوى لإشمار إليها في هذا العلاج.
في حالة أحداث كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة أكثر من اللازم
استشر طبيبك أو الصيدلاني أو أخصب فوراً إلى المستشفى الأقرب لك. أكثر ما يُحتمل وقوعه في حالة الإفراط بأخذه، هو هبوط الضغط الشرياني، وقد يكون هذا مصحوباً بالدوار والغثول. في هذه الحالة عليك بالتوقف عن رفع الساقين للأعلى.
في حالة نسيب أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة
من المهم جداً أخذ الدواء يومياً لأن فعالية الدواء تابعة للعلاج المنتظم. ففي حالة نسيب أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة، قد يؤدي الإفراط في أخذ الدواء للعلاوة على عدم الفعالية.

لا يجوز على الإطلاق مضاعفة الجرعة تعويضاً للجرعة.
في حالة التوقف عن أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة
بشكل عام، إن العلاج بواسطة كوفرسيل 10 ملغ حبات ملتبسة، علاج طويل المدى، لذا ينبغي عليك أن تستشير الطبيب قبل التوقف عنه.
إن تسالت بخصوص استعمال هذا الدواء، عليك بالاستعلام لدى الطبيب أو الصيدلاني أو الممرضة.

4. ما هي الآثار الجانبية التي قد تحصل ؟
كما هي الحال مع كافة الأدوية، قد تنتج عن هذا الدواء، آثار جانبية رغم أنها لا نصح كافة الأشخاص.
فإن لاحظت حدوث أي من الآثار الجانبية التالية التي قد تكون خطيرة، توقف حالاً عن أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة وأصل فوراً طبيبك:
• تضخم في الوجه، أو في الشفتين، أو في القدم، أو في اللسان أو في البلعوم، صعوبة في التنفس (ردية وعائية) (انظر لقطع وتحذيرات واحتياطات)، (شائعة - يمكن أن تصيب شخص 1 على 100).
• دوخة حادة، أو غيب عن الوعي راجع لانخفاض الضغط الشرياني (شائعة جداً - يمكن أن

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

• احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاجها لتستند إليها من جديد.
• إذا كانت لديك أسئلة أخرى اسأل الطبيب أو الصيدلاني أو الممرضة (ع).
• لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً. فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة، فقد تلحق به الضرر.
• ما هي المعلومات المفروضة معرفتها قبل أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة ؟
3. كيف يؤخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة ؟
4. ما هي الآثار الجانبية التي قد تحصل ؟
5. كيف يحفظ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة ؟
6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية.

في هذه النشرة:

1. ما هو كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة وفي أية حالة يستعمل ؟
2. ما هي المعلومات المفروضة معرفتها قبل أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة ؟
3. كيف يؤخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة ؟
4. ما هي الآثار الجانبية التي قد تحصل ؟
5. كيف يحفظ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة ؟
6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية.

1. ما هو كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة وفي أية حالة يستعمل ؟
الغثة العلاجية الصيدلانية: حبات خبيثة مغطاة (IEC) كوبر 009A04:ATC

2. ما هي المعلومات المفروضة معرفتها قبل أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة ؟
هو عبارة عن مشط خبيثة مغطاة (IEC). وهو يعمل على توسيع الأوعية الدموية مسهلًا بهذا فعل القلب في ضخ الدم عبرها.
يستعمل كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة:

• في علاج ارتفاع الضغط الشرياني.
• في حالة قصور قلبي (أي في حالة قصور القلب عن ضخ الكمية الكافية من الدم التي يحتاجها الجسم).
• لتخفيف خطر التعرض للنحلات القلبية، مثل الذبحة القلبية، لدى الصابين بمرض الشريان التاجي الثالث (جريان الدم الورد للقلب حثيل أو محصور ولدى من أصيبوا من قبل بسكتة قلبية، وإو أدي من خضعوا لعملية تحسين ورود الدم للقلب عن طريق توسيع الشرايين التي قد القلب بالدم.

3. ما هي المعلومات المفروضة معرفتها قبل أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة ؟
إن أخذ طبيبك قد سبق وأعلمتك بأنك مصاب بعدم تحمل بعض أنواع السكر، فاقصص لطبيبك

لا يجوز على الإطلاق أخذ كوفرسيل 10 ملغ حبات ملتبسة:

• إذا كانت لديك حساسية من البيرانند ويريل، أو من أحد المكونات الأخرى التي يحتوي عليها هذا الدواء أو من الأدوية الأخرى التابعة لنفس مشتقات خميرة تحويل الأنغوتسين.

• إن طرأت لك في الماضي بوادر صغبر وقت النفس، أو تورم في الوجه أو في اللسان، أو في الخنبر، حكة شديدة، أو طفح جلدي شديد بعد العلاج بواسطة مشتقات تحويل الأنغوتسين (IEC) أو إن سبق وظهت هذه الأعراض على أحد من أفراد عائلتك مهما كان السبب (أي ظهور ردية وعائية).

• إذا كان حامل منذ أكثر من ثلاثة أشهر. من الأفضل تجنب أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة

• إن كنت مصاباً بالسكري أو بمرض الكلى أو بعمل (الرضاعة).
• على الكليتين (Palsikiren) أو بمرض الكلى أو بعمل (الرضاعة).
• إن كنت خاضعاً لتناول الدم أو لديك طريقة أخرى لتصفية الدم. لا يمكن ملازمة كوفرسيل

نملاً لآلة تشخيصية.
• إن كنت تشكو من اضطرابات كلوية مع انخفاض تدفق الدم إلى الكلي (تضيق في الشريان الكلوي أي الشريان الذي يروي الكليتين بالدم).

• إن كنت تتناول حاثاً سيكوتروين/فاسلارنان، دواء يستعمل لعلاج قصور القلب (انظر إلى مقطع وتحذيرات واحتياطات) و (الأدوية الأخرى وكوفرسيل).

تحذيرات واحتياطات
استشر طبيبك أو الصيدلاني أو الممرضة (ع) قبل أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملتبسة.

• إن كان لك تضيق أبهر (أي تضيق في الشريان الرئيسي الذي يروي للقلب)، أو تضخم في عضلة القلب (أي تضيق في عضلة القلب) أو تضيق في الشريان الكلوي (أي الشريان الذي يروي الكليتين بالدم).

• إن كنت تشكو من خلل قلبي آخر،
• إن كنت تشكو من مرض في الكبد،
• إن كنت تشكو من داء كلوي أو إن كنت خاضعاً لتناول الدم،

248,00

فإن لاحظت حدوث أي من الآثار الجانبية التالية التي قد تكون خطيرة، توقف حالاً عن أخذ كوفريسيل 10 ملغ، حيثاً مليئة واتصل فوراً بطبيبك:

• إن كنت تشكو من مرض في العبد،
• إن كنت تشكو من داء كلوي أو إن كنت خاضع لتصفية الدم،



Cardensiel® 2,5 mg
Comprimés pelliculés sécables B/30
PPV: 54,10 DH



Cardensiel® 2,5 mg
Comprimés pelliculés sécables B/30
PPV: 54,10 DH

ient.
chéma suivant :

entretien inférieur à 10 mg de bisoprolol peut être suffisante. Votre médecin vous indiquera la marche à suivre.
Si vous devez arrêter totalement le traitement, votre médecin vous conseillera généralement de réduire progressivement la dose, faute de quoi votre état de santé pourrait se détériorer.

Si vous avez pris plus de CARDENSIEL que vous n'auriez dû :

Prévenez immédiatement votre médecin qui décidera des mesures à prendre.

Les symptômes de surdosage peuvent être un ralentissement du rythme cardiaque, des difficultés respiratoires sévères, des vertiges ou des tremblements (dus à la baisse du taux de sucre dans le sang).

Si vous oubliez de prendre CARDENSIEL :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Prenez la dose habituelle le matin suivant.

Si vous arrêtez de prendre CARDENSIEL :

N'interrompez en aucun cas le traitement par CARDENSIEL si votre médecin ne vous a pas conseillé de le faire. Dans le cas contraire, votre état de santé pourrait se détériorer fortement. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CARDENSIEL est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Afin d'éviter les réactions graves, consultez un médecin immédiatement si un effet indésirable devient sévère, survient brusquement ou s'aggrave rapidement.

Les effets indésirables les plus graves sont ceux touchant les fonctions cardiaques :

- ralentissement du rythme cardiaque (plus de 1 personne sur 10)
- aggravation de l'insuffisance cardiaque (moins de 1 personne sur 10)
- rythme cardiaque lent ou irrégulier (moins de 1 personne sur 100)

Si vous avez des vertiges ou si vous vous sentez faible, ou encore si vous avez des difficultés à respirer, contactez votre médecin dès que possible.

Les autres effets indésirables sont répertoriés ci-dessous en fonction de leur fréquence :

Fréquent (moins de 1 personne sur 10) :

- fatigue, épuisement, vertiges, maux de tête,
- sensation de refroidissement ou d'engourdissement dans les mains et les pieds
- pression artérielle basse
- troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhée ou constipation,

Peu fréquent (moins de 1 personne sur 100) :

- troubles du sommeil
- dépression
- vertiges lors du passage à la position debout
- gêne respiratoire chez les personnes ayant un asthme ou des problèmes respiratoires chroniques
- faiblesse musculaire, crampes

Rare (moins de 1 personne sur 1000) :

- troubles de l'audition
- rhinite allergique
- diminution de la sécrétion de larmes
- inflammation du foie pouvant causer un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux
- résultats d'analyses anormaux
- réactions allergiques à type de démangeaisons, bouffées de chaleur, éruptions cutanées
- troubles de l'érection
- cauchemars, hallucinations
- perte de connaissance

Très rare (moins de 1 personne sur 10 000) :

- irritation et rougeur de l'œil (conjonctivite)
- chute des cheveux
- apparition ou aggravation d'une affection cutanée squameuse (psoriasis) ; éruption psoriasiforme.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER CARDENSIEL ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

has not been established. If you think pregnant, you must tell your doctor before

to breast milk in small amounts. If you find you must tell your doctor before

I may be pregnant or are planning to

use machines

machines. If the tablets make you feel

Not applicable.

3. How to take AMEP® tablets?

Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The recommended initial dose of AMEP® is 5 mg once daily. The dose can be increased to 10 mg of AMEP® once daily.

This medicine can be used before or after the consumption of food and drinks. You should take this medicine at the same time each day with a drink of water. Do not take AMEP® with grapefruit juice.

Use by children and adolescents

For children and adolescents (6-17 years old), the recommended usual starting dose is 2.5 mg a day. The maximum recommended dose is 5 mg a day. The tablets of AMEP® 2.5 mg are not currently available.

It is important to keep taking the tablets. Do not wait until your tablets are finished before seeing your doctor.

If you take more AMEP® tablets than you should:

Taking too many tablets may cause your blood pressure to become low or even dangerously low. You may feel dizzy, lightheaded, faint or weak. If blood pressure drop is severe enough shock can occur. Your skin could feel cool and clammy and you could lose consciousness. Seek immediate medical attention if you take too many AMEP®.

If you forget to take AMEP® tablets:

Do not worry. If you forget to take a tablet, leave out that dose completely. Take your next dose at the right time. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you stop taking AMEP® tablets:

Your doctor will advise you how long to take this medicine. Your condition may return if you stop using this medicine before you are advised.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. What are the possible side effects?

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Visit your doctor immediately if you experience any of the following side effects after taking this medicine.

- Sudden wheeziness, chest pain, shortness of breath or difficulty in breathing
- Swelling of eyelids, face or lips
- Swelling of the tongue and throat which causes great difficulty breathing
- Severe skin reactions including intense skin rash, hives, reddening of the skin over your whole body, severe itching, blistering, peeling and swelling of the skin, inflammation of mucous membranes (Stevens-Johnson Syndrome, toxic epidermal necrolysis) or other allergic reactions.
- Heart attack, abnormal heart beat
- Inflamed pancreas which may cause severe abdominal and back pain accompanied with feeling very unwell.

The following very common side effect has been reported. If this causes you problems or if it lasts for more than one week, you should contact your doctor.

Very common side effects: may affect more than 1 in 10 people

- Oedema (fluid retention)

The following common side effects have been reported. If any of these cause you problems or if they last for more than one week, you should contact your doctor.

Common side effects: may affect up to 1 in 10 people

- Headache, dizziness, sleepiness (especially at the beginning of treatment)
- Palpitations (awareness of your heart beat), flushing
- Abdominal pain, nausea
- Altered bowel habits, diarrhoea, constipation, indigestion
- Tiredness, weakness
- Visual disturbances, double vision
- Muscle cramps
- Ankle swelling

Other side effects that have been reported include the following list. If any of these get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

Uncommon side effects: may affect up to 1 in 100 people.

- Mood changes, anxiety, depression, sleeplessness
- Trembling, taste abnormalities, fainting
- Numbness or tingling sensation in your limbs, loss of pain sensation
- Ringing in the ears
- Low blood pressure
- Sneezing and running nose caused by inflammation of the lining of the nose (rhinitis)
- Cough
- Dry mouth, vomiting (being sick)
- Hair loss, increased sweating, itchy skin, red patches on skin, skin discoloration
- Disorder in passing urine, increased need to urinate at night, increased number of times of passing urine
- Inability to obtain an erection, discomfort or enlargement of the breasts in men
- Pain, feeling unwell
- Joint or muscle pain, back pain
- Weight increase or decrease

Rare side effects: may affect up to 1 in 1 000 people.

• Confusion

Very rare side effects: may affect up to 1 in 10 000 people

- Decreased numbers of white blood cells, decrease in blood platelets which may result in unusual bruising or easy bleeding
- Excess sugar in blood (hyperglycaemia)
- A disorder of the nerves which can cause muscular weakness, tingling or numbness
- Swelling of the gums
- Abdominal bloating (gastritis)
- Abnormal liver function, inflammation of the liver (hepatitis), yellowing of the skin (jaundice), liver enzyme increase which may have an effect on some medical tests
- Increased muscle tension
- Inflammation of blood vessels, often with skin rash
- Sensitivity to light
- Disorders combining rigidity, tremor, and/or movement disorders

Reporting of side effects.

The declaration of suspected side effects after authorization of the medicinal product is important. It allows continuous monitoring of the benefit / risk ratio of drugs.

5. How to store Amlopidine AMEP® Tablets?

- No special storage conditions.
- Keep out of the reach and sight of children
- Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the pack
- Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect environment.

6. Further informations:

What AMEP® Tablets contains ?

Active substance :	AMEP 10 en mg	AMEP 5 en mg
	13.90	6.95
Amlopidine besylate		
Equivalent to amlopidine	10.00	5.00

Excipients: Microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate dihydrate, silica colloidal anhydrous, carboxymethyl starch (Type A), magnesium stearate.

List of Excipients with known effect: Not applicable.

Name and address of Marketing Authorisation Holder in Morocco

COOPER PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20110 Casablanca

This leaflet was last revised in : January 2019

Conditions of regulation and delivery

Table A (list I).

IMPRIMEPEL 773.854.02.19

S® 20 mg

astro-résistants en gélules

LOT 181763
EXP 08/2021
PPV 99.00DH

lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Si vous avez besoin de la relire,
ou si vous avez un doute, demandez plus d'informations

Le médicament est prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un.
Si vous avez des symptômes antérieurs, cela pourrait lui être nocif,
ou si vous remarquez un effet indésirable
ou si vous remarquez un effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

DENOMINATION DU MEDICAMENT :

OEDES® 20 mg

COMPOSITION :

Chaque gélule contient 20mg de substance active : oméprazole.
Excipients : qsp 1 gélule.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATIONS :

Microgranules gastro-résistants en gélules. Disponibles en boîtes de 7, 14, 28 et 56

CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THERAPEUTIQUE :

Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule contient une substance appelée oméprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications :

Adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de *Helicobacter pylori* en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale.
- Ulcère duodénal évolutif.
- Ulcère gastrique évolutif.
- Œsophagite érosive ou ulcéreuse symptomatique par reflux gastro-œsophagien.
- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien associé ou non à une œsophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour.
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par *Helicobacter pylori* ou chez qui l'éradication n'a pas été possible.
- Traitement d'entretien des œsophagites par reflux gastro-œsophagien.
- Syndrome de Zollinger-Ellison.

Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable.

- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédents d'ulcère gastroduodénal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

Enfant à partir de 1 an :

- Œsophagite érosive ou ulcéreuse symptomatique par reflux gastro-œsophagien.

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Contre-indications :

Ne prenez jamais Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule :

- En cas d'allergie connue à l'un des composants de ce médicament.
- En association avec l'atazanavir associé au ritonavir (médicament anti-infectieux).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

S[®] 20 mg

astro-résistants en gélules

LOT 181763
EXP 08/2021
PPV 99.00DH

lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Si vous avez besoin de la relire,
ou si vous avez un doute, demandez plus d'informations

Le médicament est prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un.
Si vous avez des symptômes antérieurs, cela pourrait lui être nocif,
ou si vous remarquez un effet indésirable
ou si vous remarquez un effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

DENOMINATION DU MEDICAMENT :

OEDES[®] 20 mg

COMPOSITION :

Chaque gélule contient 20mg de substance active : oméprazole.
Excipients : qsp 1 gélule.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATIONS :

Microgranules gastro-résistants en gélules. Disponibles en boîtes de 7, 14, 28 et 56

CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THERAPEUTIQUE :

Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule contient une substance appelée oméprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications :

Adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de *Helicobacter pylori* en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale.
- Ulcère duodénal évolutif.
- Ulcère gastrique évolutif.
- Œsophagite érosive ou ulcéreuse symptomatique par reflux gastro-œsophagien.
- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien associé ou non à une œsophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour.
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par *Helicobacter pylori* ou chez qui l'éradication n'a pas été possible.
- Traitement d'entretien des œsophagites par reflux gastro-œsophagien.
- Syndrome de Zollinger-Ellison.

Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable.

- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédents d'ulcère gastroduodénal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

Enfant à partir de 1 an :

- Œsophagite érosive ou ulcéreuse symptomatique par reflux gastro-œsophagien.

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Contre-indications :

Ne prenez jamais Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule :

- En cas d'allergie connue à l'un des composants de ce médicament.
- En association avec l'atazanavir associé au ritonavir (médicament anti-infectieux).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

167,20

كوفرسيل® 10 ملغ

بيراندويريل أرجنين ، حبات ملبسة

• الأدوية المستخدمة في علاج انخفاض الضغط الشرياني، أو في علاج الوهن، أو في علاج الربو (لإيمارين أو نواديريلان أو أدريالين)،
• الأمراض الدهنية وخاصة الحصى عبر الوريد (المستعملة في علاج أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي)،
• كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة مع الطعام والشراب
يتحسن أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة قبل وجبة الطعام.
الحمل والرضاعة
إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، أو تعتقدون بأنك حامل أو تخططين للإحبال، عليك باستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تعاطي هذا الدواء.
من المرجح أن تعلمي طبيبك إن كنت تخطين بأنك حامل (أو إن كنت تتوقّعين الحمل).
عقد بضع مئات كوفرسيل 10 ملغ مع حبات ملبسة قبل أخذ كوفرسيل 10 ملغ حبات ملبسة قبل وجبة الطعام.
لا تصبح بأخذ كوفرسيل 10 ملغ حبات ملبسة في بداية الحمل، كما يحظر أخذها قطعياً بعد الشهر الثالث من الحمل، حيث أنه يشكل خطراً على الجنين.
الرضاعة

أعلمي طبيبك إن كنت ترعحين (أو علي وشك الإرجاع).
لا يجوز لأحد كوفرسيل 10 ملغ حبات ملبسة لدى المرأة المرضع. فإن كنت مصرة على الإرجاع، فسيتم إختيار لك طبيبك علاجاً آخر، وخاصة إن كان طفلك حديث الولادة أو إن كانت ولادته مبكرة.

مقارنة السيارات واستعمال الآليات
إن كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة لا يؤثر على اليقظة، لكن قد يظهر لدى بعض المرضى إحساس بالدوار أو بالتعب نتيجة انخفاض الضغط الشرياني. لذا فقد تنعقد القدرة على قيادة السيارات أو العمل على الآلات.
يعتري كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة على سكر الحليب (لاكتوز)
في حالة أصغرك طبيبك بأنك حساس لا يتقبل أنواع السكر، عليك بمراجعتهم قبل أخذ هذا الدواء.

3. كيف يؤخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة ؟
عليك دائماً الالتزام بتناول هذا الدواء بالطريقة التي وصفها لك طبيبك. فإن لم تكن متأكدًا، عليك باستشارة طبيبك.
في حالة أخذك طبيبك كل ساعة لا تتقبل بعض أنواع السكر، عليك بمراجعتهم قبل أخذ هذا الدواء.

• في علاج ارتفاع الضغط الشرياني.
• لتخفيض خطر التعرض للحوادث القلبية، مثل الذبحة القلبية، لدى المصابين بمرض الشريان التاجي الثلاث (جريان الدم الوارد للقلب عضل أو معصور) ولدى من أصيبوا من قبل بسلطنة قلبية، و/أو لدى من خضعوا لعملية تحسين ضخ الدم للقلب عن طريق توسيع الشرايين التي قد قبلت بالدم.
2. ما هي المعلومات المفروضة معرفتها قبل أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة ؟
إذا كان طبيبك قد سبق وأعطاك بأنك مصاب بعدم تحمّل بعض أنواع السكر، فالتصديق بالتبعية يتناول هذا الدواء.
لا يجوز على الإطلاق أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة:
• إذا كنت لديك حساسية من البيراندويريل، أو من أحد المكونات الأخرى التي يحتوي عليها هذا الدواء أو من الأدوية الأخرى التابعة لنفس مشتقات خميرة تخمير الألبومينوسين.
• إن طرأت لك أي أعراض بادر صغير وقت التنفس، أو تورم في الوجه أو في اللسان، أو في الخبيرة، سكتة شديدة، أو طلع جلدي شديد وقت العلاج بواسطة مشتقات تخمير الألبومينوسين (IEC)، أو إن سبق وظهور هذه الأعراض على أحد من أفراد عائلتك مهما كان السبب (أي قلبية، ودمية وعائية).

• إذا كنت حامل منذ أكثر من ثلاثة أشهر. من الأفضل تجنب أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة في بداية الحمل (انظري في ملحق الحمل والإرجاع).
• إذا كنت مصاباً بالسكري أو باضطراب الوظيفة الكلوية وتتلقي علاجاً خافضاً لضغط الدم يحتوي على الأليسينين (Taliskiren).
• إن كنت خاضعاً لتعصبة الدم أو لديك طريقة أخرى لتعصبة الدم. قد يكون كوفرسيل غير مناسب لك اعتماداً على الآلة المستخدمة.
• إن كنت تشكو من قصور كلوي من انخفاض تدفق الدم إلى الكلي (تضيق في الشريان الكلوي أو الشريان الذي يروي الكلية بالدم).
• إن كنت تتعاطى حاليًا بيسميونيل/فاسلارين، دواء يستخدم لعلاج قصور القلب (انظري في ملحق دواءات واختلاطات) و «الأدوية الأخرى وكوفرسيل».

تجديرات واحتياطات
استشر طبيبك أو الصيدلي أو للمرض (6) قبل أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة.
• إن كان لك تضيق أبهر (أي تضيق في الشريان الرئيسي الذي يروي القلب)، أو تضيق في عضلة القلب أو ارتفاع احتلال في عضلة القلب (أو تضيق في الشريان الكلوي (أي الشريان الذي يروي الكلية بالدم)).
• إن كنت تشكو من خلل قلبي آخر،
• إن كنت تشكو من مرض في الكبد،
• إن كنت تشكو من داء كلوي أو إن كنت خاضع لتعصبة الدم،
• إن كنت تشكو من ارتفاع معدل هرمون اللدوستيرون في الدم، ويشكك غير طمأنينة اللدوستيرون.

4. ما هي الآثار الجانبية المتوقعة ؟
كما هي الحالة مع كافة الأدوية، قد تنتج عن هذا الدواء، آثار جانبية رغم أنها لا تخص كافة الأشخاص.
فإن لاحظت حدوث أي من الآثار الجانبية التالية التي قد تكون خطيرة، توقف حالاً عن أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة وتواصل فوراً بطبيبك:
• تضخم في الوجه، أو في الشفتين، أو في اللسان أو في اليوم، صعوبة في التنفس

إقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاجها لتستند إليها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى اسأل الطبيب أو الصيدلي أو الممرض (ة).
- لقد وُصف هذا الدواء لك شخصياً. فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة، فقد تلحق به الضرر.
- إذا عثرتم بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلي أو الممرض (ة). هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المدلى بها في هذه النشرة (انظري إلى مقطع 4 : «ما هي الآثار الجانبية المحتملة»)

في هذه النشرة:

1. ما هو كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة وفي أية حالة يُستخدم ؟
2. ما هي المعلومات المفروضة معرفتها قبل أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة ؟
3. كيف يؤخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة ؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
5. كيف يُخفف كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة ؟
6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية.
7. ما هو كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة وفي أية حالة يُستخدم ؟

الغدة الغلانية الصغرى: مميزات خميرة التخويل (IEC)
C09AA04 : ATC
إن كوفرسيل 10 ملغ حبات ملبسة، هو عبارة عن مثبط خميرة تخويل (IEC). وهو يعمل على توسيع الأوعية الدموية سلباً بهذا عمل القلب في ضخ الدم عبرها.

يستخدم كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة:

• في علاج ارتفاع الضغط الشرياني.
• لتخفيض خطر التعرض للحوادث القلبية، مثل الذبحة القلبية، لدى المصابين بمرض الشريان التاجي الثلاث (جريان الدم الوارد للقلب عضل أو معصور) ولدى من أصيبوا من قبل بسلطنة قلبية، و/أو لدى من خضعوا لعملية تحسين ضخ الدم للقلب عن طريق توسيع الشرايين التي قد قبلت بالدم.

2. ما هي المعلومات المفروضة معرفتها قبل أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة ؟
إذا كان طبيبك قد سبق وأعطاك بأنك مصاب بعدم تحمّل بعض أنواع السكر، فالتصديق بالتبعية يتناول هذا الدواء.

لا يجوز على الإطلاق أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة:
• إذا كنت لديك حساسية من البيراندويريل، أو من أحد المكونات الأخرى التي يحتوي عليها هذا الدواء أو من الأدوية الأخرى التابعة لنفس مشتقات خميرة تخمير الألبومينوسين.

• إن طرأت لك أي أعراض بادر صغير وقت التنفس، أو تورم في الوجه أو في اللسان، أو في الخبيرة، سكتة شديدة، أو طلع جلدي شديد وقت العلاج بواسطة مشتقات تخمير الألبومينوسين (IEC)، أو إن سبق وظهور هذه الأعراض على أحد من أفراد عائلتك مهما كان السبب (أي قلبية، ودمية وعائية).

• إذا كنت حامل منذ أكثر من ثلاثة أشهر. من الأفضل تجنب أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة في بداية الحمل (انظري في ملحق الحمل والإرجاع).
• إذا كنت مصاباً بالسكري أو باضطراب الوظيفة الكلوية وتتلقي علاجاً خافضاً لضغط الدم يحتوي على الأليسينين (Taliskiren).

• إن كنت خاضعاً لتعصبة الدم أو لديك طريقة أخرى لتعصبة الدم. قد يكون كوفرسيل غير مناسب لك اعتماداً على الآلة المستخدمة.
• إن كنت تشكو من قصور كلوي من انخفاض تدفق الدم إلى الكلي (تضيق في الشريان الكلوي أو الشريان الذي يروي الكلية بالدم).
• إن كنت تتعاطى حاليًا بيسميونيل/فاسلارين، دواء يستخدم لعلاج قصور القلب (انظري في ملحق دواءات واختلاطات) و «الأدوية الأخرى وكوفرسيل».

تجديرات واحتياطات
استشر طبيبك أو الصيدلي أو للمرض (6) قبل أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة.
• إن كان لك تضيق أبهر (أي تضيق في الشريان الرئيسي الذي يروي القلب)، أو تضيق في عضلة القلب أو ارتفاع احتلال في عضلة القلب (أو تضيق في الشريان الكلوي (أي الشريان الذي يروي الكلية بالدم)).
• إن كنت تشكو من خلل قلبي آخر،
• إن كنت تشكو من مرض في الكبد،
• إن كنت تشكو من داء كلوي أو إن كنت خاضع لتعصبة الدم،
• إن كنت تشكو من ارتفاع معدل هرمون اللدوستيرون في الدم، ويشكك غير طمأنينة اللدوستيرون.

4. ما هي الآثار الجانبية المتوقعة ؟
كما هي الحالة مع كافة الأدوية، قد تنتج عن هذا الدواء، آثار جانبية رغم أنها لا تخص كافة الأشخاص.
فإن لاحظت حدوث أي من الآثار الجانبية التالية التي قد تكون خطيرة، توقف حالاً عن أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة وتواصل فوراً بطبيبك:
• تضخم في الوجه، أو في الشفتين، أو في اللسان أو في اليوم، صعوبة في التنفس

LOT : 20E014
PER.: 11 2021

KARDEGIC 160MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DH70



118001 081189

SANOFI

LOT : 9E006
PER.: 04 2021

KARDEGIC 160MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DH70



118001 081189

PHARMACEUTIQUE

Poudre pour solution buvable; Sachet-dose ; boîte de 30.

d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTI-THROMBOTIQUE/INHIBITEURS DE L'AGREGATION
PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

(Indications)

Ce médicament contient de l'aspirine, mais ce dosage est plus particulièrement destiné au traitement de certaines affections du cœur ou des vaisseaux, seul ou associé aux autres traitements prescrits par votre médecin.

Il ne devra pas être entrepris sans l'avis de celui-ci, seul juge de l'établissement et de la conduite de ce traitement.

3. ATTENTION

a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

(Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- En cas d'allergie connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (telle qu'éruption cutanée ou asthme),
- En cas de maladie hémorragique, • En cas de traitement concomitant par le méthotrexate, ou par les anticoagulants oraux (lorsque l'aspirine est prescrite à fortes doses (>3g/j)), • En dehors

d'utilisations extrêmement limitées, et qui justifie une surveillance spécialisée, tout médicament à base d'aspirine est CONTRE-INDIQUE à partir du 6ème mois de la grossesse (cf. Grossesse et Allaitement).

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS être utilisé sauf avis contraire de votre médecin, en cas de : - goutte, - règles ou saignements gynécologiques anormaux, - traitement concomitant par les anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou par l'héparine, les uricosuriques, ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses > 3g/j) (cf. rubrique Interactions médicamenteuses et autres interactions). L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf. Grossesse et Allaitement).

b) PRECAUTIONS D'EMPLOI

Il est important de signaler à votre médecin certains problèmes de santé ou situations : - maladie des reins, - asthme, - antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, ou d'hémorragies digestives, hypertension artérielle, - diabète, - port de stérilet.

L'aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours. Prévenir votre médecin traitant, le chirurgien, l'anesthésiste ou simplement votre dentiste au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé.

Ce médicament ne contenant pas de sodium (sel), il peut être administré en cas de régime désodé ou hyposodé.

c) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN notamment si vous prenez des anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou un traitement par l'héparine, des uricosuriques ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3g/j).