

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom :

Dr. Hanae El Mousa

Mme Hanae El Mousa

Dr. Hanae El Mousa

Mme Hanae El Mousa</p

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02/09/20	C& + ECA		300,00 Dhs	Dr. MOHAMMED MOSALAMI SPECIALISTE EN DENTISTE ET STOMATOLOGIE 203 Bd populaire El Oued N°38 Rond point Chouaib Tel: 05 22 8 10 84
09/10/20	C& + ECA		300,00 Dhs	Dr. Hanae Aissaoui SPECIALISTE EN DENTISTE ET STOMATOLOGIE 2 Mars Ain Chock Casablanca Tel: 05 22 8 10 84

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. KHALIL Al Khaili 505 Bd Al Khaili Ain chok - Casablanca Tel: 05 22 52 87 07	02/09/20	18670
		3d 4175

## ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. KHALIL Al Khaili 505 Bd Al Khaili Ain chok - Casablanca Tel: 05 22 52 87 07	02/09/20	Echographie	800,00 Dhs

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient DES TRAVAUX
		</td		

**Dr. Hanane EL MOSALAMI**  
**SPECIALISTE EN PATHOLOGIE**  
**CARDIO-VASCULAIRE**



Diplômée d'Echocardiographie de l'Université  
 Bordeaux Segalen  
 Holter ECG et Tensionnel  
 Epreuve D'effort  
 Echocardiographie de stress  
 Ancien interne des Hôpitaux de Paris  
 Diplômée de la faculté de médecine de Casablanca

**الدكتورة حنان المسلمي**  
**أخصائية في أمراض القلب والشرايين**

دبلوم الشخص بالصدى بجامعة بوردو بفرنسا  
 التسجيل المستمر للضغط الدموي و تخطيط القلب حتى ثلاثة اسابيع  
 تخطيط القلب أثناء الجهد  
 فحص القلب بالصدى أثناء الجهد  
 طبية داخلية سابقة بمستشفى باريس بفرنسا  
 خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

Casablanca le : ٥٢١٥٩١٢٠  
 الدار البيضاء، في :

٩٣٠ Beggar khadday'

٨٧,١٢ Rehabet Smg ١٤١٥

- Nagmine ٣٥٠ ٦ جل سير

٩٩,-

186,١٠

M ١ mois

Contrôle ١ س

**Adresse:** 203 bd panoramique, Imm panoramique II,  
 3<sup>ème</sup> étage N°38, Rond point panoramique 2 Mars  
 Ain Chock - Casablanca

**E-mail:** cabinetelmosalami@gmail.com

**Tél:** 05 22 87 00 84 - **Urgences:** 06 77 18 79 17

Dr. Hanane EL MOSALAMI  
 SPECIALISTE EN PATHOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE  
 203 bd panoramique  
 3<sup>ème</sup> étage N°38  
 2 Mars  
 Ain Chock - Casablanca  
 Tel: 05 22 87 00 84



العنوان: 203 شارع المنظر العام، إقامة المنظر العام 2، الطابق 3، رقم 38  
 تطبيط شارع 2 مارس و شارع المنظر العام  
 عن الشفاف - الدار البيضاء

البريد الإلكتروني: cabinetelmosalami@gmail.com  
 رقم الهاتف: 05 22 87 00 84  
 رقم الطوارئ: 06 77 18 79 17  
 رقم المستعجلات: 05 22 87 00 84

# **magmine**

**Magnésium 300 mg  
Vitamine B<sub>6</sub>  
SANS SUCRE ET SANS SEL**

## **COMPOSITION**

Un comprimé sans sucre et sans sel contient :

Oxyde de magnésium	1200 mg
Soit un apport en magnésium élément par comprimé de	300 mg
Vitamine B <sub>6</sub>	2 mg

## **PROPRIETES**

Le magnésium est indispensable au bon fonctionnement du cœur, des nerfs, des muscles et des différentes phases du métabolisme de l'organisme. MAGMINE à base de 300 mg de magnésium et de vitamine B<sub>6</sub>, permet de couvrir les besoins quotidiens en magnésium dans certaines situations :

- Effort physique intense
- Crampes et tensions musculaires, fatigue physique,
- Alimentation déséquilibrée, avec carence nutritionnelle chez les personnes âgées, chez l'adolescent et en cas de régime alimentaire pendant des cures d'amaigrissement
- Surmenage, activité intellectuelle intense
- Stress, lassitude, difficulté d'endormissement
- Croissance chez l'adolescent

## **CONSEILS D'UTILISATION**

- Prendre 1 comprimé par jour, à avaler, en buvant un verre d'eau.

## **PRESENTATION**

Boîte de 30 comprimés



# **magmine**

**Magnésium 300 mg  
Vitamine B<sub>6</sub>**  
*SANS SUCRE ET SANS SEL*

## **COMPOSITION**

Un comprimé sans sucre et sans sel contient :

magnésium

300 mg

Vitamine B<sub>6</sub>

2 mg

## **PROPRIETES**

Le magnésium est indispensable au bon fonctionnement du cœur, des nerfs, des muscles et des différentes phases du métabolisme de l'organisme.

**MAGMINE** à base de 300 mg de magnésium et de vitamine B<sub>6</sub>, permet de couvrir les besoins quotidiens en magnésium dans certaines situations :


- Effort physique intense
- Crampes et tensions musculaires, fatigue physique,
- Alimentation déséquilibrée, avec carence nutritionnelle chez les personnes âgées, chez l'adolescent et en cas de régime alimentaire pendant des cures d'amaigrissement
- Surmenage, activité intellectuelle intense
- Stress, lassitude, difficulté d'endormissement
- Croissance chez l'adolescent

## **CONSEILS D'UTILISATION**

- Prendre 1 comprimé par jour, à avaler, en buvant un verre d'eau.

## **PRESENTATION**

Boîte de 30 comprimés



# NEBILET® 5 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

## NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable

### *La substance active est :*

Nébivolol ..... 5,00 mg  
Sous forme de chlorhydrate de nébivolol ..... 5,45 mg  
pour un comprimé quadrifiable

### *Les autres composants sont :*

Poly sorbate 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

## 1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable ?

### **ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadrifiable en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (d'origine inconnue).

Ce médicament est également utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable légère à modérée, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque, chez les patients âgés de 70 ans ou plus.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable ?

### **Ne prenez jamais NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable dans les cas suivants :**

- Allergie au nébivolol ou à l'un des constituants de ce médicament.
- Insuffisance hépatique (*du foie*) ou altération de la fonction hépatique.
- Grossesse ou allaitement (cf. rubriques Grossesse et Allaitement).
- Insuffisance cardiaque aiguë, choc cardiogénique ou dé compensation de l'insuffisance cardiaque.
- Certains troubles de la conduction cardiaque (blocs auriculo-lo-ventriculaires des 2ème et 3ème degrés sans pace-maker, bloc sino-auriculaire).
- Asthme ou problèmes respiratoires sévères (actuels ou passés).
- Phéochromocytome non traité (*atteinte de la glande surrenale provoquant une hypertension artérielle sévère*).
- Acidose métabolique.
- Bradycardie (rythme cardiaque inférieur à 60 battements par minute) ou rythme cardiaque irrégulier (mala die du si nus).
- Hypotension (pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg).

(un médicament protecteur utilisé dans le traitement du cancer);

Médicaments pour traiter un excès d'acidité dans l'estomac ou les ulcères (médicament antiacide), par exemple la cimétidine ; NEBILET 5 mg doit être pris pendant les repas et l'antiacide entre les repas.

L'utilisation de ces médicaments est généralement déconseillée sous traitement par nébivolol sauf avis contraire de votre médecin.

## 3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable ?

### *Hypertension*

La dose est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines.

Votre médecin peut décider d'associer d'autres médicaments antihypertenseurs, en cas de réponse insuffisante.

### *Insuffisance cardiaque chronique stable*

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/4 de comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, selon la prescription de votre médecin.

Si le médicament est bien toléré, la posologie sera augmentée à 2,5 mg (soit 1/2 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 5 mg (soit 1 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines selon la prescription de votre médecin, et enfin à 10 mg (2 comprimés en une prise) par jour.

La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Voie orale.

Les comprimés peuvent être pris pendant les repas.

L'initiation du traitement et les augmentations successives de la dose doivent être réalisées par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge des patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique.

Si votre médecin vous a prescrit 1/4 de comprimé ou 1/2 comprimé une fois par jour, NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable doit être cassé comme indiqué ci-après :

Pour obtenir 1/2 comprimé, tenir le comprimé - face présentant les bords - de la sécabilité vers le haut - entre le pouce et les doigts - et le main, puis appliquer une pression avec les pouces, le long de la sécabilité (voir le dessin). Commencez à partir d'1/2 comprimé.

## \* VIGNETTE

### NEBILET® 5mg 28 comprimés

Pharmaceutical Institute  
R.S. 203 QLM ATZA Région Rabat

PPV : 87 DH 50

**Dr. Hanane EL MOSALAMI**  
**SPECIALISTE EN PATHOLOGIE**  
**CARDIO-VASCULAIRE**

Diplômée d'Échocardiographie de l'Université  
 Bordeaux Segalen

Holter ECG et Tensionnel

Epreuve D'effort

Echocardiographie de stress

Ancien interne des Hôpitaux de Paris

Diplômée de la faculté de médecine de Casablanca



**الدكتورة حنان المسلمي**  
**أخصائية في أمراض القلب والشرايين**

دبلوم الفحص بالصدى بجامعة بوردو بفرنسا

التسجيل المستمر للضغط الدموي و تخطيط القلب حتى ثلاث اسابيع

تخطيط القلب أثناء الجهد

فحص القلب بالصدى أثناء الجهد

طبية داخلية سابقة بمستشفيات باريس بفرنسا

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

Casablanca le : 02/10/20

الدار البيضاء، في :

Mme Beggar Khaddour



99.-

RDS

- Magnine 300 mg 1cp/1gell



- Nebilet 5mg 1cp/1j



100.000 UI

- D. cure

1 ampoule forte

Dr. Hanane EL MOSALAMI  
 SPECIALISTE EN PATHOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE  
 203 bd panoramique, Imm panoramique II,  
 3<sup>eme</sup> étage N°38, Rond point panoramique II  
 2 Mars, Ain Chock - Casablanca  
 Tel.: 05 22 87 00 84



1491F 0-1-0

- Nebilet (1se)

الدكتورة حنان المسلمي  
 Dr. Hanane EL MOSALAMI  
 SPECIALISTE EN PATHOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE  
 203 bd panoramique, Imm panoramique II,  
 3<sup>eme</sup> étage N°38, Rond point panoramique  
 2 Mars, Ain Chock - Casablanca

العنوان: 203 شارع المنظر العام، إقامة المنظر العام 2، الدار البيضاء، رقم 38

تقاطع شارع 2 مارس و شارع المنظر العام

عين الشق - الدار البيضاء

cabinetelmosalami@gmail.com

الهاتف الثابت: 05 22 87 00 84 - المستجدات: 06 77 18 79 17

Adresse: 203 bd panoramique, Imm panoramique II,  
 3<sup>eme</sup> étage N°38, Rond point panoramique 2 Mars

Ain Chock - Casablanca

E-mail: cabinetelmosalami@gmail.com

Tél: 05 22 87 00 84 - Urgences : 06 77 18 79 17

16

PPV:49,60 DH  
LOT: 20E06  
EXP: 05/2023

31

PPV:49,60 DH  
LOT: 20D06  
EXP: 04/2023

**MEFSAL® 7,5 mg, comprimé - B/10 & B/20  
MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable - B/10 & B/20  
(Méloxicam)**

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.  
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 1. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Substance active

- MEFSAL® 7,5 mg, comprimé :

Méloxicam

Pour 1 comprimé ..... 7,5 mg

- MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

• MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé sécable ..... 15 mg

d'emploi »).

Si vous n'êtes pas certain à propos d'un des points ci-dessus, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 6. EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.  
**Arrêtez de prendre MEFSAL® et consultez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche si vous remarquez:**

Toute réaction allergique (hypersensibilité), qui peut prendre la forme de :

- Réactions cutanées, notamment démangeaisons (prurit), cloques ou décollement de la peau, qui peuvent être des éruptions cutanées pouvant potentiellement mettre en jeu le pronostic vital (syndrome de Stevens Johnson, syndrome de Lyell), lésions des tissus mous (lésions des muqueuses) ou érythème polymorphe (CT. Contre indication). L'érythème polymorphe est une réaction allergique grave de la peau, provoquant des taches, des marques rouges ou violettes, ou des bulles à la surface de la peau. Cette réaction peut également atteindre la bouche, les yeux et les autres muqueuses.

- Gonflement des tissus sous la peau ou les muqueuses, par exemple gonflement autour des yeux, gonflement du visage et des lèvres, de la bouche ou de la gorge, rendant éventuellement la respiration difficile, ainsi que gonflement des chevilles ou des jambes (œdème des membres inférieurs).

- Essoufflement et crise d'asthme.

- Inflammation du foie (hépatite). Ceci peut entraîner les symptômes suivants :

- Jaunissement de la peau ou des globes oculaires (jaunisse).

- Douleurs abdominales.

- Perte d'appétit.

Tout effet indésirable du tube digestif, plus particulièrement :

- Saignements (entraînant une coloration des selles en noir),

- Ulcération du tube digestif (entraînant des douleurs abdominales). Les signes de l'apparition d'un ulcère digestif (saignements gastro-intestinaux), la formation d'un ulcère, l'aggravation d'une perforation, peuvent parfois entraîner partie d'érosion et d'ulcération mortelle, fatale, en particulier chez les personnes âgées. Informez immédiatement votre médecin, si vous avez été atteint précédemment de tels symptômes de l'appareil digestif suite à l'utilisation prolongée de médicaments anti-inflammatoires (AINS), en particulier si vous êtes âgé. Votre médecin pourra être amené à suivre toute modification de votre état pendant le traitement.

Si vous présentez des troubles de la vue, ne conduisez-pas ou n'utilisez pas de machine.

**Effets indésirables généraux des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)**

L'utilisation de certains médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) peut s'accompagner, en particulier avec des doses élevées et en cas de traitement de longue durée, d'un risque légèrement augmenté d'occlusion des vaisseaux artériels (maladie des artères artérielles), pouvant provoquer une crise cardiaque (infarctus du myocarde) ou accident vasculaire cérébral (apoplexie).

Des rétentions de liquides (œdèmes), une augmentation de la pression artérielle (hypertension) et une insuffisance cardiaque ont été observées en association avec le traitement par AINS.

**Les effets indésirables les plus couramment observés affectent l'appareil digestif (événements gastro-intestinaux) :**

• Défaux de l'estomac et de la partie supérieure de l'intestin grêle (ulcère péptique/gastrododénaux),

• Perforation de la paroi intestinale ou saignement digestif (évolution parfois fatale, en particulier chez les personnes âgées).

**Les effets indésirables suivants ont été rapportés après l'administration d'AINS:**

- Sensation de malaise (nausées) et vomissements,

- Selles molles (diarrhées),

- Constipation,

- Indigestion (dyspepsie),

- Douleurs abdominales,

- Selles de couleur noire provoquée par un saignement au niveau digestif (mélénase),

- Vomissement de sang (hématemèse),

- Inflammation de la muqueuse buccale avec ulcérations (stomatite ulcéruse),

- Aggravation des inflammations de l'appareil digestif (par exemple exacerbation de colite ou de la maladie de Crohn).

Moins fréquemment, une inflammation de l'estomac (gastrite) a été observée.

**Effets indésirables du Méloxicam - la substance active de MEFSAL®**

• Très fréquents : touche plus d'1 patient sur 10

- Événements indésirables gastro-intestinaux liés qu'à l'ingestion (dyspepsie), sensation de malaise (nausées) et vomissements, douleurs abdominales, constipation, fièvres, selles molles (diarrhées).

• Fréquents : touche de 1 à 10 patients sur 100

- Céphalées,

- Peu fréquents : touche de 1 à 10 patients sur 1000

- Étourdissements,

- Vertiges,

- Somnolence,

- Anémie (réduction de la concentration en hémoglobine, pigment

- Augmentation de la pression artérielle (hypertension),

- Boutillages de chaleur (rougeur temporaire du visage et du cou),

- Rétention hydro-sodée,

- Augmentation du taux de potassium (hyperkaliémie). Ces symptômes suivants :

- Troubles du rythme cardiaque (arythmies),

- Palpitations (perception de ses propres battements cardiaques),

- Faiblesse des muscles.

• Eructation,

- Inflammation de l'estomac (gastrite),

- Saignements gastro-intestinaux,

- Inflammation de la bouche (stomatite),

- Réactions allergiques immédiates (hypersensibilité),

- Démangeaison (prurit),

- Rash cutané,

- Gonflement provoqué par la rétention d'urine/des jambes/des pieds (œdème des membres),

- Gonflement sous les tissus sous-cutanés et/ou gonflement autour des yeux, du visage, du cou et rendant éventuellement la respiration difficile,

- Anomalies transitoires des tests biologiques

enzymes hépatiques telles que les transaminases (bilirubine). Votre médecin peut suggérer :

- Analyse des tests biologiques de la fonction

hépatique (transaminases),

- Rares : touche de 1 à 10 patients sur 100

- Troubles de l'humeur,

- Cauchemars,

- Numération sanguine anormale, notamment

- Numération sanguine différenciée anormale,

- Diminution du nombre de globules blancs

- Diminution du nombre de plaquettes sanguines,

- Ces effets indésirables peuvent entraîner

ainsi que des symptômes tels que l'apparition

de boutons d'oreilles (acouphène),

- Palpitations,

- Irritation de l'estomac ou de la partie

peristomiale (œsophagite/œsophagœdème),

- Inflammation de l'œsophage (œsophagite),

- Survenue de crises d'asthme observées avec l'aspirine ou à d'autres AINS,

- Graves réactions cutanées accompagnées

(syndrome de Stevens-Johnson et syndrome

d'Urticaire),

- Anomalies de la vue, notamment

- Vision floue,

- Inflammation du blanc des yeux ou des paupières,

- Inflammation du gros intestin (colite),

- Très rares : touche de 1 à 10 patients sur 100

- Inflammation des poumons sur la peau (réaction aux médicaments),

- L'érythème polymorphe est une réaction aiguë,

des marques rouges ou violettes, ou la réaction peut également atteindre la bouche,

- Inflammation du foie (hépatite). Ceci peut entraîner

- Jaunissement de la peau ou des globes oculaires,

- Douleurs abdominales,

- Perle d'appétit,

- Insuffisance rénale aigüe en particulier

par exemple une maladie cardiaque, un diabète,

- Perforation de la paroi intestinale,

- Indétermination (la fréquence ne peut être déterminée),

- Confusion,

- Désorientation,

- Essoufflement et réactions cutanées (réactions hypersensibilité),

- Éruptions cutanées provoquées par l'exposition solaire (photosensibilité),

- une insuffisance cardiaque a été rapportée AINS,

- Perle complète d'un certain type de globules

chez des patients qui prennent MEFSAL® et des médicaments potentiellement inhibiteurs, dépresseurs ou œsophage (médicaments myélotoxiques). Ces symptômes suivants :

- Une fièvre soudaine,

- Des maux de gorge,

- Paracétamol (inflammation du pancréas),

Effets indésirables causés par des non-stéroïdiens [AINS], mais non encore rapportés :

- Modifications organiques du rein entraînant

- Cas très rares d'inflammation du rein (nephritis),

- Mort de certaines cellules du rein (nécrose

réinale),

- Anémie (réduction de la concentration en hémoglobine, pigment

- Augmentation de la pression artérielle (hypertension),

- Boutillages de chaleur (rougeur temporaire du visage et du cou),

- Rétention hydro-sodée,

- Augmentation du taux de potassium (hyperkaliémie). Ces symptômes suivants :

- Troubles du rythme cardiaque (arythmies),

- Palpitations (perception de ses propres battements cardiaques),

- Faiblesse des muscles.

LOT 200338  
EXP 02/2023  
P.F.V 39.00DH

**Dr. Hanane EL MOSALAMI**  
**SPECIALISTE EN PATHOLOGIE**  
**CARDIO-VASCULAIRE**



Diplômée d'Échocardiographie de l'Université

Bordeaux Segalen

Holter ECG et Tensionnel

Epreuve D'effort

Echocardiographie de stress

Ancien interne des Hôpitaux de Paris

Diplômée de la faculté de médecine de Casablanca

**الدكتورة حناء المسلمي**  
**أخصائية في أمراض القلب والشرايين**

دبلوم الفحص بالصدى بجامعة بوردو بفرنسا

التسجيل المستمر للضغط الدموي و تخطيط القلب حتى ثلاثة اسابيع

تخطيط القلب أثناء الجهد

فحص القلب بالصدى أثناء الجهد

طبية داخلية سابقة بمستشفيات باريس بفرنسا

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

Casablanca le : ..02/09/20.....  
الدار البيضاء، في :

Mme Beggar Khadday

palpitations

→ Echoesur

الدكتورة حناء المسلمي  
Dr. Hanane EL MOSALAMI  
SPECIALISTE EN PATHOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE  
203 bd panoramique, Imm. panoramique II  
3<sup>e</sup> étage Rond point panoramique  
2 Mars - Ain Chock - Casablanca  
Télé : 05 22 87 00 84

**Adresse:** 203 bd panoramique, Imm. panoramique II,  
3<sup>e</sup> étage N°38, Rond point panoramique 2 Mars

Ain Chock - Casablanca

**E-mail:** cabinetelmosalami@gmail.com

**Télé:** 05 22 87 00 84 - **Urgences :** 06 77 18 79 17

العنوان: 203 شارع المنظر العام، إقامة المنظر العام، 2، الطابق 3، رقم 38  
تقاطع شارع 2 مارس و شارع المنظر العام  
عن الشق - الدار البيضاء

البريد الإلكتروني: cabinetelmosalami@gmail.com  
الهاتف الثاني: 06 77 18 79 17  
الهاتف الثالث: 05 22 87 00 84

**Dr. Hanane EL MOSALAMI**  
**SPECIALISTE EN PATHOLOGIE**  
**CARDIO-VASCULAIRE**

Diplômée d'Échocardiographie de l'Université

Bordeaux Segalen

Holter ECG et Tensionnel

Epreuve D'effort

Echocardiographie de stress

Ancien interne des Hôpitaux de paris

Diplômée de la faculté de médecine de Casablanca



**الدكتورة حنان المسلمي**  
**أخصائية في أمراض القلب والشرايين**

دبلوم الفحص بالصدى بجامعة بوردو بفرنسا

التسجيل المستمر للضغط الدموي و تحظيط القلب حتى ثلاث اسابيع

تحظيط

القلب أثناء الجهد

فحص القلب بالصدى أثناء الجهد

طبية داخلية سابقة بمستشفيات باريس بفرنسا

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

Casablanca le : .....02/09/2020..... الدار البيضاء، في :

## Facture

**MME BEGGAR KHADDOUJ**

Acte	QTE	Honoraire
Consultation + ECG	1	300,00 Dh
Echo doppler Cardiaque	1	800,00 Dh
<b>Total</b>		<b>1 100,00 Dh</b>

Arrêté la présente facture à la somme de :  
mille cent dirham(s)

Adresse: 203 bd panoramique, Imm panoramique II,  
3<sup>eme</sup> étage N°38, Rond point panoramique 2 Mars

Ain Chock - Casablanca

E-mail: cabinetelmosalami@gmail.com

Tél: 05 22 87 00 84 - Urgences : 06 77 18 79 17

العنوان: 203 شارع المنظر العام، إقامة المنظر العام 2، الطابق 3، رقم 38

تقاطع شارع 2 مارس و شارع المنظر العام

عن الشق - الدار البيضاء

البريد الإلكتروني: cabinetelmosalami@gmail.com

الهاتف الثابت: 05 22 87 00 84 - المستجدات: 06 77 18 79 17