

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ○ Réclamation | : contact@mupras.com |
| ○ Prise en charge | : pec@mupras.com |
| ○ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Déclaration de Maladie

N° W19-453704

CK



Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)
Matricule : 1537

Société : RAM

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : HOUPLAN MOHAMED

Date de naissance : 16.06.70.

Adresse : BD TAHA HOUSSIN, RUE 61 N°3

NADOR

Tél. : 0661089117 Total des frais engagés : # 849,90 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr Hassan ROBIO
Medecine Generale
Av FAR Rue Moscou N°4 Nador
Tel 0536 60 00 32

Date de consultation :

18.06.2020

Nom et prénom du malade :

AMROUSSI YAMNA Age 66 Ans

Lien de parenté :

Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

CHRONIQUE

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : NADOR Date : 18.06.2020

Signature de l'adhérent(e) : HOUPLAN MOHAMED

Le : 18.06.2020

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
8 AOÛT 2020	Consultation	1	(200) -	INP : 111111111111111111 08/08/2020 Dr Hassani Medecine Generale Rue Moscou N° 53 53/60 00 32 RO
27/8/2020	-	1	C	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	18.08.20	104,90
	27.08.20	338,00 HT

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire de Radiologie	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>Dr. ECHICHE Radiologue Av. Des Frères Chauasse 113 Rabat 1000 Tél: 05-76-23-0-73</i>	27/08/2020	Radios Genoux S(F)	200 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H	25533412 00000000	21433552 00000000	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
D	35533411	00000000	11433553	MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
B				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Hassan ROBIO

Medecin generale

Diplome d'echographie

Diplome d'expertise & réparation du dommage corporel

Ex-medecin à l'hôpital AL HASSANI - NADOR

Visite medicale pour obtention du permis de conduire

الدكتور الحسن روبيو

الطب العام

دبلوم الفحص بالعندي

دبلوم الخبرة الطبية وتقدير الأضرار الجسدية

طبيب سابق بالمستشفى الحسني بالناظور

الفحص الطبى لنيل رخصة السياقة

Nador le : ٢٨/١٢/٢٠٢٣

Dr Hassan
ROBIO

169,00 x 2

Dr Hassan ROBIO (2023)

338,00

169,00 x 2

—
Dr Hassan



Dr Hassan ROBIO
Medecine Generale
Av F.A.R Rue Mouscou N° 4 Nador
Tel 0526 60 00 32



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament :

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament est un remède personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques; cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Composition du médicament :

60mg comprimé pelliculé :

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise : Etoricoxib.....

90mg comprimé pelliculé :

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise : Etoricoxib.....

120mg comprimé pelliculé :

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise : Etoricoxib.....

Etoricoxib a effet natriurétique - Lactose monohydrate.

Classe pharmacothérapeutique ou le type d'activité :

DOLICOX® 60 mg, 90 mg & 120 mg, comprimé pelliculé est l'un des médicaments de la classe des inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase-2 (COX2).

La classe pharmacothérapeutique : anti-inflammatoires anti-rhumatismaux, non stéroïdiens;

Indications thérapeutiques :

DOLICOX® 60mg, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement [inflammation] des articulations et des muscles chez les patients atteints d'arthrose.

DOLICOX® 90mg, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement [inflammation] des articulations et des muscles chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde.

DOLICOX® 90mg, comprimé pelliculé est également utilisé pour le traitement de courte durée de la douleur modérée après chirurgie dentaire.

DOLICOX® 120 mg, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement [inflammation] des articulations et des muscles chez les patients atteints de goutte.

Pathologie :

Les deux comprimés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120mg, ne doivent pas être pris ni par les enfants, ni par les adolescents de moins de 16 ans.

Ne pas dépasser la dose recommandée pour le traitement de votre maladie. Il est important d'utiliser la dose la plus faible qui soulage votre douleur et de ne pas prendre DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé plus longtemps que prescrit.

Arthrose :

La dose recommandée est de 30 mg une fois par jour, augmentée à 60 mg maximum une fois par jour si nécessaire.

Patients avec problèmes hépatiques.

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour.

Patiente diabète :

L'étoricoxib ne doit être utilisé que pendant la période de douleur aiguë.

Douleur post-opératoire après chirurgie dentaire

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour, traitement limité à 3 jours au maximum.

Patients avec problèmes hépatiques

La dose recommandée est de 120 mg une fois par jour qui ne doit être utilisée que pendant la période aiguë de la douleur, limitée à 8 jours au maximum.

Patients avec problèmes hépatiques

En cas de maladie hépatique légère (maladie du foie), vous ne devez pas prendre plus de 60 mg par jour.

Si vous avez une forme modérée d'insuffisance hépatique, la dose maximale recommandée est de 60 mg un jour sur deux, ou de 30 mg par jour.

Mode d'administration :

Veuillez prendre les comprimés pelliculés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, doivent être avalés en une prise par jour. DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut être pris au cours ou en dehors des repas.

Durée du traitement :

Ne prenez jamais DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Aigreur (hypersensibilité) à l'étoricoxib ou à l'un des autres composants contenus dans DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé.

- Allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris l'aspirine et les inhibiteurs sélectifs de la COX-2.

- Ulcère de l'estomac; évolutif ou saignement gastro-intestinal,

- Maladie grave du foie,

- Maladie grave des reins,

- Grossesse et allaitement ou prévision de grossesse (voir Rubrique « Grossesse et allaitement »).

- Enfants et adolescents de moins de 16 ans,

- Maladie inflammatoire de l'intestin, telle que maladie de Crohn, rectocolite hémorragique ou colite.

- Diagnostic de maladie cardiaque à type d'insuffisance cardiaque (modérée ou sévère), d'angine de poitrine, antécédents de crise cardiaque, pontage coronarien, maladie des artères périphériques, ou toute sorte d'accident vasculaire cérébral y compris un accident ischémique transitoire. L'étoricoxib pourrait légèrement augmenter le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, c'est la raison pour laquelle il ne doit pas être utilisé chez les patients ayant déjà eu de multiples pathologies cardiaques ou un accident vasculaire cérébral.

- Hypertension artérielle non contrôlée par un traitement (vérifiez avec votre médecin ou votre infirmière si vous n'êtes pas sûr que votre pression artérielle soit bien contrôlée). Si vous pensez que l'un de ces points vous concerne, ne prenez pas les comprimés sans avoir consulté votre médecin au préalable.

Effets indésirables :

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, DOLICOX® 60mg, 90mg & 120mg, comprimé pelliculé peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous présentez l'un de ces symptômes, vous devez immédiatement arrêter DOLICOX® 60mg, 90mg & 120mg, comprimé pelliculé et contacter votre médecin.

- Apparition ou aggravation d'un essoufflement, de douleurs thoraciques ou d'œdème des chevilles,

- Coloration jaune de la peau et des yeux (jaunisse) : cela peut être le signe évocateur de troubles hépatiques.

- Douleur d'estomac importante ou permanente ou coloration noire des selles,

- Réaction allergique pouvant inclure des problèmes cutanés tels qu'apparition d'ulcérations ou de vésicules, ou gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge pouvant entraîner une difficulté à respirer.

La fréquence des effets indésirables possibles listés ci-dessous est définie selon la convention suivante :

Très fréquents (survenant chez plus de 1 patient sur 10)

Fréquents (survenant chez 1 à 10 patients sur 100)

Peu fréquents (survenant chez 1 à 10 patients sur 1 000)

Rares (survenant chez moins de 1 patient sur 10 000)

Les effets indésirables suivants peuvent survenir pendant le traitement par DOLICOX® 60mg, 90mg & 120mg, comprimé pelliculé :

Très fréquents : Douleur à l'estomac.

Fréquents :

- Alcéolite; Gonflement des jambes et/ou des pieds dû à une rétention d'eau;

- Étourdissements, maux de tête; Palpitations, rythme cardiaque irrégulier; Élevation de la pression artérielle; Sifflements ou difficultés respiratoires; Constipation, flatulence, gaztrite, ballonnements d'estomac, diarrhée, indigestion /gène à l'estomac, nausées, vomissements; inflammation de l'oesophage, ulcérations de la bouche; Modifications des examens sanguins évaluant le fonctionnement du foie; Hématoxème; Faiblesse et fatigue, syndrome de Guillain-Barré;

Peu fréquents :

- Gastroentérite, infection des voies respiratoires hautes, infection urinaire, diminution du nombre de globules rouges, diminution du nombre de globules blancs, diminution des plaquettes, hyperSENSIBILITÉ, augmentation ou diminution de l'appétit, prise de poids, anxiété, dépression, diminution du discernement, voir, ressentir ou entendre des choses qui n'existent pas, défaillance du goût, insomnie, sensibilité d'engourdissement ou picotements; somnolence, étourdissements, ballonnements d'estomac, douleur abdominale, douleur d'oreille, anormolie du rythme cardiaque, fréquence cardiaque rapide, insuffisance cardiaque, sensation d'oppression, de pression ou de poids dans la poitrine, crise cardiaque, bousphore de chaleur, accident vasculaire cérébral, n/m-AVC, élévation sévère de la pression artérielle, inflammation des vaisseaux sanguins, toux, essoufflement, soignements de nez, ballonnement de l'estomac ou de l'intestin, modification du transit intestinal, sécheresse de la bouche, ulcère de l'estomac, inflammation de la paroi de l'estomac; pouvant devenir grave et ulcérer jusqu'à l'hémorragie, troubles hépatiques ou ulcérations dans le pancréas; gonflement du visage, éruption cutanée ou démangeaisons, rougeur de la peau, crampes/spasme musculaire, douleur musculaire/raideur, taux de potassium élevés dans le sang, modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement du rein;

Peu fréquents pour DOLICOX® 120mg :

- Anomalie, infection des voies respiratoires hautes, Ulcérations de la bouche, g

Rares :

- Angio-œdème (réaction allergique sévère qui nécessite un traitement immédiat);

- Convulsions; Préliminaire hépatite; Troubles de l'hypothalamus (jouissance de la peau et de

- Diminution du taux de sodium dans le sang, rougeur et

Très rares pour DOLICOX® 120mg, (survenant chez moins de 1 patient sur 10 000) :

Reactions allergiques (qui peuvent être suffisamment graves pour entraîner la mort) ; difficultés respiratoires ou essoufflement, toux, ulcérations dans le pancréas;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement du rein;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement du cœur et des vaisseaux sanguins;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement du foie;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement des reins;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement du pancréas;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de l'estomac;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de l'intestin;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de l'ovaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande adrénergique;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande thyroïde;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pineale;

Modifications des examens sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement de la glande pituitaire;

<p

Docteur Hassan ROBIO

Medecin generale

Diplome d'echographie

Diplome d'expertise & réparation du dommage corporel

Ex-medecin à l'hôpital AL HASSANI - NADOR

Visite medicale pour obtention du permis de conduire

الدكتور الحسن روبيو

الطب العام

دبلوم الفحص بالصدى

دبلوم الخبرة الطبية وتقدير الأضرار الجسدية

طبيب سابق بالمستشفى الحسني بالناظور

الفحص الطبي لنيل رخصة السياقة

Nador le : 18/12/20,

ARROUSSI
YAMNA

4780

DATEN 4
30/12/20

(186)
am

5710

BREKIN 6
18/12/20

104,90

am

CWY

Dr Hassan ROBIO
Medecine Generale
Av FAR Rue Moscou N° 4 Nador
Tel 0536 60 00 32



Av.F.A.R, Rue Mouscou, N° 4 - NADOR

شارع الجيش الملكي زنقة موسكو رقم 4 - الناظور

05 36 60 00 32

بريكسين®

بيروكسيكام ببطاسيكلوكوليسترين

تركيب :

بيروكسيكام ببطاسيكلوكوليسترين
(كمية موازنة لـ 20 ملغ من بيروكسيكام)
سواح كميةكافحة من أجل *

أكياس	تحميل	أقراص	
20 ملغ	20 ملغ	20 ملغ	
كيس واحد	تحميلة	قرص واحد	

يحتوي على لاكتوز (بريكسين® أقراص)، أسيبارتام و سوربيتول (بريكسين® أكياس).

خصائص :
مضاد للالتهاب غير سترويدى منتمى إلى مجموعة أوكسيكام.

دواعي الاستعمال :
- علاج لررماتيزم التهابي مزمن، وبعض اعتلالات المفاصل المؤلمة والمبطلة.
- علاج للالتهاب المفاصل واعتلال المفاصل.

موانع الاستعمال :
- سوابق حساسية أو حساسية بسبب استهلاك بيروكسيكام أو مواد مشابهة مثل الأسبرين أو المخادات للالتهاب غير سترويدية.
- قرح للمعدة والأمعاء في تطور، نقص كبدى أو كلبى حاد.
- الأطفال أقل من 15 سنة.
- شراك مع مخادات لتخثر الدم، مضادات للالتهاب غير سترويدية، هيبارين، ليبثيوم، ميتوتريكسات، تيكلوبيدين.

تأثيرات جانبية :
- مفاسيل على الجهاز الهضمي (فقدان الشهية، ثقل، غثيان، قيء، قيء، ألم بطني، انتفاخ البطن، إسهال، قرح).
- حساسية جلدية، تنسقية أو عامة.
- صداع، دوخة أو رغبة في النوم.
- مفاسيل جلدية أو على الفم.
- في حالة الحمل والرضاعة.

احتياطات الاستعمال :
في حالة تزييف دمومي في البطن أو الأمعاء أو مفاسيل جلدية يجب إيقاف العلاج فوراً.
يستعمل بحبطة عند ذوى سوابق هضمية.
إمكانية حدوث دوخة ورغبة في النوم عند سائقى السيارات والآلات.

مقادير و طريقة الاستعمال :
يجب احترام الرصافة الطبيعية.

المقادير المستعملة : 1 قرص، 1 كيس، أو فتيلة مرة واحدة في اليوم إلى أن تختفي الأعراض.

تقديم :

بريكسين® 20 مغ -علبة محتوية على 10 و 20 قرصا فائزرا

بريكسين® 20 مغ -علبة محتوية على 20 قرصا قابلة للكسر

بريكسين® 20 مغ -علبة محتوية على 10 تحاميل

بريكسين® 20 مغ -علبة محتوية على 10 أكياس

لأنحة |

BREXIN®

Piroxicam Béta-cyclodextrine

Composition :

Piroxicam
(équivalent à 19,20 mg de piroxicam
β-cyclodextrine)
Excipients q.s.p.
Excipients à effet notoire

	Comprimés sécables 20 mg	Suppositoires 20 mg	Sachets 20 mg
	1 comprimé Lactose	1 suppositoire	1 sachet Aspartam et Sorbitol

Propriétés :

Anti-inflammatoire non stéroïdien du groupe des oxicams.

Indications :

- Traitement des états douloureux aigus.
- Traitement des rhumatismes inflammatoires aigus et chroniques.

Contre-indications :

- Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de piroxicam, de substances d'activité proche telles que autres AINS ou l'Aspirine.
- Hypersensibilité à l'un des constituants.
- Ulcère gastroduodenal en évolution, insuffisance hépatocellulaire sévère ou insuffisance rénale sévère.
- Enfants de moins de 15 ans.
- Phénylcétonurie du fait de la présence de l'Aspartam dans les sachets.
- Association avec les anticoagulants oraux, autres AINS, héparine, lithium, méthotrexate et ticlopidine.
- En cas de grossesse et d'allaitement.

Effets indésirables :

Effets gastro-intestinaux : anorexie, pesanteurs épigastriques, nausées, vomissements, constipation, douleurs abdominales, flatulences, diarrhées, ulcères.

Réactions d'hypersensibilité : dermatologiques, respiratoires et générales.

Effets sur le système nerveux central : céphalées, somnolences et vertiges.

Précautions d'emploi :

En cas d'hémorragie gastro-intestinale ou d'une manifestation cutanée ou muqueuse, interrompre immédiatement le traitement et consulter votre médecin.

Ce médicament sera administré avec prudence et sous surveillance particulière chez les malades ayant des antécédents digestifs.

L'attention doit être attirée chez les conducteurs et utilisateurs de machines sur la possibilité de vertiges et de somnolence.

Mode d'emploi et posologie :

Se conformer à la prescription médicale.

La posologie usuelle est de 20 mg par jour en

Formes et autres présentations :

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 et 20 comprimés sécables

BREXIN® 20 mg - Boîte de 20 comprimés sécable

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 suppositoires

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 sachets

Liste I (Tableau A)

IOT 20004
PER JAN 23
PPV 57DH10

57,10

DASEN® 10.000 UI

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

DENOMINATION

DASEN®10 000 UI, comprimé enrobé gastro-résistant

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

SERRAPEPTASE 10 000 unités*

Excipients : stéarate de magnésium, amidon de maïs, lactose, acétophthalate de cellulose, jaune orangé S (E110), dioxyde de titane, poloxamère 188.

Pour un comprimé enrobé gastro-résistant

*1 unité correspond au nombre de µg de tyrosine libérée par 5 ml de substrat (caséine) en 1 minute à partir de 1 mg de serrapeptase.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé enrobé gastro-résistant, boîte de 40 .

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ENZYMOOTHERAPIE à visée anticedémateuse et fluidifiante

(M : Système locomoteur)

(M : Système respiratoire)

Exploitant/Fabricant :

Laboratoires SYNTHEMEDIC

20-22, Rue Zoubeir Bnou Al aouam. Roches Noires - Casablanca

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament, modificateur des sécrétions bronchiques, est indiqué en cas d'affection respiratoire récente avec difficulté d'évacuer les crachats.

Il est également utilisé pour traiter les œdèmes consécutifs à un traumatisme ou une intervention chirurgicale.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'allergie connue à l'un des constituants notamment à la serrapeptase (enzyme).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

En cas de réaction allergique, le traitement doit être arrêté immédiatement et définitivement.

Un avis médical est nécessaire :

- en cas de fièvre, de crachats gras ou purulents,
- si vous êtes atteint d'une maladie chronique (au long cours) des bronches et des poumons.

Ce traitement doit toujours être cracher. La prise simultanée illogique.

Ne pas prendre de médicament de traitement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS DE DOUTE, NE PAS SE RÉFÉRER À LA PLATEAU

PPV :

EXP :

Lot N° :

47,80]

INTERACTIONS MEDICAMENT

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS.

Docteur Hassan ROBIO

Medecine générale

Diplôme d'echographie

Diplôme d'expertise & réparation du dommage corporel

127

الدكتور الحسن روبيو

الطب العام

دبلوم الفحص بالصدى
دبلوم الخبرة الطبية وتقدير الاضرار الحسدية
طبيب سابق بالمستشفى الحسني بالناظور
الفحص الطبي لنيل رخصة السياقة

AOUT 2020

Bon de Radiologie

AT ROUSSI
Y. MNA.

Rox Legueux (F)

Dr. ECHCHAMI Hafid

Radiologue

Av. Des F.A.R. Résidence Gourougou

Quai-de-Chaussée - Nador

Tel 05 36 33 57 78

Dr Hassan ROBIO
Medecin Généraliste
Av F.A.R. Rue Mouscou N° 4 Nador
Tel 0536 60 00 32



Av. F.A.R, Rue Mouscou, N° 4 - Nador

robiohassan@yahoo.fr

شارع الجيش الملكي زفة موسكو. رقم . 4 - الناظور

+00212 (0) 536 600 032

+00212 (0) 661 260 023





مركز الفحص بالأشعة إيسراي Centre de Radiologie ISRAE

IRM – Scanner –Radiologie- Mammographie – Panoramique - Echographie – Doppler

Dr ECHCHAMLI HAFID

Taxes professionnelle : 56107991
ID Fiscal : 34475396
Affiliation CNSS : 1496794


ICE :001970188000015

FACTURE

Date : 27/08/2020

Numéro :16325/20

Nom patient : AMROUSSI YAMNA

Médecin :DR H. ROBIO

PAYANT

EXAMENS	Montant
RX DES GENOUX FACE	200 DH

Total :200 DH

Arrête la présente à la somme de :DEUX CENTS DH

Dr. ECHCHAMLI Hafid
Radiologue
Av. Des F.A.R. Résidence Gourougou
Rer-de-Chaussée - Nador



مركز الفحص بالأشعة إيسراي

Centre de Radiologie ISRAE

IRM – Scanner –Radiologie- Mammographie – Panoramique - Echographie – Doppler
Dr ECHCHAMLI HAFID

Nador le: 27/08/2020

Nom du patient: AMROUSSI YAMNA

Médecin traitant: DR H. ROBIO

Compte rendu

RADIOGRAPHIE DES GENOUX FACE

Pincement modéré de l'interligne articulaire fémoro tibiale bilatérale plus prononcée du côté du condyle interne.

Absence de lésions osseuse d'allure traumatique.

Les parties molles sont d'épaisseurs normales.

CONCLUSION :

Aspect radiologique compatible avec une gonarthrose modérée et bilatérale prédominante du côté du condyle interne.

Dr ECHCHAMLI Hafid
Radiologue
Av Des FAR Résidence Gourougou
Rez-de-Chaussée N° 100
N° 0536 33 67 78