

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Reclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Nº P19- 063586

ND: 45801

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 0750 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Mr IBRAHIMI Mohamed

Date de naissance :

04-04-1944

Adresse :

47 Mustapha el Hafid - Casablanca - 20000

Tél. : 0661241340 Total des frais engagés : 538,50 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Professeur BENNANI Saâd

Chirurgien Urologue

42, Bd. Abdelmoumen - Casa

Tél: 0522 23 10 23 / 0522 23 10 73

Date de consultation : 23/9/2020

Nom et prénom du malade : SIBRAHINI Mohamed Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :


prostatite

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le 27/10/2020

Signature de l'adhérent(e) : 

Professeur BENNANI Saâd

Chirurgien Urologue



الدكتور بناني سعد

لاد جامعي

جراحة المسالك البولية والتباشيرية

عضو الجمعية الأفروبيبة والفرنسية

جراحة المسالك البولية والتباشيرية

Membre de l'European Association of Urology
et de l'Association Française d'Urologie

Casablanca, le : 23-9-2020

79.5?

Mr IBRAHIMI Mohamed

① TERAZOSINE NORMON 5mg ~~79,50~~ X 3

1 cp par jour le mat + 3 mois

Professeur BENNANI Saâd
Chirurgien Urologue
42, Bd. Abdelmoumen - Casab
Tél: 0522 23 10 23

صيدلية الرودانی
PHARMACIE ROUDANI
Mme LEBBAR Khadija et Mme Youssef
26, Bd Brahim Roudani Vers Maârif
Tél.: 05 22 27 23 88 / 05 22 27 17 74

Professeur BENNANI Saâd
Chirurgien Urologue
42, Bd. Abdelmoumen - Casab
Tél: 0522 23 10 23 / 0522 23 10 73

T = 238,50

LSA

42، شارع عبد المؤمن - الطابق الخامس - الدار البيضاء

42, Boulevard Abdelmoumen Résidence Walili 5ème étage - Casablanca

Tél.: 05 22 23 10 23 - Fax : 05 22 23 10 73 - GSM : 06 61 16 65 16

- Si vous prenez ce médicament avec d'autres médicaments ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, veuillez en parler à votre pharmacien ou à quelqu'un d'autre, membre du personnel de santé.

• Que contient cette notice ?

- Qu'est ce que TERAZOSINE NORMON® comprimés et dans quel cas sont-ils utilisés ?
 - Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
 - Comment prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 - Comment conserver TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
 - Informations supplémentaires.

1. QU'EST CE QUE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

La térazosine est un médicament qui améliore les symptômes urinaires des patients présentant des difficultés à la miction (en particulier la nuit) et qui diminue la pression artérielle.

TERAZOSINE NORMON® comprimés, s'utilisent pour le traitement des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS.

- Ne prenez jamais TERAZOSINE NORMON® comprimés dans les cas suivants :
 - Si vous êtes allergiques (hypersensibles) à la térazosine, une substance similaire ou à l'un des composants de ce médicament.
 - Si vous avez des antécédents de syncope (évanouissement) au moment d'uriner.

• Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

- Mises en garde spéciales et précautions d'emploi : Adressez vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés. - En cas d'hypotension orthostatique et syncope, avisez votre médecin.

- En cas d'hypotension orthostatique et syncope, avisez votre médecin.
 - En cas de vertige, somnolence, étourdissement et palpitations, restez assis ou en position allongée, évitez de conduire ou de faire de l'escalade.
 - Une syncope (évanouissement) peut survenir (chez moins de 1% des patients) après la première prise initiale du médicament, ou par l'usage simultané d'autre substance antihypertensive.
 - En cas de traitement par **TERAZOSINE NORMON®** comprimés et avant toute opération chirurgicale oculaire de cataracte, **NORMON®** comprimés peut engendrer des complications durant l'opération, votre ophtalmologue adoptera les mesures chirurgicales nécessaires.

• Utilisation chez les enfants et les personnes âgées

Enfants : Il est déconseillé d'utiliser la **TERAZOSINE NORMON® comprimés** chez les enfants, car la sécurité et l'efficacité n'a pas été établie. **Personnes âgées :** La sensibilité à la **TERAZOSINE NORMON® comprimés** est beaucoup plus accentuée chez les personnes âgées. Si l'un des symptômes énumérés ci-dessus apparaît au cours de la prise du médicament, avisez votre médecin.

• Interactions avec d'autres médicaments :
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même si vous n'en avez pas pris de la semaine dernière.

medicaments peuvent interagir entre eux. L'administration concomitante de la terazosine avec d'autres antihypertenseurs (medicament qui diminue la pression arterielle) certains patients prenant un traitement a base d'alpha-bloquant pour le traitement de l'hypertension arterielle ou de l'hypertension vertigineuses ou des etourdissements, qui peuvent etre dus a une pression arterielle basse lors du passage rapide a la position ces symptomes lors de la prise de medicaments indiques dans la dysfonction erectile (impuissance) avec les alpha-bloquants vous devez etre traite par une dose quotidienne constante d'alpha-bloquants avant de debuter un traitement pour la dysfonction

- Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin. La sécurité de la terazosine pendant la grossesse n'a pas été établie. La terazosine ne doit pas être utilisée durant la grossesse sauf si les bénéfices qui justifient son utilisation face au risque que peut courir le fœtus.

Aucune information n'a été confirmée sur le passage de la terazosine dans le lait maternel. Le traitement ne devrait pas être

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

• Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines

La térazosine peut provoquer une diminution de la pression artérielle. Au début du traitement, une prudence particulière est recommandée pour les personnes réalisant des tâches difficiles, car l'apparition fréquente de symptômes prémonitoires peut engendrer un problème d'alerte. Il est donc conseillé d'éviter de conduire ou d'utiliser des machines durant les 12 premières heures suivant l'administration de la dose initiale ou de reprise du traitement interrompu auparavant.

Dans le cas d'une hypotension, le patient devra être allongé jusqu'à

- Informations importantes sur les composants de TERAZOSINI

Informations importantes sur les comprimés de laque jaune orangé Ce médicament contient du lactose. Demandez l'avis de votre médecin. La laque jaune orangé (colorant de **TERAZOSINE NORMON® 2 mg**) Ils peuvent également déclencher une crise d'asthme chez les patient

3. COMMENT PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS

Conformez-vous strictement aux instructions d'administration de TERAZOSINE NORMON® comprimés indiquées par votre pharmacien.

La nomenclature est adaptée à chaque cas individuel.

LOT: 12820003

REF: 01/2023

PERIODIQUE
PUBLI: 79,50 DH

s, consultez
'ERAZOSIN'

~~Sortir hors de la portée et de la~~

Ras de précautions

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TERAZOSINE NORMON® 2 mg comprimés Boîte de 15 comprimés
TERAZOSINE NORMON® 5 mg comprimés Boîte de 30 comprimés
DCI: Térazosine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas d'urgence.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, contactez votre médecin.

• Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que TERAZOSINE NORMON® comprimés et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
3. Comment prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST CE QUE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

La térazosine est un médicament qui améliore les symptômes urinaires des patients présentant des difficultés de miction. La térazosine génère aussi une diminution de la pression artérielle. TERAZOSINE NORMON® comprimés, s'utilisent pour le traitement des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TERAZOSINE NORMON® ?

- Ne prenez jamais TERAZOSINE NORMON® comprimés dans les cas suivants :
 - Si vous êtes allergiques (hypersensibles) à la térazosine, une substance similaire ou à l'un des composants de TERAZOSINE NORMON® comprimés,
 - Si vous avez des antécédents de syncope (évanouissement) au moment d'uriner.

• Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

- Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés.
- En cas d'hypotension orthostatique et syncope, avisez votre médecin.
 - En cas de vertige, somnolence, étourdissement et palpitations, restez assis ou en position allongée, évitez de faire de l'exercice physique et ne prenez pas de médicaments sans avis de votre médecin.
 - Une syncope (évanouissement) peut survenir (chez moins de 1% des patients) après la première prise initiale de TERAZOSINE NORMON® comprimés. Si cela se produit, arrêtez immédiatement la prise et contactez votre médecin.
 - En cas de traitement par TERAZOSINE NORMON® comprimés et avant toute opération chirurgicale oculaire ou chirurgicale, veillez à informer votre chirurgien.

• Utilisation chez les enfants et les personnes âgées

Enfants : Il est déconseillé d'utiliser la TERAZOSINE NORMON® comprimés chez les enfants, car la sécurité n'a pas été établie.

Personnes âgées : La sensibilité à la TERAZOSINE NORMON® comprimés chez les personnes âgées est beaucoup plus accentuée que chez les autres personnes. Si l'un des symptômes énumérés ci-dessous apparaît au cours de la prise du médicament, avisez votre médecin.

• Interactions avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament. Certains médicaments peuvent interagir entre eux. L'administration concomitante de la térazosine avec d'autres antihypertenseurs (médicament qui diminue la pression artérielle) ou certains médicaments peuvent entraîner des effets indésirables tels que la syncope (évanouissement). Ces symptômes peuvent être dus à une pression artérielle basse lors du passage rapide de l'urine. Si ces symptômes persistent ou si vous avez des difficultés de miction, contactez votre médecin.

• Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. La sécurité de la térazosine pendant la grossesse n'a pas été établie. La térazosine ne doit pas être utilisée pendant la grossesse ou l'allaitement.

Aucune information n'a été confirmée sur le passage de la térazosine dans le lait maternel.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

La térazosine peut provoquer une diminution de la pression artérielle, ce qui peut entraîner des taches difficiles, une perte de coordination et une perte de vigilance. Ces symptômes peuvent également entraîner une diminution de la force et de la coordination. Si vous prenez TERAZOSINE NORMON® comprimés et que vous conduisez ou utilisez des machines, veillez à prendre des précautions pour éviter les accidents.

Dans le cas d'une hypotension, le patient devra être allongé jusqu'à disparition complète des symptômes.

• Informations importantes sur les composants de TERAZOSINE NORMON® :

Ce médicament contient de la térazosine, un principe actif.

LOT: 12820006

PER: 04/2023

PPU: 79,50 DH

Le traitement ne devrait pas être interrompu.

Tenir hors de la portée des enfants. Une prudence extrême est nécessaire lorsque les personnes réalisent des tâches difficiles, car l'apparition fréquente de symptômes prémonitoires peut engendrer une perte de coordination et une perte de vigilance. Ces symptômes peuvent également entraîner une diminution de la force et de la coordination. Si vous prenez TERAZOSINE NORMON® comprimés et que vous conduisez ou utilisez des machines, veillez à prendre des précautions pour éviter les accidents.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TERAZOSINE NORMON® 2 mg comprimés Boîte de 15 comprimés

TERAZOSINE NORMON® 5 mg comprimés Boîte de 30 comprimés

DCI: Térazosine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

• Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que TERAZOSINE NORMON® comprimés et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
3. Comment prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST CE QUE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

La térazosine est un médicament qui améliore les symptômes urinaires des patients présentant des symptômes d'obstruction urinaire.

La térazosine génère aussi une diminution de la pression artérielle.

TERAZOSINE NORMON® comprimés, s'utilisent pour le traitement des symptômes de l'hypertension artérielle.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ?

- Ne prenez jamais TERAZOSINE NORMON® comprimés dans les cas suivants :
 - Si vous êtes allergiques (hypersensibles) à la térazosine, une substance similaire ou à l'un des ingrédients.
 - Si vous avez des antécédents de syncope (évanouissement) au moment d'uriner.

• Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés.

- En cas d'hypotension orthostatique et syncope, avisez votre médecin.
- En cas de vertige, somnolence, étourdissement et palpitations, restez assis ou en position allongée.
- Une syncope (évanouissement) peut survenir (chez moins de 1% des patients) après la première dose, ou par l'usage simultané d'autre substance antihypertensive.
- En cas de traitement par TERAZOSINE NORMON® comprimés et avant toute opération chirurgicale, TERAZOSINE NORMON® comprimés peut engendrer des complications durant l'opération, votre ophtalmologie chirurgical.

• Utilisation chez les enfants et les personnes âgées

Enfants: Il est déconseillé d'utiliser la TERAZOSINE NORMON® comprimés chez les enfants, car leur tolérance n'a pas été établie.

Personnes âgées: La sensibilité à la TERAZOSINE NORMON® comprimés est beaucoup plus importante chez les personnes âgées. Si l'un des symptômes énumérés ci-dessus apparaît au cours de la prise du médicament, avisez votre médecin.

• Interactions avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments. Certains peuvent interagir entre eux.

L'administration concomitante de la térazosine avec d'autres antihypertenseurs (médicament qui réduit la tension artérielle) ou certains patients prenant un traitement à base d'alpha-bloquant pour le traitement de l'hypertension artérielle peuvent être dus à une pression artérielle basse lors de ces symptômes lors de la prise de médicaments indiqués dans la dysfonction érectile (impuissance). Vous devez être traité par une dose quotidienne constante d'alpha-bloquants avant de débuter un autre médicament.

• Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, la sécurité de la térazosine pendant la grossesse n'a pas été établie. La térazosine ne doit pas être utilisée pendant la grossesse ou l'allaitement. La térazosine peut passer dans le lait maternel. Le tra-

ans le lait maternel. Le tra-

LOT : 12820007

PER : 04/2023

PPU : 79,50

rendre tout médicament.

machines :

étielle. Au début du traitement.

Tenir hors de la portée des enfants de moins de 12 ans et des personnes sensibles aux médicaments.

Dans le cas d'une hypotension, le patient devra être allongé jusqu'à disparition complète des symptômes.

• Informations importantes sur les composants de TERAZOSINE NORMON® comprimés :

Ce médicament contient de l'acide clorhydrate de térazosine.