

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

## Déclaration de Maladie



Mutuelle de Prévoyance & d'Actions Sociales de Royal Air Maroc

No W19-441429

28 OCT. 2020

### Maladie

### Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 10-71

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : BARAKATI BEN HAFID

Date de naissance : 1968

Adresse :

Tél. : 0661211338

Total des frais engagés :

Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade : BARAKATI BEN HAFID Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 2020

Le : 28/10/2020

Signature de l'adhérent(e) :



MUPRAS

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/10/2022	C1		15000	INP : 1111111111111111
				15000
				15000
				15000

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur      Date      Montant de la Facture

02/10/2022      449,-

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	


### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
-----------------	----------------	------------------	-------------	-------



### ODF PROTHESES DENTAIRES



### DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	00000000
G	35533411	11433553

### [Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

Docteur Widad El Khadraj

Médecine Générale  
ECHOGRAPHIE

ECG

Surveillance de Grossesse  
Nutrition



الدكتورة وداد الخضر

الطب العام  
الفحص بالصدى

تخطيط القلب

مراقبة الحمل

الممية الطبية وتخفيض الوزن

Casablanca, le : 02/10/2026 الدار البيضاء في :

nelle BOA KIT TAK Casablanca



20,00 dz

11 - versol 400 (x6)  
18594103

à renouveler

245,00

21 - AL Silex gél 150 à servir  
l'antécide

48,50

186246 M

31 - Ti Sevel 500

186246 M

حي الوفاق 3 زنقة 65 رقم 59 الألفة الدار البيضاء (قرب صيدلية الوفاق)

Hay Wifak 3 Rue 65, N° 59 El Oulfa - Casablanca (Prés de pharmacie Al Wifak)

Tél.: 05 22 891 927

361  
uT-Psypholacide



149, 50

Dr. El KHADRAJ  
El Widaq 3 Rue Général  
Médecine  
C. 1404 BLANC  
Giza - 164 - 65  
Télé: 05 22 89 19 27  
El Oufa

PHARMACEUTICAL  
MANUFACTURE LTD.  
El Widaq 3 Rue Général  
Médecine  
C. 1404 BLANC  
Giza - 164 - 65  
Télé: 05 22 89 19 27  
El Oufa

**VERZOL®** 400 mg

1 comprimé



LOT: 20100 PER: 07/2023  
PPV: 20,00 DH

AMM N°277 DMP/21/NNP

Laboratoires **Steripharma**

Z.I Lina n° 347 Sidi Maârouf - Casablanca  
E Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable  
C

..... 400 mg

..... 1 comprimé

soit 400 mg d'albendazole.

..... 400 mg

..... 10 ml

..... ole soit 400 mg d'albendazole.

قيرزول ®  
البندازول 400 مغ

Cl  
An  
INC عن طريق  
Le  
la fa  
indic  
Trich  
paras

Ibendazole qui est un antiparasitaire de synthèse de **VERZOL®** présente un intérêt tout particulier dans les ostomose, Trichocéphalose, Anguillulose, Giardiose, l'albendazole ne doit être envisagé qu'en cas de

#### CONTRE- INDICATIONS

Hypersensibilité à l'albendazole ou à l'un des composants.

Femme enceinte : C.F. grossesse et allaitement.

#### MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

##### Mises en garde spéciales

En raison de la présence de lactose dans **VERZOL®** 400 mg comprimé, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

##### Précautions particulières d'emploi

Lors du traitement de la trichinellose avec ce médicament une surveillance par un bilan sanguin est préconisée en raison du risque de survenue d'anomalies de la numération formule sanguine et des fonctions hépatiques. Pour favoriser son efficacité dans le traitement des infestations à trichine, le traitement doit être débuté le plus tôt possible au début de l'infestation. En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

##### Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin: lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

##### Allaitement

L'utilisation de ce médicament est déconseillée durant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Généralement bien toléré, **VERZOL®** peut entraîner des effets indésirables, le plus souvent bénins et transitoires.

- Troubles gastro-intestinaux : diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, vertiges, céphalées.
- Lors de traitement prolongé ont été rapportés : fièvre, alopecie réversible, leucopénie, pancytopenie, augmentation des transaminases, rash.

**VERZOL®** 400 mg

1 comprimé



LOT: 20100 PER: 07/2023  
PPV: 20,00 DH

AMM N°277 DMP/21/NNP

Laboratoires **Steripharma**

Z.I Lina n° 347 Sidi Maârouf - Casablanca  
E Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable  
C

..... 400 mg

..... 1 comprimé

soit 400 mg d'albendazole.

..... 400 mg

..... 10 ml

..... ole soit 400 mg d'albendazole.

قيرزول ®  
البندازول 400 مغ

عن طريق

Le  
la fa  
indic  
Trich  
paras

Ibendazole qui est un antiparasitaire de synthèse de **VERZOL®** présente un intérêt tout particulier dans les ostomose, Trichocéphalose, Anguillulose, Giardiose, l'albendazole ne doit être envisagé qu'en cas de

#### CONTRE- INDICATIONS

Hypersensibilité à l'albendazole ou à l'un des composants.

Femme enceinte : C.F. grossesse et allaitement.

#### MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

##### Mises en garde spéciales

En raison de la présence de lactose dans **VERZOL®** 400 mg comprimé, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

##### Précautions particulières d'emploi

Lors du traitement de la trichinellose avec ce médicament une surveillance par un bilan sanguin est préconisée en raison du risque de survenue d'anomalies de la numération formule sanguine et des fonctions hépatiques. Pour favoriser son efficacité dans le traitement des infestations à trichine, le traitement doit être débuté le plus tôt possible au début de l'infestation. En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

##### Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin: lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

##### Allaitement

L'utilisation de ce médicament est déconseillée durant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Généralement bien toléré, **VERZOL®** peut entraîner des effets indésirables, le plus souvent bénins et transitoires.

- Troubles gastro-intestinaux : diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, vertiges, céphalées.
- Lors de traitement prolongé ont été rapportés : fièvre, alopecie réversible, leucopénie, pancytopenie, augmentation des transaminases, rash.

**VERZOL®** 400 mg

1 comprimé



LOT: 20100 PER: 07/2023  
PPV: 20,00 DH

AMM N°277 DMP/21/NNP

Laboratoires **Steripharma**

Z.I Lina n° 347 Sidi Maârouf - Casablanca  
E Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable  
C

..... 400 mg

..... 1 comprimé

soit 400 mg d'albendazole.

..... 400 mg

..... 10 ml

..... ole soit 400 mg d'albendazole.

قيرزول ®  
البندازول 400 مغ

Cl  
An  
INC عن طريق  
Le  
la fa  
indic  
Trich  
paras

Ibendazole qui est un antiparasitaire de synthèse de **VERZOL®** présente un intérêt tout particulier dans les ostomose, Trichocéphalose, Anguillulose, Giardiose, l'albendazole ne doit être envisagé qu'en cas de

#### CONTRE- INDICATIONS

Hypersensibilité à l'albendazole ou à l'un des composants.

Femme enceinte : C.F. grossesse et allaitement.

#### MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

##### Mises en garde spéciales

En raison de la présence de lactose dans **VERZOL®** 400 mg comprimé, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

##### Précautions particulières d'emploi

Lors du traitement de la trichinellose avec ce médicament une surveillance par un bilan sanguin est préconisée en raison du risque de survenue d'anomalies de la numération formule sanguine et des fonctions hépatiques. Pour favoriser son efficacité dans le traitement des infestations à trichine, le traitement doit être débuté le plus tôt possible au début de l'infestation. En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

##### Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin: lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

##### Allaitement

L'utilisation de ce médicament est déconseillée durant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Généralement bien toléré, **VERZOL®** peut entraîner des effets indésirables, le plus souvent bénins et transitoires.

- Troubles gastro-intestinaux : diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, vertiges, céphalées.
- Lors de traitement prolongé ont été rapportés : fièvre, alopecie réversible, leucopénie, pancytopenie, augmentation des transaminases, rash.

**VERZOL®** 400 mg

1 comprimé



LOT: 20100 PER: 07/2023  
PPV: 20,00 DH

AMM N°277 DMP/21/NNP

Laboratoires **Steripharma**

Z.I Lina n° 347 Sidi Maârouf - Casablanca  
E Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable  
C

..... 400 mg

..... 1 comprimé

soit 400 mg d'albendazole.

..... 400 mg

..... 10 ml

..... soit 400 mg d'albendazole.

قيرزول ®  
البندازول 400 مغ

Cl An  
INC عن طريق  
Le i la fa  
indic  
Trich  
paras

Ibendazole qui est un antiparasitaire de synthèse de **VERZOL®** présente un intérêt tout particulier dans les ostomose, Trichocéphalose, Anguillulose, Giardiose, l'albendazole ne doit être envisagé qu'en cas de

#### CONTRE- INDICATIONS

Hypersensibilité à l'albendazole ou à l'un des composants.

Femme enceinte : C.F. grossesse et allaitement.

#### MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

##### Mises en garde spéciales

En raison de la présence de lactose dans **VERZOL®** 400 mg comprimé, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

##### Précautions particulières d'emploi

Lors du traitement de la trichinellose avec ce médicament une surveillance par un bilan sanguin est préconisée en raison du risque de survenue d'anomalies de la numération formule sanguine et des fonctions hépatiques. Pour favoriser son efficacité dans le traitement des infestations à trichine, le traitement doit être débuté le plus tôt possible au début de l'infestation. En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

##### Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin: lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

##### Allaitement

L'utilisation de ce médicament est déconseillée durant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Généralement bien toléré, **VERZOL®** peut entraîner des effets indésirables, le plus souvent bénins et transitoires.

- Troubles gastro-intestinaux : diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, vertiges, céphalées.
- Lors de traitement prolongé ont été rapportés : fièvre, alopecie réversible, leucopénie, pancytopenie, augmentation des transaminases, rash.

**VERZOL®** 400 mg

1 comprimé



LOT: 20100 PER: 07/2023  
PPV: 20,00 DH

AMM N°277 DMP/21/NNP

Laboratoires **Steripharma**

Z.I Lina n° 347 Sidi Maârouf - Casablanca  
E Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable  
C

..... 400 mg

..... 1 comprimé

soit 400 mg d'albendazole.

..... 400 mg

..... 10 ml

..... soit 400 mg d'albendazole.

قيرزول ®  
البندازول 400 مغ

Cl  
An  
INC عن طريق  
Le  
la fa  
indic  
Trich  
paras

Ibendazole qui est un antiparasitaire de synthèse de **VERZOL®** présente un intérêt tout particulier dans les ostomose, Trichocéphalose, Anguillulose, Giardiose, l'albendazole ne doit être envisagé qu'en cas de

#### CONTRE- INDICATIONS

Hypersensibilité à l'albendazole ou à l'un des composants.

Femme enceinte : C.F. grossesse et allaitement.

#### MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

##### Mises en garde spéciales

En raison de la présence de lactose dans **VERZOL®** 400 mg comprimé, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

##### Précautions particulières d'emploi

Lors du traitement de la trichinellose avec ce médicament une surveillance par un bilan sanguin est préconisée en raison du risque de survenue d'anomalies de la numération formule sanguine et des fonctions hépatiques. Pour favoriser son efficacité dans le traitement des infestations à trichine, le traitement doit être débuté le plus tôt possible au début de l'infestation. En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

##### Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin: lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

##### Allaitement

L'utilisation de ce médicament est déconseillée durant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Généralement bien toléré, **VERZOL®** peut entraîner des effets indésirables, le plus souvent bénins et transitoires.

- Troubles gastro-intestinaux : diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, vertiges, céphalées.
- Lors de traitement prolongé ont été rapportés : fièvre, alopecie réversible, leucopénie, pancytopenie, augmentation des transaminases, rash.

**VERZOL®** 400 mg

1 comprimé



LOT: 20100 PER: 07/2023  
PPV: 20,00 DH

AMM N°277 DMP/21/NNP

Laboratoires **Steripharma**

Z.I Lina n° 347 Sidi Maârouf - Casablanca  
E Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable  
C

..... 400 mg

..... 1 comprimé

soit 400 mg d'albendazole.

..... 400 mg

..... 10 ml

..... soit 400 mg d'albendazole.

قيرزول ®  
البندازول 400 مغ

Cl  
An  
INC عن طريق  
Le  
la fa  
indic  
Trich  
paras

Ibendazole qui est un antiparasitaire de synthèse de **VERZOL®** présente un intérêt tout particulier dans les ostomose, Trichocéphalose, Anguillulose, Giardiose, l'albendazole ne doit être envisagé qu'en cas de

#### CONTRE- INDICATIONS

Hypersensibilité à l'albendazole ou à l'un des composants.

Femme enceinte : C.F. grossesse et allaitement.

#### MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

##### Mises en garde spéciales

En raison de la présence de lactose dans **VERZOL®** 400 mg comprimé, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

##### Précautions particulières d'emploi

Lors du traitement de la trichinellose avec ce médicament une surveillance par un bilan sanguin est préconisée en raison du risque de survenue d'anomalies de la numération formule sanguine et des fonctions hépatiques. Pour favoriser son efficacité dans le traitement des infestations à trichine, le traitement doit être débuté le plus tôt possible au début de l'infestation. En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

##### Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin: lui seul pourra adapter le traitement à votre état.


##### Allaitement

L'utilisation de ce médicament est déconseillée durant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Généralement bien toléré, **VERZOL®** peut entraîner des effets indésirables, le plus souvent bénins et transitoires.

- Troubles gastro-intestinaux : diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, vertiges, céphalées.
- Lors de traitement prolongé ont été rapportés : fièvre, alopecie réversible, leucopénie, pancytopenie, augmentation des transaminases, rash.



3 583310 000146

MB  
alfl

Importateur Exclusif  
**Biocodex Maroc**  
Technopole - Aéroport Mohammed V  
B.P. : 126-Nouaceur-Maroc  
[www.biocodex.ma](http://www.biocodex.ma)

P.P.C. 245,00 DH  
Complément alimentaire, ce n'est pas un  
médicament  
N° DA20181706751DMP / 20UCA / MA v3

1/49/01

**Poids net : 7,5 g**

N° lot :

A consommer de  
préférence avant fin :

29685/02

Q.

Alflorex® est un complément alimentaire contenant *Bifidobacterium infantis*, souche 35624®. Chaque gélule d'Alflorex® contient 1 milliard de bactéries.

### En quoi Alflorex® est-il unique ?

Alflorex® est le seul produit en Europe à contenir la souche 35624®. La souche 35624® a été isolée à partir du tube digestif de personnes saines ; elle a été identifiée et co-développée au cours de 15 années de recherche à Cork (Irlande), par Alimentary Health Ltd. et APC Microbiome Institute qui est l'un des instituts leaders dans le monde pour la santé du tube digestif.

### Conseils d'utilisation :

En complément d'un mode de vie sain, prendre 1 gélule d'Alflorex® chaque jour, pendant 4 semaines. À avaler avec un verre d'eau. Une période d'adaptation transitoire est normale. Il est recommandé de continuer à le prendre régulièrement.

### Dose recommandée :

1 gélule par jour.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Un complément alimentaire ne doit pas se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée.

Tenir hors de la portée des enfants.



Pour garantir des conditions de conservation optimales de la souche 35624®, un bouchon a été spécialement mis au point. Pour ouvrir le tube, rompre la bague de scellage et pousser le bouchon vers le haut. Veiller à bien refermer le bouchon après utilisation.

# Tibéral

Ornidazole

Ornidazole

Anti-infectieux pour traiter la trichomonase, l'ami

Composition

Comprimés : ornidazole 500 mg; excipients par co

Ampoules (3 ml) : ornidazole 500 mg; éthanol 0,9

Forme et présentation pharmaceutique

Comprimés à 500 mg : boîte de 10

Ampoule de 3 ml à 500 mg pour perfusion : boîte

Propriétés, effets

L'absorption de l'ornidazole dans la cellule bactérienne

La réduction de l'ornidazole par la cellule bactérienne part une augmentation de la concentration intracellulaire toxique pour la cellule concernée qui se lie à l'ADN. En ce qui concerne les protozoaires, le mécanisme

Bactéries

Le spectre d'action de l'ornidazole englobe les bactéries anaérobies strictes suivantes :

A : sont sensibles : CMI 0 ≤ 8 mg/l: *Peptostreptococcus spp.*, *Clostridium difficile*, *Clostridium spp.*, *Bacteroides fragilis* ainsi que d'autres *Bacteroides spp.*, insensibles à la bile, *Prevotella spp.*, *Porphyrimonas spp.* et *Fusobacterium spp.*

B : sont résistantes : CMI ≥ 16 mg/l : toutes les bactéries anaérobies et microaérophiles, les actinomycètes, *Propionibacterium spp.* et *Eubacterium spp.* ainsi que les champignons leviglobuliformes.

La sensibilité des bactéries anaérobies peut être déterminée par la méthode de dilution en milieu gélosé ou par microdilution. Pour la réalisation des tests de dilution en série en ce qui concerne les bactéries anaérobies strictes; il est renvoyé au procédé du NCCLS (M100-S3 performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing). Tous les germes à l'égard desquels la CMI est ≥ 8 mg/l peuvent être classés parmi les germes sensibles (d'après Wüst).

Classification Valeur limite (CMI en mg/l)

Sensible (S) ≤ 8

Résistant (R) ≥ 16

Il n'est pas judicieux de déterminer la sensibilité des anaérobies à l'aide de la méthode de diffusion sur gélose.

Protozoaires

Le spectre d'action de l'ornidazole englobe les protozoaires suivants :

Sont sensibles : CMI ≤ 8 mg/l: *Trichomonas vaginalis*, *Entamoeba histolytica*, *Giardia intestinalis*.

Les autres protozoaires sont tous résistants à l'ornidazole.

La détermination de la sensibilité des protozoaires n'est normalement pas effectuée en routine, la technique étant exigeante. L'efficacité in vivo de l'ornidazole à l'égard des protozoaires cités ci-dessus a fait l'objet d'une documentation détaillée.

Il existe une résistance croisée entre l'ornidazole et d'autres nitro-5 imidazolés; on ne connaît pas de résistance croisée avec d'autres substances chimiquement non apparentées.

Il est rare que des bactéries anaérobies soient résistantes à l'ornidazole : une telle résistance n'a été décrite que dans des cas isolés. Plus de 99% des bactéries anaérobies normalement sensibles peuvent toujours être considérées comme sensibles à l'ornidazole.

Indications

Elles procèdent de l'activité antibactérienne et antiparasitaire de l'ornidazole et de ses caractéristiques pharmacocinétiques. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles à donner lieu ce médicament, et de sa place dans l'éventail des produits anti-infectifs actuellement disponibles.

Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles en pharmacodynamie.

Indications générales :

- Traitement curatif des infections médicochirurgicales à germes anaérobies sensibles.

- Traitement préventif des infections à germes anaérobies sensibles lors des interventions chirurgicales comportant un haut risque de survenue de ce type d'infection.

- Amibiases sévères de localisation intestinale ou hépatique (solution injectable 500mg)

Spécifique à la forme comprimé :

- amibiase, qu'elle soit l'expression clinique (amibiases intestinales et extra-intestinales).

- Trichomonases urogénitales.

- Lambiases

- Relais des traitements par voie injectable des infections à germes anaérobies sensibles, à titre curatif ou préventif.

Posologie, mode d'emploi

Les comprimés doivent toujours être pris après les repas. La solution contenue dans les ampoules doit être administrée en perfusion brève, elle doit toujours être diluée avant l'injection. En ce qui concerne la préparation de la solution à perfuser, voir paragraphe 5.

Posologie usuelle

1. Trichomonases

deux schémas thérapeutiques peuvent être recommandés :

Nature du traitement	Dose journalière	
	Adultes et enfants de plus de 35 kg	Enfants jusqu'à 35 kg
a. Traitement par dose unique	3 comprimés le soir	25 mg par kg de poids corporel
b. Traitement de 5 jours	2 comprimés (1 le matin, 1 le soir)	non recommandé

Pour éviter une réinfestation, le partenaire doit toujours être également traité par la même dose orale.

Chez l'enfant, le traitement consiste en l'administration d'une dose unique de 25 mg par Kg de poids corporel et par jour.

2. Amibiase

a. Traitement de 3 jours lors de dysenterie amibiennne.

b. Traitement de 5-10 jours pour toutes les formes d'amibiase.

Durée du Traitement	Dose journalière	
	Adultes et enfants de plus de 35 kg	Enfants jusqu'à 35 kg
a. 3 jours	3 comprimés le soir à prendre en une fois. Au-dessus de 60 kg de poids corporel : 4 comprimés (2 le matin, 2 le soir)	40 mg/kg, à prendre en une fois
b. 5-10 jours	2 comprimés (1 le matin, 1 le soir)	25 mg/kg, à prendre en une fois

c. Traitement de l'abcès amibienn du foie et de dysentérie amibiennne grave.

Adultes: perfuser par voie intraveineuse 500-1000 mg en tant que dose initiale, puis 500 mg toutes les 12 heures pendant 3-6 jours en moyenne.

La posologie pour enfants est de 20-30 mg/kg/jour.

Tibéral® 500 mg



10 comprimés pelliculés



6 118000 280231

LOT : 20055 PER : 03/2025  
PPV : 48,50 DH

# Tibéral

Ornidazole

Ornidazole

Anti-infectieux pour traiter la trichomonase, l'ami

Composition

Comprimés : ornidazole 500 mg; excipients par co

Ampoules (3 ml) : ornidazole 500 mg; éthanol 0,9

Forme et présentation pharmaceutique

Comprimés à 500 mg : boîte de 10

Ampoule de 3 ml à 500 mg pour perfusion : boîte

Propriétés, effets

L'absorption de l'ornidazole dans la cellule bactérienne

La réduction de l'ornidazole par la cellule bactérienne part une augmentation de la concentration intracellulaire toxique pour la cellule concernée qui se lie à l'ADN. En ce qui concerne les protozoaires, le mécanisme

Bactéries

Le spectre d'action de l'ornidazole englobe les bactéries anaérobies strictes suivantes :

A : sont sensibles : CMI 0 ≤ 8 mg/l: *Peptostreptococcus spp.*, *Clostridium difficile*, *Clostridium spp.*, *Bacteroides fragilis* ainsi que d'autres *Bacteroides spp.*, insensibles à la bile, *Prevotella spp.*, *Porphyrimonas spp.* et *Fusobacterium spp.*

B : sont résistantes : CMI ≥ 16 mg/l : toutes les bactéries anaérobies et microaérophiles, les actinomycètes, *Propionibacterium spp.* et *Eubacterium spp.* ainsi que les champignons leviglobuliformes.

La sensibilité des bactéries anaérobies peut être déterminée par la méthode de dilution en milieu gélosé ou par microdilution. Pour la réalisation des tests de dilution en série en ce qui concerne les bactéries anaérobies strictes; il est renvoyé au procédé du NCCLS (M100-S3 performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing). Tous les germes à l'égard desquels la CMI est ≥ 8 mg/l peuvent être classés parmi les germes sensibles (d'après Wüst).

Classification Valeur limite (CMI en mg/l)

Sensible (S) ≤ 8

Résistant (R) ≥ 16

Il n'est pas judicieux de déterminer la sensibilité des anaérobies à l'aide de la méthode de diffusion sur gélose.

Protozoaires

Le spectre d'action de l'ornidazole englobe les protozoaires suivants :

Sont sensibles : CMI ≤ 8 mg/l: *Trichomonas vaginalis*, *Entamoeba histolytica*, *Giardia intestinalis*.

Les autres protozoaires sont tous résistants à l'ornidazole.

La détermination de la sensibilité des protozoaires n'est normalement pas effectuée en routine, la technique étant exigeante. L'efficacité in vivo de l'ornidazole à l'égard des protozoaires cités ci-dessus a fait l'objet d'une documentation détaillée.

Il existe une résistance croisée entre l'ornidazole et d'autres nitro-5 imidazolés; on ne connaît pas de résistance croisée avec d'autres substances chimiquement non apparentées.

Il est rare que des bactéries anaérobies soient résistantes à l'ornidazole : une telle résistance n'a été décrite que dans des cas isolés. Plus de 99% des bactéries anaérobies normalement sensibles peuvent toujours être considérées comme sensibles à l'ornidazole.

Indications

Elles procèdent de l'activité antibactérienne et antiparasitaire de l'ornidazole et de ses caractéristiques pharmacocinétiques. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles à donner lieu ce médicament, et de sa place dans l'éventail des produits anti-infectifs actuellement disponibles.

Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles en pharmacodynamie.

Indications générales :

- Traitement curatif des infections médicochirurgicales à germes anaérobies sensibles.

- Traitement préventif des infections à germes anaérobies sensibles lors des interventions chirurgicales comportant un haut risque de survenue de ce type d'infection.

- Amibiases sévères de localisation intestinale ou hépatique (solution injectable 500mg)

Spécifique à la forme comprimé :

- amibiase, qu'elle soit l'expression clinique (amibiases intestinales et extra-intestinales).

- Trichomonases urogénitales.

- Lambiases

- Relais des traitements par voie injectable des infections à germes anaérobies sensibles, à titre curatif ou préventif.

Posologie, mode d'emploi

Les comprimés doivent toujours être pris après les repas. La solution contenue dans les ampoules doit être administrée en perfusion brève, elle doit toujours être diluée avant l'injection. En ce qui concerne la préparation de la solution à perfuser, voir paragraphe 5.

Posologie usuelle

1. Trichomonases

deux schémas thérapeutiques peuvent être recommandés :

Nature du traitement	Dose journalière	
	Adultes et enfants de plus de 35 kg	Enfants jusqu'à 35 kg
a. Traitement par dose unique	3 comprimés le soir	25 mg par kg de poids corporel
b. Traitement de 5 jours	2 comprimés (1 le matin, 1 le soir)	non recommandé

Pour éviter une réinfestation, le partenaire doit toujours être également traité par la même dose orale.

Chez l'enfant, le traitement consiste en l'administration d'une dose unique de 25 mg par Kg de poids corporel et par jour.

2. Amibiase

a. Traitement de 3 jours lors de dysenterie amibiennne.

b. Traitement de 5-10 jours pour toutes les formes d'amibiase.

Durée du Traitement	Dose journalière	
	Adultes et enfants de plus de 35 kg	Enfants jusqu'à 35 kg
a. 3 jours	3 comprimés le soir à prendre en une fois. Au-dessus de 60 kg de poids corporel : 4 comprimés (2 le matin, 2 le soir)	40 mg/kg, à prendre en une fois
b. 5-10 jours	2 comprimés (1 le matin, 1 le soir)	25 mg/kg, à prendre en une fois

c. Traitement de l'abcès amibienn du foie et de dysentérie amibiennne grave.

Adultes: perfuser par voie intraveineuse 500-1000 mg en tant que dose initiale, puis 500 mg toutes les 12 heures pendant 3-6 jours en moyenne.

La posologie pour enfants est de 20-30 mg/kg/jour.

Tibéral® 500 mg



10 comprimés pelliculés



6 118000 280231

LOT : 20055 PER : 03/2025  
PPV : 48,50 DH

# Myco Hydral

Clotrimaz

Lot N°:

EXP :

PPV:

9 8 9  
2 2 9  
3 3 9

36,00

## Forme et Présentation Pharmaceutique

MycoHydralin® crème 1% : tube de 30 g de crème

## Composition quantitative et qualitative

MycoHydralin® crème 1% : 1 g de crème contient 0,01 g de clotrimazole.

Excipients : Alcool benzyllique, Alcool cétostéarylque, Cetylpalmitate, Polysorbate 60, Stéarate de sorbitan, Octyldodécanol.

## Classe Pharmaco-thérapeutique

Le clotrimazole est un antifongique à large spectre d'action, appartenant aux dérivés imidazolés.

## Indications

Dermatomycoses dues aux dermatophytes, levures ou moisissures telles que :

- Les infections des lèvres vaginales, vulvite candidosique,
- L'inflammation du gland et du prépuce chez le partenaire sexuel due à des levures, exemple balanite candidosique.
- Les mycoses du pied et de la main (tinea pedum, tinea manuum),
- Les mycoses des surfaces et des plis cutanés (tinea corporis, tinea inguinalis),
- Pityriasis versicolor,
- Erythrasma.

## Posologie et Mode d'administration

2 à 3 applications par jour. Un ruban d'un 1/2 cm de long de crème est suffisant pour traiter une surface de la taille de la main. La durée habituelle du traitement est la suivante :

Dermatomycoses : 3-4 semaines

Erythrasma : 2-4 semaines