

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Pathologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

Nº P19- 058170

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9141

Société : RAM

46264

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom :

HAMOTHMAN :

Date de naissance :

13/03/1964


Adresse :

Rue Saint-Omer résidence de l'Aya Jb
2^e étage N° 10 belvédère - Casablanca

Tél. : 0661927788 Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin



Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements suivants confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/09/2020	6		\$ 500,00	Dr. BERRADA SOLTAN Mohamed Hicham Oncologue Diabète - Nutrition - Obésité - Maladies du Sang Dr. BERRADA SOLTAN Mohamed Hicham Oncologue Obésité - Maladies du Sang
18/09/2020	6		460,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

LEVEL BIG WORDS BY RONALD WILSON

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DOCTEUR LATIFA RACHIDI DERRIJ

Diplômée en Echographie de la
Faculté de Montpellier , France

MEDECIN ASSERMENTE PRES DES TRIBUNAUX
MEDECINE GENERALE

10 , Bd GRANDE CEINTURE
HAY MOHAMMEDI
CASABLANCA - TEL . : 0522 60 11 49
AUT N° 4393

الدكتورة لطيفة الراشيدي الدربي

مجازة في الفحص بالصدى
بجامعة مونبولي بفرنسا

طيبة محلفة خبيرة لدى المحاكم
طيبة رئيسية سابقا

الطب العام

مح الحزام الكبير - الحي الحمدي
الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 60 11 49

casablanca, le 31/8/2020

Laure Nade
Elleefelle
Myracle

Dr. RACHIDI DERRIJ L.
Médecin Assermentée
Expert Auprès les Tribunaux
10, Boulevard Grande Ceinture
Hay Mohammedi- Casablanca
Tél: 05 22 60 11 49

الفحص
الأشعة الممagnetique
RADIODIAGNOSTIC AL MOUAHDINE
Dr. Malika MOUSS SENMERI
80 De La Grande Ceinture, Rte. Al Mouahidine
Imm. Yacoub Al Mansour i (RDC) H.M - Casablancc
Tél: 05 22 34 15 36/37-Fax: 05 22 34 15 37

DOCTEUR LATIFA RACHIDI DERRIJ

Diplômée en Echographie de la
Faculté de Montpellier , France

MEDECIN ASSERMENTE PRES DES TRIBUNAUX
MEDECINE GENERALE

10 , Bd GRANDE CEINTURE
HAY MOHAMMEDI
CASABLANCA - TEL . : 0522 60 11 49
AUT N° 4393

الدكتورة لطيفة الراشيدي الدربي

جازة في الفحص بالصدى
جامعة مونبولي بفرنسا

طبيبة محلفة خبيرة لدى المحاكم
طبيبة رئيسية سابقا

الطب العام

مح الحزام الكبير - الحي الحمدي
الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 60 11 49

Le - 9 - 2020

LAH NADA

60.000 ₣

"Eosipex glaucous" 57

l o l

15.30

57

2) Vit C 1 g.

136,30 ₣
صيدلية سكيبة
PHARMACIE SKIBA S.A.R.L A/I
Dr. en pharmacie
98, Av Oued Eddahab, Lamia 9
Tél: 05 22 37 51 22

Dr. RACHIDI DERRIJ L.
Médecin Assermentée
Expert auprès les Tribunaux
10, Boulevard Grande Ceinture
Hay Mohammadi Casablanca
Tél: 05 22 60 11 49

Vita C 1000

(Acide ascorbique)

DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITA C 1000*, Comprimés effervescents : Boîte de 20

VITA C 1000*, Comprimés effervescents : Boîte de 50

VITA C 1000* SANS SUCRE, Comprimés effervescents : Boîte de 20

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre santé. Vous devez toujours prendre ce médicament dans les indications fournies dans cette notice par votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin d'en lire une autre.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que VITA C 1000* Comprimés effervescents et VITA C 1000* SANS SUCRE Comprimés effervescents et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VITA C 1000* Comprimés effervescents et VITA C 1000* SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
3. Comment prendre VITA C 1000* Comprimés effervescents ou VITA C 1000* SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VITA C 1000* Comprimés effervescents et VITA C 1000* SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
6. Informations supplémentaires

1 - QU'EST-CE QUE VITA C 1000* COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000* SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C), NON ASSOCIEE - code ATC : A11GA01.

- Indications thérapeutiques

Ce médicament contient de la vitamine C.

Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE VITA C 1000* COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000* SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre VITA C 1000* comprimés effervescents.

- Ne prenez jamais VITA C 1000* comprimés effervescents ou VITA C 1000* SANS SUCRE comprimés effervescents (Contre-indications)

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
- si vous êtes atteint de phénylcétoneurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam (VITA C 1000* SANS SUCRE comprimés effervescents)
- si vous présentez une insuffisance rénale sévère (défaillance grave des fonctions du rein)
- si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux
- si vous avez des calculs d'oxalate de calcium (hyperoxalurie)
- si vous avez moins de 15 ans

- Faites attention avec VITA C 1000* comprimés effervescents ou VITA C 1000* SANS SUCRE comprimés effervescents (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre VITA C 1000* comprimés effervescents ou VITA C 1000* SANS SUCRE comprimés effervescents.

ITA C 1000

Comprimés effervescents

votre fatigue, compagnie de votre plaisir, raison d'un état de fatigue. Cependant, en continu, il existe des risques de surdosage.

La vitamine C (éthoxychomate), adressez-vous au sujet de précautions.

La vitamine C (éthoxychomate), car des personnes qui ont des globules rouges.

* La vitamine C (éthoxychomate), notamment de votre pharmacien.

• VITA C 1000*

* Ce médicament doit être pris en cours de traitement.

* En raison de la présence d'aspartam chez les patients malabsorbés (maladies hépatiques).

* Ce médicament doit être pris en cours de traitement.

* Ce médicament peut provoquer des effets indésirables.

• VITA C 1000*

* Ce médicament doit être pris en cours de traitement.

* Ce médicament L-aspartam contient des personnes atteintes de malabsorption caractérisée par une mauvaise absorption.

* Ce médicament peut provoquer des effets indésirables.

- Enfants < et adolescents : pas d'effets indésirables.

- Prises d'autre médicament : Informez votre pharmacien. Il pourra vous conseiller les médicaments qui doivent être évités.

- Aliments et boissons : Prendre en cours de traitement.

- Utilisation pendant la grossesse : Si vous êtes enceinte, planifiez une grossesse et prenez ce médicament.

Grossesse : Par mesure de sécurité pendant la grossesse.

Allaitement : La vitamine C passe dans le lait.

Il est préférable de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement.

فيريبلكس 40 ملخ
بروتين سينسيلات الحد



أ، أو استعمال أدوية أخرى:
كنت تأخذ أو أخذت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم
م Solomon عليها دون وصفة طبية آخر طبيب أو الصيدلاني:
سادات حيوية من صنف كينولون و تتراسيكيلين.
و كنت تأخذ أدوية أخرى لعلاج مشاكل العظام(تأخّل العظم) مثل
ليفيوسفونات.

البيبيسيلايام عن عند استعمالها لالتهاب المفاصل(التهاب الميلان)
• القاميبل دويابستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).

• لفودوبا و كارديوبوربا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاش.
• ميكوفينولات موقيبتيل يستعمل الوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة
انخفاض الامتصاص المعي للحديد وكذلك فعالية فيريبلكس 40 ملخ
 محلول لشرب في حالة أخذ مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل
 بين فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن
 ساعتين قبل تناول:

• مضادات المحمورة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من
حموضة المعدة

• كلاروميقينيكول(مضاد حيوي)

• الكواسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط
 الكوليستيرون في الدم.
• أدوية لعلاج القرحة المعوية أو الجزر المعدي الريفي مثل أوميبازول
 لزمبورازول وبانتوبرازول.

مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية:
هذا الدواء قد ينطاخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي
في البراز.

تناول فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات:
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفض امتصاص

الحديد، لذلك من الصوري يجب أخذ فيريبلكس 40 ملخ عن مدة لا تقل
 عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية او عند تناول هذه الأخيرة يجب
الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريبلكس 40 ملخ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات
(البرتقال،الليمون وغيرها) المازاج

الحمل والرضاعة:
إشتهر طبيب أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء
يؤخذ فيريبلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس
 هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات:
لم يلاحظ اي آثار على قدرة السياقة واستعمال الآلات.

معلومات هامة حول فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب:
هذا الدواء يحتوي على سربينول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

الرجاء قراءة هذه النشرة
• حافظ على هذه النشرة.
• إذا كان لديك أي استثناء
من طبيب أو الصيدلاني
هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناول شخصاً آخر أبداً ولو
في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
• في حالة تناول بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير
مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيب أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة:

1. ما هو فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب.
3. كمية استعمال فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله:

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.
فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات
الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج نقر الدم (انخفاض مستوى
هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء)، بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريبلكس 40
ملخ محلول لشرب:
لا يجب تناول فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب في الحالات
التالية:

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سينسيلات
الحديد أو أحد مكوناته هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحديد.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء
هيمرسبيديريفي وداء ترسس الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من إلتهاب البنكرياس(إلتهاب البنكرياس) أو تتشمع
الكليد(مرض كبدى مزمن يتميز بتشكيل أفات ليفية أو "ندوب" في
أنسجة الكبد وغير ينتبه لها وفعاليتها العادلة) بسبب تراكم الحديد.
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيب قبل أن تأخذ هذا الدواء.

فيريبلكس 40 ملخ
بروتين سينسيلات الحد



أ، أو استعمال أدوية أخرى:
كنت تأخذ أو أخذت حديثاً دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم
م Solomon عليها دون وصفة طبية آخر طبيب أو الصيدليات:
سادات حيوية من صنف كينولون و تتراسيكيلين.
و كنت تأخذ أدوية أخرى لعلاج مشاكل العظام(تأخّل العظم) مثل
ليفيوسفونات.

البيبيسيلايام عن عند استعمالها لالتهاب المفاصل(التهاب الميلان)
• القاميبل دويابستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).

• لفودوبا و كارديوبوربا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاش.
• ميكوفينولات موقيبتيل يستعمل الوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة
انخفاض الامتصاص المعي للحديد وكذلك فعالية فيريبلكس 40 ملخ
 محلول لشرب في حالة أخذ مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل
 بين فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول:

• مضادات المحمورة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من
حموضة المعدة

• كلاروميقينيكول(مضاد حيوي)

• الكواسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط
 الكوليستيرون في الدم.
• أدوية لعلاج القرحة المعوية أو الجزر المعدي الريفي مثل أوميبازول
 لزمبورازول وبانتوبرازول.

مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية:
هذا الدواء قد ينطاخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي
في البراز.

تناول فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات:
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفض امتصاص
الحديد، لذلك من الصوري يجب أخذ فيريبلكس 40 ملخ عن مدة لا تقل
عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية او عند تناول هذه الأخيرة يجب
الانتظار ساعتين قبل اخذ فيريبلكس 40 ملخ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات
(البرتقال،الليمون وغيرها) المازاج

الحمل والرضاعة:
إنتشر طبيب أو الصيدليات قبل أخذ أي دواء
يؤخذ فيريبلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس
هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات:
لم يلاحظ اي آثار على قدرة السياقة واستعمال الآلات.

معلومات هامة حول فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب:
هذا الدواء يحتوي على سربينول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات.

الرجاء قراءة هذه النشرة
• حافظ على هذه النشرة.
• إذا كان لديك أي استثناء
من طبيب أو الصيدليات
هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناول شخصاً آخر أبداً ولو
في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
• في حالة تناول بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير
مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيب أو الصيدليات عليه.

فهرس النشرة:

1. ما هو فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل اخذ فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب.
3. كمية استعمال فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله:

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.
فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات
الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج نقر الدم (انخفاض مستوى
هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء)، بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل اخذ فيريبلكس 40
ملخ محلول لشرب:
لا يجب تناول فيريبلكس 40 ملخ محلول لشرب في الحالات
التالية:

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سينسيلات
الحديد أو أحد مكوناته هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحديد.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء
هيمرسبيديريني وداء ترسس الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من إلتهاب البنكرياس(إلتهاب البنكرياس) أو تتشمع
الكليد(مرض كبدى مزمن يتميز بتشكيل أفات ليفية أو "ندوب" في
أنسجة الكبد وغير ينتبه لها وفعاليتها العادلة) بسبب تراكم الحديد.
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيب قبل أن تأخذ هذا الدواء.