

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES À LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ○ Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| ○ Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| ○ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-562810

46275

<input type="checkbox"/> <b>Maladie</b>	<input type="checkbox"/> <b>Dentaire</b>	<input type="checkbox"/> <b>Optique</b>	<input type="checkbox"/> <b>Autres</b>
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule : 1530 Société : RAM			
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	PÉTRANTO
Nom & Prénom : MANSOUR HASSAN			
Date de naissance : 15/05/1951			
Adresse : 32, rue des Bouyoles MARIF EST			
Tél. : 0661466464 Total des frais engagés : ..... Dhs			

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
Date de consultation : 28/09/2020			
Nom et prénom du malade : MANSOUR HASSAN Age : ..... Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Fiancé			
Nature de la maladie : HTA + Diabète + Hypertension			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances : Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous un pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration et déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.  
Fait à : .....  
Signature de l'adhérent(e) : .....



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26/09/2022	Ca		200 HT	INP : INPE : 091191981 

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	28/09/2020	1078,50
	13/10/2020	215,00

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.				
<b>Important :</b> Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.				
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				<b>COEFFICIENT DES TRAVAUX</b> <input type="text"/>
				<b>MONTANTS DES SOINS</b> <input type="text"/>
				<b>DEBUT D'EXECUTION</b> <input type="text"/>
				<b>FIN D'EXECUTION</b> <input type="text"/>
				<b>COEFFICIENT DES TRAVAUX</b> <input type="text"/>
<b>PROT</b>		<b>INITIATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b>		
	6 118001 102006 Levothyrox® 25 µg, Comprimés sécables B/30 PPV: 6,80 DH	7862160335	<b>H</b> 25533412 00000000 21433562 <b>G</b> 00000000 35533411 11433553	7862160335
		<b>[Création, remont, adjoncti</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la		
	6 118001 102020 Levothyrox® 100 µg, Comprimés sécables B/30 PPV: 24,40 DH	7862160342	<b>B</b>	7862160342
<b>VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS</b>				
<b>VISA ET CACHET DU PRATICIEN</b>				

- Ancien médecin Urgentiste Polyclinique  
CNSS Derb Ghallef, Casablanca

- Diplôme Universitaire de Diabétologie  
Faculté de Médecine de MONTPELLIER

- Diplôme Inter-Universitaire Hypertension Artérielle  
Faculté de Médecine de STRASBOURG

- Echographie générale  
- Electrocardiogramme

- طبيبة مستعجلات بمصحة درب غلف المتعددة  
الشخصيات للضمان الاجتماعي سابقا

- دبلوم جامعي في مرض السكري  
كلية الطب مونتيلوي

- دبلوم بين جامعي في مرض ارتفاع ضغط الدم  
كلية الطب ستراسبورغ

- الفحص بالصدى  
- التخطيط الكهربائي للقلب

Casablanca, le : ..... 28/09/2020 الدار البيضاء في :

**MR MANANE HASSAN**

- Vitamine d3 b.o.n. 200 000 ui / ml - solution injectable im et buvable

1 ampoule/mois pendant 3 mois

- Lipistat 20 mg - comprimé enrobé

1 Comprimé, pendant 3 mois

- Ado 500 mg - comprimé pelliculé

1 Comprimé, midi,soir pendant 3 mois

- Laevolac 0,5 - solution buvable

1 cuillere matin, midi, soir, pendant 6 jours

- Anti-spa 200 mg - comprimé pelliculé

1 Comprimé, matin, soir, pendant 7 JOURS

- Acticarbine 70 mg - comprimé dragéifié

2 comprime matin midi,soir pendant 7 jours

- Hytacand 16 mg/12,5 - comprimé

2 Comprimé, matin, pendant 3 mois

- Levothyrox 100 µg - comprimé sécable

1 comprime le matin pendant 3 mois

**LOT : 3111**  
**PER : 08 - 23**  
**P.P.V : 17 DH 50**

**LOT : 3111**  
**PER : 08 - 23**  
**P.P.V : 17 DH 50**

**LOT : 3111**  
**PER : 08 - 23**  
**P.P.V : 17 DH 50**

**LOT : 3111**  
**PER : 08 - 23**  
**P.P.V : 17 DH 50**

# ACTICARBINE comprimé enrobé

## Charbon activé / papavérine (chlorhydrate de)

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, contactez votre médecin.

• Si vous remarquez des effets indésirables lors de cette notice, ou si vous ressentez un des symptômes comme étant grave, veuillez en informer votre pharmacien.

### 1. QU'EST-CE QUE ACTICARBINE comprimé QUELLES CAS EST-IL UTILISÉ?

Adsorbant intestinal. Antispasmodique (A : a métabolisme). Il est indiqué chez l'adulte dans digestions difficiles notamment avec ballonnement

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE ACTICARBINE comprimé enrobé?

Ne prenez jamais ACTICARBINE comprimé enrobé si vous êtes allergique congue à l'un des constitutifs.

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS être pris contre de votre médecin, pendant la grossesse. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### Précautions d'emploi

- En cas de ballonnement, flatulences, éviter les légumes secs (lentilles, flageolets, pois...) certains légumes verts (choux, choux de Bruxelles, bettes, ...)
- En cas de diarrhées associées, il est nécessaire de :
  - se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres)
  - s'allonger le temps de la diarrhée,
- en excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacées.
- en privilégiant les viandes grillées, le riz.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

#### Interactions avec d'autres médicaments

Ce médicament pouvant diminuer l'absorption d'autres médicaments, ceux-ci doivent être administrés à distance (plus de 2 heures, si possible).

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS NOCIVES ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS. SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT TRAITEMENT EN COURS.

#### Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin, lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

#### Allaitement

La prise de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement. D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence dus à la présence de papavérine.

### 3. COMMENT PRENDRE ACTICARBINE comprimé enrobé?

Posologie : réservé à l'adulte.

1 à 2 comprimés avant les 3 repas, à avaler tels quels avec un verre d'eau.

فحم مشط



EXP : 12/2024  
3406954312908

ACTICARBINE 70 MG Comp. (84)  
PPV 46.90 DH SOTHEMA



6118001 070015

Ne prenez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### 5. COMMENT CONSERVER ACTICARBINE comprimé enrobé?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ACTICARBINE comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de conditions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Substances actives :** charbon activé : 70 mg, chlorhydrate de papavérine : 14 mg pour un comprimé enrobé.

**Autres composants :** acide alginique, saccharose, amidon de maïs, glucose liquide, polyéthylène glycol 6000, stéarate de magnésium, gomme laque blanche, talc, gomme arabique, dioxyde de titane, cire de carnauba.

Ce médicament se présente sous forme de comprimés enrobés. Boîte de 42 ou 84.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**Fabricant :** Laboratoire AJC PHARMA,  
16120 Châteauneuf-sur-Charente – France

**Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché en France :** Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE,  
181 - 183, rue André Karman, 93300 Aubervilliers – France

**Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché et distributeur au Maroc :** Laboratoires SOTHEMA B.P. N° 1 - 27182 Bouskoura – Maroc.

**Conditions de délivrance du médicament :** Médicament non soumis à prescription médicale.

**Date d'approbation de la notice :** 20 septembre 2013. 160002

**Grossesse et allaitement**  
Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Prise ou utilisation d'autres médicaments  
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolerance au galactose, un déficit en lactase ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies heréditaires rares).

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolerance pharmacien.

**Ne prenez jamais ANTISPA 200 mg, comprenez pourquoi:** Allergie à l'un des constituants et chez l'enfant de moins de 6 ans en raison du risque de cassure route (avaler le travers).

ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?  
SI vous prenez ce médicament, il est recommandé de prendre ce médicament.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE

Ce médiamente est un anti-spasmodique musculotrope. Il est indiqué dans les douleurs spasmodiques du tube digestif et des voies biliaires et l'inconfort intestinal.

**EST-IL UTILISÉ ?** ANTI-SPASMODIQUE MUSCULOTROPE  
**A. AU-EST-CE QUE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ET DANS QUELS CAS**

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS ?  
5. COMMENT CONSÉRVER ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?  
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**EST-IL UTILISE ?** 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE  
**ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?**

Dans cette notice :

Ce médicament vous a été prescrit personnellement. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à  
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

LOT 200283-1

02 2022  
40.00

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# HYTACAND® 8mg/12,5mg, comprimé

# HYTACAND® 16mg/12,5mg, comprimé

candésartan cilexétol/hydrochlorthiazide



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interroger votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que HYTACAND®, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HYTACAND®, comprimé ?
3. Comment prendre HYTACAND®, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HYTACAND®, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### QU'EST-CE QUE HYTACAND, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le nom de votre médicament est HYTACAND. Il est utilisé pour traiter la pression artérielle élevée (hypertension artérielle) chez les patients adultes.

Il contient deux substances actives : le candésartan cilexétol et l'hydrochlorthiazide. Ces deux substances contribuent à la réduction de la pression artérielle.

- Le candésartan cilexétol appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. Il entraîne un relâchement et un élargissement des vaisseaux sanguins, ce qui contribue à diminuer la pression artérielle.
- L'hydrochlorthiazide appartient à un groupe de médicaments appelé diurétiques.

Il aide votre corps à se débarrasser de l'eau et des sels tels que le sodium dans vos urines, ce qui contribue à diminuer la pression artérielle.

Votre médecin pourra vous prescrire HYTACAND si votre pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le candésartan cilexétol ou l'hydrochlorthiazide administrés seuls.

### QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE HYTACAND, comprimé ?

Ne prenez jamais HYTACAND, comprimé :

- si vous êtes allergique au candésartan cilexétol ou l'hydrochlorthiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique aux sulfamides. Si vous n'êtes pas sûr que cela vous concerne, demandez à votre médecin.
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre HYTACAND en début de grossesse) (voir rubrique « Grossesse »).
- si vous avez de graves problèmes rénaux.
- si vous souffrez d'une maladie sévère du foie ou d'une cholestase (problème d'obstruction des voies biliaires qui empêche la bile de sortir de la vésicule biliaire).
- si vous avez de manière persistante de faibles taux de potassium dans le sang.
- si vous avez de manière persistante des taux élevés de calcium dans le sang.

- si vous avez déjà eu une crise
- si vous avez du diabète ou une maladie qui vous êtes traité(e) par un médicament nommé aliskiren pour diminuer votre pression artérielle.

Si vous n'êtes pas certain(e) que ce médicament vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre HYTACAND.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre HYTACAND :

- si vous êtes diabétique.
- si vous avez des problèmes cardiaques, hépatiques ou rénaux.
- si vous avez récemment subi une transplantation rénale.
- si vous avez des vomissements, que vous avez récemment eu des vomissements importants ou si vous avez de la diarrhée.
- si vous souffrez d'une maladie de la glande surrénale appelée syndrome de Conn (ou aussi appelé hyperaldostéronisme primaire).
- si vous avez déjà eu une maladie appelée le lupus érythémateux disséminé (LED)
- si votre pression artérielle est basse.
- si vous avez déjà eu un accident vasculaire cérébral.
- si vous avez déjà eu une allergie ou de l'asthme.
- vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

HYTACAND est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique Grossesse).

- si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :
  - un « inhibiteur » de l'enzyme de conversion (IEC) » (par exemple énalapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux dus à un diabète.
  - aliskiren.

Votre médecin pourra être amené à surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression artérielle, et le taux des électrolytes (par ex. du potassium) dans votre sang.

Voir aussi les informations dans la rubrique « Ne prenez jamais HYTACAND » .

Il est possible que votre médecin veuille vous voir plus souvent et réaliser certains examens si vous souffrez de l'une de ces pathologies.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre médecin ou votre dentiste que vous prenez HYTACAND. En effet, associé à certains médicaments anesthésiques, HYTACAND peut provoquer une baisse excessive de votre pression artérielle.

HYTACAND peut augmenter la sensibilité de votre peau au soleil.

### Enfants

Il n'y pas d'expérience concernant l'administration de HYTACAND chez les enfants (de moins de 18 ans).

HYTACAND ne doit donc pas être utilisé chez les enfants.

### Autres médicaments et HYTACAND, comprimé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. HYTACAND peut modifier l'action d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur l'action de HYTACAND. Si vous prenez certains médicaments, votre médecin pourrait avoir besoin de réaliser des examens sanguins de temps en temps.

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# HYTACAND® 8mg/12,5mg, comprimé

# HYTACAND® 16mg/12,5mg, comprimé

candésartan cilexétol/hydrochlorthiazide



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interroger votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que HYTACAND®, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HYTACAND®, comprimé ?
- Comment prendre HYTACAND®, comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver HYTACAND®, comprimé ?
- Contenu de l'emballage et autres informations

### QU'EST-CE QUE HYTACAND, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le nom de votre médicament est HYTACAND. Il est utilisé pour traiter la pression artérielle élevée (hypertension artérielle) chez les patients adultes.

Il contient deux substances actives : le candésartan cilexétol et l'hydrochlorthiazide. Ces deux substances contribuent à la réduction de la pression artérielle.

- Le candésartan cilexétol appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. Il entraîne un relâchement et un élargissement des vaisseaux sanguins, ce qui contribue à diminuer la pression artérielle.
- L'hydrochlorthiazide appartient à un groupe de médicaments appelé diurétiques.

Il aide votre corps à se débarrasser de l'eau et des sels tels que le sodium dans vos urines, ce qui contribue à diminuer la pression artérielle.

Votre médecin pourra vous prescrire HYTACAND si votre pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le candésartan cilexétol ou l'hydrochlorthiazide administrés seuls.

### QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE HYTACAND, comprimé ?

Ne prenez jamais HYTACAND, comprimé :

- si vous êtes allergique au candésartan cilexétol ou l'hydrochlorthiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique aux sulfamides. Si vous n'êtes pas sûr que cela vous concerne, demandez à votre médecin.
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre HYTACAND en début de grossesse) (voir rubrique « Grossesse »).
- si vous avez de graves problèmes rénaux.
- si vous souffrez d'une maladie sévère du foie ou d'une cholestase (problème d'obstruction des voies biliaires qui empêche la bile de sortir de la vésicule biliaire).
- si vous avez de manière persistante de faibles taux de potassium dans le sang.
- si vous avez de manière persistante des taux élevés de calcium dans le sang.

- si vous avez déjà eu une crise
- si vous avez du diabète ou une maladie qui vous êtes traité(e) par un inhibiteur de l'aliskiren pour diminuer votre pression artérielle.

Si vous n'êtes pas certain(e) que ce médicament vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre HYTACAND.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre HYTACAND :

- si vous êtes diabétique.
- si vous avez des problèmes cardiaques, hépatiques ou rénaux.
- si vous avez récemment subi une transplantation rénale.
- si vous avez des vomissements, que vous avez récemment eu des vomissements importants ou si vous avez de la diarrhée.
- si vous souffrez d'une maladie de la glande surrénale appelée syndrome de Conn (ou aussi appelé hyperaldostéronisme primaire).
- si vous avez déjà eu une maladie appelée le lupus érythémateux disséminé (LED)
- si votre pression artérielle est basse.
- si vous avez déjà eu un accident vasculaire cérébral.
- si vous avez déjà eu une allergie ou de l'asthme.
- vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

HYTACAND est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique Grossesse).

- si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :
  - un « inhibiteur » de l'enzyme de conversion (IEC) » (par exemple énalapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux dus à un diabète.
  - aliskiren.

Votre médecin pourra être amené à surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression artérielle, et le taux des électrolytes (par ex. du potassium) dans votre sang.

Voir aussi les informations dans la rubrique « Ne prenez jamais HYTACAND » .

Il est possible que votre médecin veuille vous voir plus souvent et réaliser certains examens si vous souffrez de l'une de ces pathologies.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre médecin ou votre dentiste que vous prenez HYTACAND. En effet, associé à certains médicaments anesthésiques, HYTACAND peut provoquer une baisse excessive de votre pression artérielle.

HYTACAND peut augmenter la sensibilité de votre peau au soleil.

### Enfants

Il n'y pas d'expérience concernant l'administration de HYTACAND chez les enfants (de moins de 18 ans).

HYTACAND ne doit donc pas être utilisé chez les enfants.

### Autres médicaments et HYTACAND, comprimé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. HYTACAND peut modifier l'action d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur l'action de HYTACAND. Si vous prenez certains médicaments, votre médecin pourrait avoir besoin de réaliser des examens sanguins de temps en temps.

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# HYTACAND® 8mg/12,5mg, comprimé

# HYTACAND® 16mg/12,5mg, comprimé

candésartan cilexétol/hydrochlorthiazide



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interroger votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que HYTACAND®, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HYTACAND®, comprimé ?
3. Comment prendre HYTACAND®, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HYTACAND®, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### QU'EST-CE QUE HYTACAND, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le nom de votre médicament est HYTACAND. Il est utilisé pour traiter la pression artérielle élevée (hypertension artérielle) chez les patients adultes.

Il contient deux substances actives : le candésartan cilexétol et l'hydrochlorthiazide. Ces deux substances contribuent à la réduction de la pression artérielle.

- Le candésartan cilexétol appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. Il entraîne un relâchement et un élargissement des vaisseaux sanguins, ce qui contribue à diminuer la pression artérielle.
- L'hydrochlorthiazide appartient à un groupe de médicaments appelé diurétiques.

Il aide votre corps à se débarrasser de l'eau et des sels tels que le sodium dans vos urines, ce qui contribue à diminuer la pression artérielle.

Votre médecin pourra vous prescrire HYTACAND si votre pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le candésartan cilexétol ou l'hydrochlorthiazide administrés seuls.

### QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE HYTACAND, comprimé ?

Ne prenez jamais HYTACAND, comprimé :

- si vous êtes allergique au candésartan cilexétol ou l'hydrochlorthiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique aux sulfamides. Si vous n'êtes pas sûr que cela vous concerne, demandez à votre médecin.
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre HYTACAND en début de grossesse) (voir rubrique « Grossesse »).
- si vous avez de graves problèmes rénaux.
- si vous souffrez d'une maladie sévère du foie ou d'une cholestase (problème d'obstruction des voies biliaires qui empêche la bile de sortir de la vésicule biliaire).
- si vous avez de manière persistante de faibles taux de potassium dans le sang.
- si vous avez de manière persistante des taux élevés de calcium dans le sang.

- si vous avez déjà eu une crise
- si vous avez du diabète ou une maladie qui vous êtes traité(e) par un médicament nommé aliskiren pour diminuer votre pression artérielle.

Si vous n'êtes pas certain(e) que ce médicament vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre HYTACAND.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre HYTACAND :

- si vous êtes diabétique.
- si vous avez des problèmes cardiaques, hépatiques ou rénaux.
- si vous avez récemment subi une transplantation rénale.
- si vous avez des vomissements, que vous avez récemment eu des vomissements importants ou si vous avez de la diarrhée.
- si vous souffrez d'une maladie de la glande surrénale appelée syndrome de Conn (ou aussi appelé hyperaldostéronisme primaire).
- si vous avez déjà eu une maladie appelée le lupus érythémateux disséminé (LED)
- si votre pression artérielle est basse.
- si vous avez déjà eu un accident vasculaire cérébral.
- si vous avez déjà eu une allergie ou de l'asthme.
- vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

HYTACAND est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique Grossesse).

- si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :
  - un « inhibiteur » de l'enzyme de conversion (IEC) » (par exemple énalapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux dus à un diabète.
  - aliskiren.

Votre médecin pourra être amené à surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression artérielle, et le taux des électrolytes (par ex. du potassium) dans votre sang.

Voir aussi les informations dans la rubrique « Ne prenez jamais HYTACAND » .

Il est possible que votre médecin veuille vous voir plus souvent et réaliser certains examens si vous souffrez de l'une de ces pathologies.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre médecin ou votre dentiste que vous prenez HYTACAND. En effet, associé à certains médicaments anesthésiques, HYTACAND peut provoquer une baisse excessive de votre pression artérielle.

HYTACAND peut augmenter la sensibilité de votre peau au soleil.

### Enfants

Il n'y pas d'expérience concernant l'administration de HYTACAND chez les enfants (de moins de 18 ans).

HYTACAND ne doit donc pas être utilisé chez les enfants.

### Autres médicaments et HYTACAND, comprimé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. HYTACAND peut modifier l'action d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur l'action de HYTACAND. Si vous prenez certains médicaments, votre médecin pourrait avoir besoin de réaliser des examens sanguins de temps en temps.

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# HYTACAND® 8mg/12,5mg, comprimé

# HYTACAND® 16mg/12,5mg, comprimé

candésartan cilexétol/hydrochlorthiazide



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interroger votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que HYTACAND®, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HYTACAND®, comprimé ?
3. Comment prendre HYTACAND®, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HYTACAND®, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### QU'EST-CE QUE HYTACAND, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le nom de votre médicament est HYTACAND. Il est utilisé pour traiter la pression artérielle élevée (hypertension artérielle) chez les patients adultes.

Il contient deux substances actives : le candésartan cilexétol et l'hydrochlorthiazide. Ces deux substances contribuent à la réduction de la pression artérielle.

- Le candésartan cilexétol appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. Il entraîne un relâchement et un élargissement des vaisseaux sanguins, ce qui contribue à diminuer la pression artérielle.
- L'hydrochlorthiazide appartient à un groupe de médicaments appelé diurétiques.

Il aide votre corps à se débarrasser de l'eau et des sels tels que le sodium dans vos urines, ce qui contribue à diminuer la pression artérielle.

Votre médecin pourra vous prescrire HYTACAND si votre pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le candésartan cilexétol ou l'hydrochlorthiazide administrés seuls.

### QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE HYTACAND, comprimé ?

Ne prenez jamais HYTACAND, comprimé :

- si vous êtes allergique au candésartan cilexétol ou l'hydrochlorthiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique aux sulfamides. Si vous n'êtes pas sûr que cela vous concerne, demandez à votre médecin.
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre HYTACAND en début de grossesse) (voir rubrique « Grossesse »).
- si vous avez de graves problèmes rénaux.
- si vous souffrez d'une maladie sévère du foie ou d'une cholestase (problème d'obstruction des voies biliaires qui empêche la bile de sortir de la vésicule biliaire).
- si vous avez de manière persistante de faibles taux de potassium dans le sang.
- si vous avez de manière persistante des taux élevés de calcium dans le sang.

- si vous avez déjà eu une crise
- si vous avez du diabète ou une maladie qui vous êtes traité(e) par un médicament nommé aliskiren pour diminuer votre pression artérielle.

Si vous n'êtes pas certain(e) que ce médicament vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre HYTACAND.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre HYTACAND :

- si vous êtes diabétique.
- si vous avez des problèmes cardiaques, hépatiques ou rénaux.
- si vous avez récemment subi une transplantation rénale.
- si vous avez des vomissements, que vous avez récemment eu des vomissements importants ou si vous avez de la diarrhée.
- si vous souffrez d'une maladie de la glande surrénale appelée syndrome de Conn (ou aussi appelé hyperaldostéronisme primaire).
- si vous avez déjà eu une maladie appelée le lupus érythémateux disséminé (LED)
- si votre pression artérielle est basse.
- si vous avez déjà eu un accident vasculaire cérébral.
- si vous avez déjà eu une allergie ou de l'asthme.
- vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

HYTACAND est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique Grossesse).

- si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :
  - un « inhibiteur » de l'enzyme de conversion (IEC) » (par exemple énalapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux dus à un diabète.
  - aliskiren.

Votre médecin pourra être amené à surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression artérielle, et le taux des électrolytes (par ex. du potassium) dans votre sang.

Voir aussi les informations dans la rubrique « Ne prenez jamais HYTACAND » .

Il est possible que votre médecin veuille vous voir plus souvent et réaliser certains examens si vous souffrez de l'une de ces pathologies.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre médecin ou votre dentiste que vous prenez HYTACAND. En effet, associé à certains médicaments anesthésiques, HYTACAND peut provoquer une baisse excessive de votre pression artérielle.

HYTACAND peut augmenter la sensibilité de votre peau au soleil.

### Enfants

Il n'y pas d'expérience concernant l'administration de HYTACAND chez les enfants (de moins de 18 ans).

HYTACAND ne doit donc pas être utilisé chez les enfants.

### Autres médicaments et HYTACAND, comprimé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. HYTACAND peut modifier l'action d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur l'action de HYTACAND. Si vous prenez certains médicaments, votre médecin pourrait avoir besoin de réaliser des examens sanguins de temps en temps.

ITT

Fabriqué par :

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED  
Village Gangwala, Tehsil Paonta Sahib,  
Distt. Sirmour - 173 025, Himachal Pradesh, Inde

Importé par :

SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC  
169, Avenue Hassan 1er, 20070, Casablanca

PPV:215DH00

CODE No.: HP/DRUGS/MNB/95/2

Dr Loubna KABBAJ

Médecine générale

- Hommes - Enfants

Médecin Urgentiste Polyclinique

55 Ghallet, Casablanca

Universitaire de Diabétologie

de Médecine de MONTPELLIER

Inter-Universitaire Hypertension Artérielle

de Médecine de STRASBOURG

phie générale

ordogramme

الدكتورة لبني قباج

الطب العام

نساء - رجال - أطفال

طبيبة مستعملات مصححة درب غلف المتعددة

الشخصيات للضمائر الإجتماعية سابقا

دبلوم جامعي في مرض السكري

كلية الطب مونبيلي

دبلوم بين جامعي في مرض ارتفاع ضغط الدم

كلية الطب ستراسبورغ

لشخص بالحصى

تخطيط الكهربائي للقلب

Casablanca, le : ..... 15/10/2020 .....  
الدار البيضاء، في :

MR MANANE HASSAN

- Raciper 40 mg - comprimé  
1 Comprimé, matin, pendant 1 mois

215,00



شارع عبد الحميد شناعة، شارع الولاء، الدار البيضاء، المغرب