

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles


0 Réclamation : contact@mupras.com
 0 Prise en charge : pec@mupras.com
 0 Adhésion et changement de statut : adhésion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-562334


46281

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule :	4760	Société :	RAT
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input checked="" type="checkbox"/> Autre :	Retraite
Nom & Prénom : Belouit Djalma			
Date de naissance : 21/11/1953			
Adresse : 10 passage el Farabi hay Yassine Benhassan			
Tél. :	0663180297	Total des frais engagés : 0 Dhs	

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin : 			
Date de consultation : 12/10/2020			
Nom et prénom du malade : Belouit Djalma Age : 1999			
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Nature de la maladie : Personne			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances : MUPRAS			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Benrechid

Signature de l'adhérent(e) : 

5 NOV 2020

ACCUEIL

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE YASMINA 77 RUE IBNOU NAFIS HAY Yasmina Berrechid Tél.: 05 22 53 31 88	17/10/2020	158,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur JAHID Salah

الدكتور جاهد حالع

Medecine Générale

الطب العام

Expert Assermenté

خبير ملحق لدى المحاكم

Près des tribunaux

Tissir ! Bd Hassan II N° 106

حي التسier شارع الحسن الثاني الرقم 106

BERRECHID

برشيد

GSM : 0664097159

المحمول : 0664097159

BERRECHID Le : ١٧-٦-٢٩ برشيد في :

Bellouchi 28m en

87,90

éco clair ١١

✓
15

15,30

21

✓
15

15,80

٢١

✓
15

Dol. Fe 1m -

39,20

rhumatism

✓
15

158,20

Dr JAHID SALAH
Medecine Générale
Expert Assermenté
106 Bd Hassan II Berrechid
Casablanca

PHARMACIE YASMINA
IBNOU NAFIS
77 RUE
Berrechid
Casablanca
Tél. 05 22 53 31 88

ECOCLEAV® 1 g/125 mg

ECOCLEAV® 500 mg/62,5 m

Antocicline/Acide clavulannique

Poudre pour suspension buvable en sachet-dose

Boîtes de 12, 16 et 24 sachets

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes !

• Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra être mortel, même si les symptômes sont identiques aux vôtres.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous ne pouvez pas le tolérer, n'attendez pas, contactez immédiatement ou contactez votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Ecoclev et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Ecoclev ?

3. Comment utiliser Ecoclev ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver Ecoclev ?

6. Informations supplémentaires.

1. Qu'est-ce que Ecoclev et dans quels cas est-il utilisé ?

Ecoclev est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il

contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulannique.

L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "défensifs".

Elle peut empêcher les bactéries d'agir (action bactéricide), empêcher cette inactivation.

Ecoclev est utilisé chez l'adulte et chez l'enfant pour traiter les infections

suivantes :

• infections de l'oreille moyenne et des sinus,

• infections des voies respiratoires,

• infections des tissus mous, incluant les infections dentaires,

• infections des os et des articulations.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Ecoclev ?

Ecoclev est utilisé chez l'adulte et chez l'enfant pour traiter les infections

suivantes :

• infections de l'oreille moyenne et des sinus,

• infections des voies respiratoires,

• infections des tissus mous, incluant les infections dentaires,

• infections des os et des articulations.

3. Comment utiliser Ecoclev ?

Ecoclev est utilisé chez l'adulte et chez l'enfant pour traiter les infections

suivantes :

• infections de l'oreille moyenne et des sinus,

• infections des voies respiratoires,

• infections des tissus mous, incluant les infections dentaires,

• infections des os et des articulations.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulannique,

à la pénicilline ou à un des autres composants contenus dans Ecoclev.

• Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (hypersensibilité) à

un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement

du visage, du cou ou du

• Si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un icère

(épannissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

Ne prenez pas Ecoclev si vous êtes dans l'une des situations

mentionnées ci-dessous.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

sachez-dose :

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

5. Informations supplémentaires.

En cas de problème avec Ecoclev, contactez immédiatement ou contactez votre pharmacien.

6. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

7. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

8. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

9. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

10. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

11. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

12. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

13. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

14. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

15. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

16. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

17. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

18. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

19. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

20. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

21. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

22. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

23. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

24. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

25. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

26. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

27. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

28. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

29. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

30. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

31. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

32. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

33. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

34. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

35. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

36. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

37. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

38. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

39. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

40. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

41. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

42. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

43. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

44. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

45. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

46. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

47. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

48. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

49. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

50. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

51. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

52. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

53. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

54. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

55. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

56. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

57. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

58. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

59. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

60. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

61. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

62. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

63. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

64. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

65. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

66. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

67. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

68. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

69. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

70. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

71. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

72. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

73. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

74. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

75. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

76. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

77. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

78. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

79. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

80. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

81. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

82. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

83. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

84. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

85. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

86. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

87. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

88. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

89. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

90. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

91. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

92. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

93. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

94. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

95. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

96. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

97. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

98. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

99. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

100. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

101. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

102. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

103. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

104. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

105. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

106. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

107. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

108. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

109. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

110. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

111. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

112. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

113. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

114. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

115. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

116. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

117. Informations supplémentaires.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre Ecoclev.

<b

Vita C 1000®

(Acide ascorbique)

DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITA C 1000®, Comprimés effervescents : Boîte de 10

VITA C 1000®, Comprimés effervescents : Boîte de 20 (2 tubes de 10)

VITA C 1000® SANS SUCRE, Comprimés effervescents : Boîte de 10

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.

- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
3. Comment prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
6. Informations supplémentaires

1 - QU'EST-CE QUE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C), NON ASSOCIEE - code ATC : A11GA01.

- Indications thérapeutiques

Ce médicament contient de la vitamine C.

Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents.

- Ne prenez jamais VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Contre-indications)

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
- si vous êtes atteint de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam (VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents)
- si vous présentez une insuffisance rénale sévère (défaillance grave des fonctions du rein)
- si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux
- si vous avez des calculs d'oxalate de calcium (hyperoxalurie)
- si vous avez moins de 15 ans

- Faites attention avec VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents.

- VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents et VITA C 1000® comprimés effervescents

• Si votre fatigue s'accroît ou persiste après 1 mois de traitement ou si elle s'accompagne de manifestations inhabituelles, prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

• En raison d'un effet légèrement stimulant, il est souhaitable de ne pas prendre la vitamine C en fin de journée.

• Prendre en compte les apports en vitamines et minéraux issus d'autres sources, comme les médicaments, les aliments enrichis et les compléments alimentaires (risque de surdosage).

• La vitamine C augmente l'absorption du fer par votre organisme. En cas d'hémochromatose (maladie héréditaire se caractérisant par une surcharge en fer), adressez-vous à votre médecin car l'utilisation de ce médicament doit faire l'objet de précautions strictes.

• La vitamine C doit être utilisée avec prudence en cas de déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées en vitamine C (supérieure à 1 gramme par jour) favorisent le risque d'apparition d'une anémie hémolytique (déstruction des globules rouges).

• La vitamine C peut fausser les résultats de certaines analyses biologiques, notamment de tests de contrôle du glucose sanguin et urinaire, avertissez votre médecin si des tests sont prévus.

- VITA C 1000® comprimés effervescents

• Ce médicament contient 307 mg de sodium par comprimé effervescents. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

• En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne peut être administré chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

• Ce médicament contient 441,5 mg de saccharose par comprimé effervescents dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

• Ce médicament contient un agent colorant azoïque (Jaune orange 5 E110) et peut provoquer des réactions allergiques.

- VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents

• Ce médicament contient 377,3 mg de sodium par comprimé effervescents. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

• Ce médicament contient 2,24 mg d'aspartam par comprimé effervescents. L'aspartam contient une source de phénylalanine. Peut être dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.

• Ce médicament contient un agent colorant azoïque (Jaune orange 5 E110) et peut provoquer des réactions allergiques.

- Enfants et adolescents

Sans objet.

- Prises d'autres médicaments

Votre médecin pourra vous conseiller de prendre tout à la fois. Ce médicament contient des éléments qui peuvent interférer avec les autres médicaments.

- Aliments et boissons

Prendre en compte les aliments enrichis et des compléments alimentaires.

- Utilisation pendant la grossesse

Si vous êtes enceinte ou si vous planifiez une grossesse, demandez de prendre ce médicament.

- Grossesse

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de la vitamine C pendant la grossesse.

- Allaitement

La vitamine C passe dans le lait maternel. Il n'existe pas de données suffisantes sur les effets de la vitamine C chez les nouveau-nés/nourrissons. Par conséquent, il est préférable d'éviter l'utilisation de la vitamine C, pendant l'allaitement.

Vita C 1000®

LOT 0203110
EXP 09/2023
PPN 15DH30

Indications
Pris ou
d'acides en
les mixtales

sont
les aliments

centre ou
ou pharmacie avant

ce

Doliprane®

1000 mg comprimé effervescent sécable
PARACÉTAMOL

Veuillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations importantes pour vous. Ce médicament est disponible sans ordonnance et vous permet donc de soigner des maladies bénignes sans l'aide d'un médecin. Néanmoins, vous devez utiliser Doliprane 1000 mg, comprimé effervescent avec précaution afin d'en obtenir le meilleur résultat. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez vous à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.

La substance active est : paracétamol 1000 mg pour un comprimé effervescent sécable. Les autres composants sont : acide citrique anhydre, mannitol, saccharine sodique, laurylsulfate de sodium, povidone K90, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium anhydre, leucine, arôme orange.

Teneur en sodium : 408 mg par comprimé.

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleurs et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.

Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT.

Contre-indications

Ne pas prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol,
- maladie grave du foie,
- enfants de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT

Précautions particulières

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.
- En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sodium : 408 mg par comprimé.
- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde


En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, demandez conseil à votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments contiennent également du paracétamol. Il est donc important de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

Grossesse et allaitement

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.



Rhinat[®]

Carbocisteïne

sirop

Veuillez lire attentivement

- Gardez cette notice, vo

- Si vous avez d'autres q

médecin ou à votre phar

ce médicament vous a é

10.1.196001

PER.07.2022

it prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, cela pourrait lui être nocif.



SANOFI



1% Adultes expectorant

déficit en sucrase isomaltase (maladies métaboliques rares).

c) Précautions d'emploi :

Ce médicament doit toujours être accompagné d'efforts volontaires de toux, permettant l'expectoration.

Ne pas prendre de médicament antitussif (destiné à calmer la toux) ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par la carbocisteïne.

En cas de diabète ou de régime hypoglycidiique (pauvre en sucre), tenir compte de la teneur en sucre (6 g par cuillère à soupe).

En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte de la teneur en sodium (97 mg par cuillère à soupe).

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Tenir compte de la présence d'alcool.

Ce médicament contient de la carbocisteïne. D'autres médicaments en contiennent ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).

a) Dénomination :
RHINATHIOL 5% ADULTES EXPECTORANT, sirop.

b) Composition :
CARBOCISTEÏNE 5 g.
Excipients : saccharose, méthyle parahydroxybenzoate (E 218), colorant caramel aromatique, huile essentielle de cannelle, elixir purificateur, hydroxyde de sodium, eau purifiée q.s.p 100 ml

1 cuillère à soupe (15 ml) contient 750 mg de carbocisteïne, 6 g de saccharose, 0,2 g d'éthanol et 97 mg de sodium.

Titre alcoolique (V/V) : 1,64°.

Sirop, flacons de 125 ml et 200 ml.

d) Classe pharmaco-thérapeutique :
MUCOLYTIQUE

(R : Système respiratoire).

2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

ATTENTION : LE TITRE ALCOOLIQUE DE CE MEDICAMENT EST DE 1,64° SOIT 0,2 GRAMME D'ALCOOL PAR CUILLERE A SOUPE.

Ce médicament est indiqué chez l'adulte (plus de 15 ans) en cas d'affection respiratoire récente avec difficulté d'expectoration (difficulté à rejetter en crachant) les sécrétions bronchiques.

3. ATTENTION !

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament :

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de

e) Grossesse-Allaitement :

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.