

# COMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Souscriptions générales :

Un cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie. La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Toutes les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Hopital Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 4828

Société :

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : CHAKIB

Date de naissance :

Adresse :

Télé : 0668453433

Total des frais engagés : 100 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 03/11/2020

Nom et prénom du malade : HALIME

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : polyarthrite + cervicalgique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Cœfficients	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03/11/2020	CP	Hay Al Qods, Bd. Naboulsi Casablanca N° 5 Tél: 05 22 74 05 93	150 DH	Dr. J.K.N. Hay Al Qods, Bd. Naboulsi Casablanca N° 5 Médecin généraliste Tél: 05 22 74 05 93

## EXÉCUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie 20, Résidence 24 Mars Tél: 05 22 75 43 00	03/11/2020	46301, 30

## ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
Laboratoire d'Analyses et Radiographies Dr. EL KHAFFIF Amal Bad Mbarek Ben Boujemaa Hammadi N° 52-54 Hay Al Qods Sidi Bernoussi Casablanca Tel: 05 22 75 86 77 Fax: 05 22 77 83	03/11/2020	1556	651, 30 DH

## AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le b

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Cœfficient	CŒFFICIENT DES TRAVAUX
				
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				CŒFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS

**O.D.F PROTHÈSES DENTAIRES**

**DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE**

H	21433552
25533412	00000000
D	00000000
00000000	00000000
B	11433553
35533411	

**[Création, remont, adjonction]**  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

Docteur JKINI Hafida

Médecine Générale  
Echographie Clinique



الدكتورة اجكيني حفيظة

الطب العام

الفحص بالصدى

Dr. JKINI Hafida

Médecin Généraliste  
Hay Al Qods, Bd. Nabouls N° 51  
Sidi Bernoussi - Casablanca  
Tel.: 05 22 74 05 93

## Ordonnance

Haline

FA ouziq

20100

① Panadol ~~2~~  
1yp / 5g /

37100

Dulastan ~~5~~

1yp x 8g

alp 2e

Zenmag ~~5~~

1yp x 32 1Boj

Dr. JKINI Hafida  
Médecin Généraliste  
Hay Al Qods, Bd. Nabouls N° 51  
Sidi Bernoussi - Casablanca  
Tel.: 05 22 74 05 93

③

54120 - Cartier 100 ~~St~~

---

14p x 25. 1Bn  
abs ref midi  
" son

81.40 - omiz<sup>20</sup> SV  
Togelusy (7.)  
mala je

~~29,50 + 0,2~~ D3 Norm SV  
30 Anltt 11  
afel fehl defn

2016-05272754300  
PDR/PR/2016-05272754300  
S&G/2016-05272754300  
16/05/2016 14:00:00

~~436.30~~

**Dr. JKNI Hafida**  
Médecin généraliste  
Hay Al-Qods, Bd. Nabouls N° 51  
Sidi Bernoussi - Casablanca  
Tel.: 05 22 74 05 93

gsk



# Panadol Extra

20 Comprimés pelliculés sécables  
sous plaquettes thermoformées  
Paracétamol 500 mg, Caffeïne 65 mg



**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement/votre maladie.**

Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Toutefois, vous devez toujours prendre Panadol Extra avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice:

- 1 Qu'est ce que Panadol Extra et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2 Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Panadol Extra ?
- 3 Comment prendre Panadol Extra
- 4 Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5 Comment conserver Panadol Extra
- 6 Informations supplémentaires

## 1. Qu'est ce que Panadol Extra et dans quels cas est-il utilisé ?

- Panadol Extra est un antipyrrétique et un analgésique.
- Panadol Extra est utilisé en cas de fièvre et en cas de douleur.

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Panadol Extra?

N'utilisez pas Panadol Extra

- chez des enfants de moins de 12 ans.
- si vous êtes hypersensible au paracétamol, à la caféine, à la phénacétine ou à un des autres composants de Panadol Extra.
- si vous avez ou si vous avez eu une insuffisance hépatique grave.
- si vous avez une défiance génétique en glucose-6-P-déshydrogénase.

## Faites attention avec Panadol Extra

- Ce médicament contient du paracétamol. Ne dépasser pas les doses prescrites ou recommandées, ni prolongez le traitement. Consultez votre médecin si des symptômes persistent. L'emploi prolongé de ce médicament doit être évité. Consultez votre médecin si vous souffrez d'insuffisance hépatique ou rénale.
- Une consommation chronique d'alcool peut abaisser le seuil de toxicité de paracétamol. Chez ces patients l'intervalle entre deux prises sera au minimum de 8 heures. Ne pas dépasser 2 g de paracétamol par jour.
- Si vous prenez déjà des autres médicaments, veuillez lire également la rubrique «Utilisation du Panadol Extra en association avec d'autres médicaments».
- L'usage chronique pourrait entraîner une insuffisance rénale.

- Enfants de moins de 12 ans : ne pas recommander pour les enfants de moins de 12 ans.

• La durée du traitement doit être aussi brève que possible et ne doit pas excéder la période pendant laquelle les symptômes sont présents.

Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin ne vous en ait données d'autres. En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

## Si vous avez pris plus de Panadol Extra que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop de Panadol Extra prenez immédiatement contact avec votre médecin ou votre pharmacien à cause du risque d'insuffisance hépatique. Les symptômes d'un surdosage de paracétamol (pâleur, nausées, vomissements) se manifestent habituellement dans les premières 12 à 24 heures. Une insuffisance hépatique n'intervient que 3 jours après le surdosage. Un surdosage de caféine se caractérise par des vomissements, de l'excitation et des palpitations. L'hospitalisation est obligatoire, même en cas d'intoxication présumée.

Une insuffisance rénale aiguë avec néphrite interstitielle aiguë peut se développer, même en l'absence de lésion hépatique grave.

Traitements: si vous avez pris ou utilisé une dose excessive de Panadol Extra, l'estomac doit être vidé aussi rapidement que possible, c'est à dire au cours des 10 premières heures, par un lavage gastrique. Ce traitement par l'administstration thérapeutique principale consiste toutefois à la N-acétylcystéine.

## Si vous avez oublié de prendre Panadol

Ne prenez jamais une double dose de Panadol si vous avez oublié de prendre.

**Effets pouvant apparaître lorsque le traitement est pas applicable.**

## 4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Panadol Extra peut causer des effets indésirables.

MATIN      MIDI      SOIR      DURÉE

LOT : 0304  
PER : AUT 2022  
PPV : 20 DH 00

# DULASTAN® 500mg/2mg

Comprimé

Boîte de 20

Paracétamol - Thiocolchicoside

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **COMPOSITION :**

Paracétamol.....	500 mg
Thiocolchicoside.....	2 mg

Excipients : ..... q.s.p..... 1 comprimé

Excipients à effet notoire : Amidon de blé, lactose.

## **DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

Ce médicament est préconisé dans :

- Traitement symptomatique de la douleur d'origine rhumatismale ou musculaire en traumatologie et gynécologie.
- Traitement d'appoint des contractures douloureuses au cours :
  - des affections vertébrales dégénératives et des troubles statiques vertébraux : torticolis, dorsalgies, lombalgies.
  - des affections traumatologiques et neurologiques (avec spasticité).

## **ATTENTION !**

## **DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :

- d'hypersensibilité au thiocolchicoside ou au paracétamol,
- de grossesse,
- d'allaitement,
- d'insuffisance hépatocellulaire,
- d'hypersensibilité à l'un des excipients du produit,
- chez l'enfant de moins de 15 ans.

## **MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

- Chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique et/ou rénale, d'affections cardiaques ou pulmonaires, éviter les traitements prolongés.
- Pour éviter le risque de surdosage au paracétamol, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments.
- Le thiocolchicoside doit être administré avec prudence chez les patients épileptiques ou à risque de convulsions.
- En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la posologie.
- Eventuellement, ingérer les comprimés avec un pansement gastrique.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.
- Il est conseillé de consulter un médecin pour des traitements excédant 7 jours.

## **EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en malabsorption du glucose et de galactose, ou de déficit en lactose.

L'amidon de blé peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes souffrant de maladies coeliaques.

## **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUS SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A V DULASTAN® peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

En cas de traitement avec des anticoagulants oraux, on peut l'administrer

## **Examens paracliniques :**

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la de la glycémie par la méthode à la glucose oxydase-peroxydase.

DULASTAN® 500mg/2mg

Boîte de 20 comprimés

دلاستان

علبة من 20 قرصاً

37.00

# ZENmag® sirop

**forme et présentation :**  
- sirop, flacon de 150 ml

Analyse moyenne	Actif en mg / 15 ml	AJR * 15 ml
I Fluide de Mélisse	381,2 mg	
Magnésium	150 mg	50 %
Vit B6	2 mg	100 %

\*Apport Journalier recommandé

**Propriétés Nutritionnelles :**

**ZENmag® Sirop** est composé d'un magnésium organique le GIVOMAG™, la vitamine B6 et la mélisse. Le GIVOMAG™ est le magnésium le mieux toléré par l'organisme et dont l'absorption est supérieure aux autres magnésiums. Son association à la vitamine B6 et à la mélisse potentialise l'action relaxante et participe au fonctionnement normal du système nerveux.

**Conseils d'utilisation :**

- Stress, nervosité et anxiété
- Etats de fatigues psychiques
- Troubles du sommeil

**Agiter avant utilisation.  
1 à 3 cuillerées à café par jour.**

**Précautions d'utilisation :**

- Une fois le flacon entamé, il doit être utilisé dans le mois suivant son ouverture.
- Contient une source de phénylalanine
- Ne dispense pas d'une alimentation équilibrée
- Tenir hors de portée des enfants

Fabriqué par Laboratoire Pileje

Distribué par Ramo-Pharm

Complément alimentaire n'est pas un médicament

## زینماک® شراب

**المميزات :** زینماک® شراب يتألف من المغذيوم العضوي (Givomag™) فيتامين ب 6 و ميليسا، يعتبر جيفورماك المغذيوم الأكثر والأسرع اشتمالاً والذي له حماية كافية. مزيجه مع فيتامين ب 6 و ميليسا يعمل على الاسترخاء ويشارك في الأداء الطبيعي للجهاز العصبي.

- تخفيرات الاستعمال:
- مجرد فتح القارورة، يجب استخدامها في الشهر نفسه.
- يحتوي على مصدر الفيتامينات.
- لا تستغني عن اتباع نظام غذائي متوازن.
- يبعد عنتناول الأطفال.

**الشكل والتقطيم :** شراب قارورة من 150 مل.  
**التركيب :** ماء، المطيسرين، المتفقسيوم غليسروفسفات، إفلاود ميليسا، حامض السوبيك موноهيدرات، صبغ أكسازيل تنان، سوربات البروتاسيوم، بنزوات الصوديوم، بريدوكتين كلوريدرات، تكهة الكراميل.

**نصائح الاستعمال :**

- التوتر، القصبية والقلق.
- التعب النفسي.
- اضطرابات النوم.

يُفضَّل قبل الاستخدام من منطقة واحدة إلى 3 ملاعق صغيرة في اليوم

## ZENmag® syrup

**Pack size and presentation:**  
Syrup. Bottle of 150 ml.

**Composition:**

Water, glycerin, Magnesium Glycerophosphate (Givomag™), I fluid of Balm, citric acid, Monoxydrates, gom locust tree-xanthane (Thixogums), potassium sorbate, sodium Benzoate, Pyridoxine chlorhydrate (Vit B6), Aroma caramel.

**Properties:**

**ZENmag® syrup** is a well-balanced composition of organic magnesium the GIVOMAG™, the vitamin B6 and the balm, for relaxing action.

**Advice for usage:**

- Stress and anxiety
  - Psychological and physical illnesses
  - Sleeping troubles
- 1 in 3 teaspoons, a day**

**Directions:**

- When opened, the syrup should be used during the month.
- Contains a source of phenylalanine
- Do not exceed mg diet
- Hold out of reach

LOT 20007/FC11  
01/2023 PPC 84,7

par jour.

un médicament

Lc

L'a

m

et

85

TM

# CARTREX 100 mg, comprimé pelliculé

## Acéclofénac

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Liste complète des substances actives et des excipients

La substance active est:

Acéclofénac

100 mg

Pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont:

Comprimé nu: Avicel pH 101 et Avicel pH 102 (cellulose microcristalline), croscarmellose sodique (Ac-Di-SOL), Polyvinyl Pyrrolidone K 30, Palmitostéarate de glycérol (Precirol AT05)

Pelliculage: Sepifilm 752 blanc (HPMC partiellement substituée, cellulose microcristalline, polyoxy-40 stéarate et dioxyde de titane)

Classe pharmacothérapeutique

Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Il est indiqué chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 ans dans le traitement des poussées d'arthrose et le traitement de certains rhumatismes inflammatoires.

Contre-indications

Ne prenez jamais CARTREX 100 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants:

- au cours des trois derniers mois de la grossesse,
- antécédent d'allergie à ce médicament ou à un médicament apparenté notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine,
- crises d'asthme, d'urticaire ou de congestion nasale déclenchées par la prise d'aspirine ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens,
- antécédents d'hémorragie ou de perforation digestive au cours d'un précédent traitement par AINS,
- ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien ayant récidivé ou en évolution,
- maladie inflammatoire de l'intestin (Crohn, rectocolite hémorragique),
- saignement de l'estomac ou de toute autre nature,
- troubles du saignement, troubles de la coagulation,
- maladie grave du foie, des reins ou du cœur,
- enfant de moins de 15 ans.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Mises en garde spéciales

**CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE**

Les AINS tels que CARTREX pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.

Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si, vous pensez avoir des facteurs de risques pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé) ou si vous fumez, veuillez en parler avec votre médecin ou à votre pharmacien.

Lors de la varicelle, l'utilisation de ce médicament est déconseillée en raison d'exceptionnelles infections graves de la peau.

**AVANT D'UTILISER UN ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROIDIEN, PREVENIR VOTRE MEDECIN EN CAS:**

• de troubles de la coagulation, de traitement anticoagulant concomitant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves,

- d'antécédents digestifs,
- de maladie du cœur, du foie ou du rein,
- de traitement par diurétique, d'intervention chirurgicale récente,
- de traitement par les corticoïdes oraux, les anticoagulants, les antidépresseurs du type inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ou les antiagrégants plaquettaires,
- de porphyrie (maladie héréditaire),
- de lupus érythémateux disséminé.

**AU COURS DU TRAITEMENT PAR UN ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROIDIEN, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE**

• de signes évocateurs d'allergie à ce médicament

peau et/ou des muqueuses,

• d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang)

**Prendre des précautions particulières avec**

**CE MEDICAMENT CONTIENT UN ANTI-IN**

Vous ne devez pas prendre en même temps (y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase) que d'autres médicaments contenant des substances anti-inflammatoires non stéroïdiennes et/ou d'aspirine.

**Interactions avec d'autres médicaments**

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien obtenu sans ordonnance. Certains médicaments peuvent nécessiter des changements spécifiques (de toujours informer votre médecin, dentiste ou orthodontiste, autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, anticoagulants, autres médicaments)

LOT : 200513

UT AV : 04/2024

PPV : 54,20DH

UT AV :

LOT N° :

PPV (DH) :

# Omiz®

Oméprazole

## Microgranules gastrorésistants en gélule

### PRESENTATIONS :

**OMIZ® 20 mg** : Boîte de 7 gélules  
Boîte de 14 gélules  
Boîte de 28 gélules

**OMIZ® 10 mg** : Boîte de 7 gélules  
Boîte de 14 gélules  
Boîte de 28 gélules

### COMPOSITION :

**OMIZ® 20mg**  
Oméprazole.....20 mg  
Excipients q.s.p.....1 gélule  
Excipient à effet notoire : saccharose

### COMPOSITION :

**OMIZ® 10mg**  
Oméprazole.....10 mg  
Excipients q.s.p.....1 gélule  
Excipient à effet notoire : saccharose

### CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Inhibiteur de la pompe à protons (appareil digestif et métabolisme). Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

### INDICATIONS :

- Chez l'adulte :
  - En association à une bithérapie antibiotique, éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale,
  - Ulcère duodénal évolutif,
  - Ulcère gastrique évolutif,
  - Oesophagite érosive ou ulcérale symptomatique par reflux gastro-œsophagien,
  - Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien associé ou non à une oesophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour,
  - Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par Helicobacter pylori ou chez qui l'éradication n'a pas été possible,
  - Traitement d'entretien des oesophagites par reflux gastro-œsophagien,
  - Syndrome de Zollinger-Ellison,
  - Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable,
  - Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risques (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédents d'ulcère gastroduodénal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.
- Chez l'enfant à partir d'un an : Oesophagite érosive ou ulcérale symptomatique

### CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants de ce médicament.
- En association avec l'atazanavir associé au ritonavir (médicament à

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS D'

### MISES EN GARDE / PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

#### Mises en garde :

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être donné à un enfant de moins de 1 an ou à un enfant dont il existe une suspicion de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

#### Précautions d'emploi :

Utiliser ce médicament avec précaution en cas d'affections chroniques ou d'insuffisance rénale ou hépatique.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN.

### INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS :

Avec l'atazanavir associé au ritonavir (médicament anti-infectieux obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien).

07/18



Gouttes buvables  
Voie orale

# D3 NORM®

## FORME ET PRESENTATION :

Gouttes buvables, flacon compte-gouttes de 30 ml.

## COMPOSITION :

Huile de soja, Antioxydant : Acétate de vitamine E liquide, Vitamine D3.

## PROPRIETES ET UTILISATIONS :

D3 NORM® gouttes buvables renferme de la vitamine D3 (cholécalciférol), la forme la plus active de vitamine D.

D3 NORM® gouttes buvables favorise l'absorption du calcium et contribue au maintien d'une ossature normale et au bon fonctionnement du système immunitaire.


## UTILISATIONS :

- Carence en vitamine D.
- Fragilité osseuse.

## CONSEILS D'UTILISATIONS :

Suivre les recommandations d'un professionnel de la santé ou du sport. Les gouttes sont à diluer dans un liquide froid de (lait, jus de fruits...). Le flacon est muni d'un compte-gouttes. 1 goutte = 100 UI.

Convient aux femmes enceintes.



Lot: 190784  
A consommer  
avant le: 12/2022

PPC: 79,50 DH



Laboratoire Autorisé N°: 26050

# مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

د. أمال الخفيف رمضانى

Patente : 31643475 - IF : 53000550 - CNSS : 2064872 - ICE : 001540529000093

تاریخ اجراء  
التحاليل غير قابل  
للتغيير

FACTURE N° : 201100132

Casablanca le 03-11-2020

Mme HALIME Faouzia

Date de l'examen : 03-11-2020

**INPE**  
**093003440**

## Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
PS	Prélèvement	E10	E
0216	Numération formule	B80	B
0223	VS	B30	B
0439	Vitamine D	B450	B

Total des B : 560

Total dossier: 654.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :  
six cent cinquante-quatre dirhams

Laboratoire d'Analyses Médicales YAFA

Dr. EL KHAFFIF Amal

Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54

Hay Al Qods Sidi Benoussi - Casablanca

Tel : 05 22 75 86 77 Fax : 05 22 76 2

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54 Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 - 05 22 75 93 10 / Fax : 05 22 76 84 39 / E-mail : laboyafa@hotmail.com

HALIME

# BILAN BIOLOGIQUE

Le : 03.11.2020

Nom / Prénom : FAOUZIA

Age :

Sexe : M  F

◆ Groupage sanguin

- Groupe
- Rhésus
- RAI
- Phénotype Rhésus
- Coombs Indirect
- Coombs direct

◆ Hématologie/infectiologie

- NFS
- Plaquette
- Electrophorèse de l'hémoglobine
- Réticulocytes
- VS
- CRP
- Procalcitonine

◆ Bilan d'hémostase

- TP
- INR
- TCK
- Fibrinogène
- D-Dimères

◆ Bilan lipidique

- Cholestérol total
- Cholestérol HDL
- Cholestérol LDL
- Triglycérides

◆ Bilan glycémique

- Glycémie à jeun
- Hyperglycémie provoquée
- Hémoglobine glyquée

◆ Bilan martial

- Fer sérique
- CTF
- Ferristine
- Transferrine

Autres :

◆ Ionogramme sanguin

- Na+
- K+
- Cl-
- Calcium
- Réserve Alcaline
- Phosphore
- Magnésium
- Magnésium érythrocytaire
- Protéines
- Acide urique

◆ Ionogramme urinaire

- Diurèse
- Na+
- K+
- Cl-
- Calcium
- Phosphore
- Urée

◆ Fonction rénale

- Urée
- Créatinine
- Clairance de la créatinine
- Protéinurie des 24h

◆ Fonction hépatique et pancréatique

- ASAT
- ALAT
- Phosphatase alcaline
- Gamma GT
- Bilirubine libre et conjuguée
- 5' Nucléotidase
- Amylase
- Lipase
- Electrophorèse des protéines

◆ Examen des urines

- ECBU
- ATB gramme
- Test de grossesse

◆ Bilan hormonal

- Prolactine
- FSH
- Estradiol
- gHCG
- T3
- T4
- TSH us

◆ Sérologie et immunologie

- VDRL
- TPHA
- Hépatite A
- Hépatite B:
  - Antigène Hbs
  - Antigène Hbe
  - Anticorps Anti Hbc
  - Anticorps Anti Hbs
  - Anticorps Anti Hbe
- Hépatite C
- ASLO

◆ Examen des selles

- Coprologie
- Parasitologie

◆ Divers

- PSA
- Phosphatase acide
- Vitamine D
- CPK
- Troponines
- BNP
- Pro BNP

JKIN Handa  
Médecin généraliste  
Bd Mbarek Ben Boubker Casablanca  
Bd Al Qods Sidi Bernoussi Casablanca  
Tel : 05 22 74 05 93

Laboratoire d'Analyse

Dr. EL KH

Bd Mbarek Ben Boubker Casablanca

Bd Al Qods Sidi Bernoussi Casablanca

Tel : 05 22 75 84 77

M. Farah D2 - D3



Laboratoire Autorisé N°: 26050

# مختبر يافا للتحاليلات الطبية

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFÀ

BOICHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

د. أمال الخفيف رمضانى

Prélèvement du : 03-11-2020  
Edition : 03-11-2020

Mme HALIME Faouzia

Code Patient 2011030092 Référence : 2011030092

Prescripteur : Dr JKINI Hafida

Page : 2/2

### VITAMINES

#### 25-OH-Vitamine D (D2+D3)

(Roche Cobas e411)

Interprétation: ng/ml

Déficience : <20

Insuffisance : 20-29

Suffisance : >=30

22.79 ng/ml

*57.0* nmol/l

nmol/l

<50

52.5-72.50

>=75

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Laboratoire d'Analyses Médicales YAFÀ  
Dr. EL KHAFIF RAMDANI  
Rd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54  
Casablanca  
Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboymafa@hotmail.com

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboymafa@hotmail.com



Laboratoire Autorisé N°: 26050

# مختبر يافا للتحاليل الطبية

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA

BOICHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د. أمال الخفيف رمضانى

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 03-11-2020  
Edition : 03-11-2020

Mme HALIME Faouzia

Code Patient 2011030092 Référence : 2011030092

Prescripteur : Dr JKINI Hafida

Page : 1/2

### HEMATOCYTOLOGIE

#### Hemogramme

Hématies :	4.45 M/mm <sup>3</sup>	(4.00-5.30)
Hémoglobine :	13.3 g/dL	(12.5-15.5)
Hématocrite :	40.1 %	(37.0-46.0)
-VGM :	90.1 fL	(80.0-95.0)
-TCMH :	29.9 pg	(28.0-32.0)
-CCMH :	33.2 g/dL	(30.0-35.0)
Leucocytes :	5 150 /mm <sup>3</sup>	(4 000-10 000)
Polynucléaires Neutrophiles :	49.1 %	(40.0-75.0)
Soit:	2 529 /mm <sup>3</sup>	(2 000-7 500)
Polynucléaires Eosinophiles :	2.1 %	(1.0-4.0)
Soit:	108 /mm <sup>3</sup>	(100-400)
Polynucléaires Basophiles :	0.6 %	(0.0-1.0)
Soit:	31 /mm <sup>3</sup>	(0-100)
Lymphocytes :	36.5 %	(20.0-45.0)
Soit:	1 880 /mm <sup>3</sup>	(1 500-4 000)
Monocytes :	11.7 %	(2.0-8.0)
Soit:	603 /mm <sup>3</sup>	(200-800)
Plaquettes :	154 000 /mm <sup>3</sup>	(160 000-350 000)
(Cytométrie en flux XT2000Sysmex)		
IDP	17.9 fL	(9.0-14.0)
VPM	12.7 fL	(8.0-12.0)
P-RGC	43.7 %	(12.0-35.0)

#### Vitesse de sédimentation

VS 1ère heure	35 mm	(<10)
VS 2ième heure	70 mm	(<20)

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h    Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Laboratoire d'Analyses Médicales YAFA  
Dr. EL KHAFFI RAMDANI  
Bd Mbarek Ben Bousaada Hammadi N° 52-54  
Hay Al Qods Sidi Bernoussi Casablanca  
Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com

Validé par : Dr. Amal EL KHAFFI

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com