

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

N° W19-567799

ND: 46933

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)		Société : ROYAL AIR MAROC	
Matricule : 16933			
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : BEHBE 27AUK SANAÉ			
Date de naissance : 04/09/77			
Adresse : LES VILAS PARC N°165 Douan LKNDAR			
Tél. : 060 608095		Total des frais engagés :	
MUPRAS Dhs			
Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin : DR BENNANI FAYCAL			
TRAUMATO-ORTHOPÉDIE			
CHIRURGIE DU SPORT			
ACCUEIL SIEGE RAMA			
10 NOV. 2020			
Date de consultation : 24 Oct 2020			
Nom et prénom du malade : BEHBE 27AUK SANAÉ Age:			
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Nature de la maladie : Doulours cervicales chroniques			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : / /

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du M. attestant le Paiement des
24/10/2016	C.S	30x2 f	60 f	INP : 09NA6661610 Dr. BENNANI FAAL TRAUMATO-ORTHOPÉDIE CHIRURGIE DU SECTEUR

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DR. HELZ Dr. HELZ Tél: 0555 07 42 10	24 10 2016	# 494,20

ANALYSES - RADIographies


Cachet et Signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Boulevard Mouloudji Clinique du Val d'Asie S 2004 02 22 36 02 38 Fax: 05 22 36 02 38	28/10/2016	IRM cervical distal. et lombaire	5000,00 D.D.

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
	35533411	11433553
B		
G		

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



مكتب جراحة المفاصل والجراحة الرياضية
Centre de Traumatologie-Orthopédie et Chirurgie du Sport

24/10/2020

Casablanca le :

MME BERREZZOUK SANAE

DOULEURS CERVICALES CHRONIQUES REBELLES AU TRAITEMENT MÉDICAL.

DOULEURS LOMBAIRES AVEC SCIATALGIES BILATÉRALES.

- IRM DU RACHIS CERVICAL.
- IRM DU RACHIS DORSO-LOMBAIRE.

CEINTRE I.R. M.
19, Boulevard Moulay Rachid
Clinique du Val d'Anfa
Tél.: 0522 94 02 42 / 05 22 94 27 6
Fax : 05 22 36 02 38

Dr. BENNANI FAYCAL
TRAUMATO-ORTHOPÉDIE
INPE - 105 Bd. 2 Mars, RDC
Casablanca

CENTRE IRM
17 BOULEVARD MOULAY RACHID
TEL : 05.22.94.02.42 05.22.94.27.95
05.22.94.86.66
FAX : 05.22.3607.38
Casa 28/10/2020

FACTURE 3143/2020

NOM ET PRENOM / BERREZZOUK SANAE

**EXAMEN / IRM CERVICALE+DORSALE ET
LOMBAIRE**

AU TOTAL / 5000DHS

**ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME
« CINQ MILLE DIRHAMS »**

DRS K BELYAMANI – TAZI CHAOUI Z – H. BEN GELLOOUN
PATENTE : 35603422- CNSS : 2565424- Identifiant Fiscal : 01003663
ICE : 001 70 16 36 0000 72



24/10/2020


Casablanca le :

MME BERREZZOUK SANAÉ

123,60⁰² / 247,20

- **Inexium 40 mg**
1 Comprimé, matin, avant les repas, pendant , 20 jours
37,00
- **Dulastan**
1 Comprimé, matin, soir, après les repas, pendant , 15 jours
150,00
- **Celebrex 200 mg**
1 Gélule, matin, soir, après les repas, pendant 05 jours puis 1 gélule par jour pendant 15 jours.
30,00⁰² / 160,00
- **SEDALGIC**
1 comprimé, matin, midi, soir, après les repas, pendant , 15 jours

total 494,20



Lot.

150.00

Exp.

P10002677

MÉDICAMENT .

ons, si vous avez un doute, demandez plus
énellement prescrit. Ne le donnez jamais à
rdez cette notice, vous pourriez avoir besoin

Le
magnésium.

Enveloppe de la gélule : gélatine, dioxyde de titane (E171), encre contenant de l'indigo bleu (E132).

CELEBREX 200 mg. gélule

La substance active est le célecoxib (200 mg).

Les autres composants sont : lactose monohydraté, laurylsulfate de sodium, povidone K30, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.

Enveloppe de la gélule : gélatine, dioxyde de titane (E171), encre contenant de l'oxyde ferrique (E172).

DANS QUEL CAS UTILISER CELEBREX ?

Ce médicament s'administre sous forme de gélule. Boîte de 10 gélules ou 20 gélules.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). Par son mécanisme d'action, il fait partie des AINS inhibiteurs sélectifs de l'acyclo-oxygénase-2 (COX-2). Il est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans), pour soulager les signes et symptômes de l'arthrose et les signes et symptômes de la polyarthrite rhumatoïde, il est également indiqué dans le traitement des signes et symptômes de la spondylarthrite ankylosante.

NE PAS PRENDRE CELEBREX DANS LES CAS SUIVANTS :

antécédent d'allergie à l'un des constituants de ce médicament ou aux sulfamides, ulcère gastro-duodénal en cours, hémorragie gastro-intestinale, maladies inflammatoires de l'intestin, maladie grave du cœur, maladie grave du foie, maladie grave du rein, antécédents d'asthme ou d'allergie (rhinite, polypes dans le nez, brusque gonflement du visage et du cou, urticaire ou autres réactions allergiques) déclenchées par la prise d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, y compris les inhibiteurs de la COX-2, grossesse ou femme susceptible d'être enceinte, en l'absence d'une contraception efficace (cf. chapitre "Grossesse - Allaitement"), allaitement. Le Celebrex est contre-indiqué chez les patients présentant une maladie cardiaque (telle qu'une angine de poitrine, un infarctus du myocarde ou une insuffisance cardiaque) ou une maladie cérébro-vasculaire (antécédent d'accident vasculaire cérébral ou d'accident ischémique transitoire).

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC CELEBREX :

Ce médicament est réservé à l'adulte (plus de 15 ans).

Le Celebrex® doit être utilisé avec prudence par les patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaire, tel qu'une hypertension, un taux de cholestérol élevé, un diabète ou un tabagisme.

AVANT LE TRAITEMENT, PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN : en cas d'antécédents digestifs (oesophagite, gastrite, ulcère de l'estomac ou de l'intestin ancien ou hémorragie digestive), en cas de maladie du cœur, du foie ou du rein, d'hypertension artérielle, d'œdème, de traitement par diurétique, en cas de traitement anti-agrégant plaquettaire ou anticoagulant concomitant (ex : aspirine à faible dose, warfarine, anticoagulants oraux), en cas d'infection, en cas d'intolérance au lactose [galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares)], en raison de la présence de lactose. En fonction de ces différents cas, votre médecin pourra être amené à vous suivre régulièrement et/ou à adapter, si nécessaire, la posologie de votre médicament. Il en est de même en fonction de votre âge.

AU COURS DU TRAITEMENT, ARRIETER CELEBREX ET CONTACTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE en cas : d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration noire des selles), de symptômes pouvant évoquer une réaction allergique sévère telle que crise d'asthme, gêne respiratoire, brusque réaction du visage et du cou ou toute réaction cutanée, de maladie cardiaque dont les symptômes semblent s'aggraver (essoufflement, douleurs thoraciques ou augmentation des œdèmes). Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le célecoxib. Vous devez éviter de prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens (y compris les médicaments contenant du célecoxib) et/ou de l'aspirine (sauf à dose anti-agrégante plaquettaire). Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine.

GROSSESSE - ALLAITEMENT :

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est CONTRA-INDIQUÉE pendant la grossesse et pour les femmes susceptibles d'être enceintes (absence de contraception efficace). Les effets de ce médicament, notamment à partir du 3ème trimestre de la grossesse, peuvent avoir des séquelles graves sur votre enfant, sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela, même avec une seule prise. Si vous découvrez

SEDALGIC® 325 mg/37,5mg
comprimé pelliculé - Boîte de 20.
Paracétamol / Chlorhydrate de Tramadol

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Garder hors de portée des enfants.
- S'abstenir de conduire et d'utiliser des machines.

LOT : 200109
UT AV : 01/2022
PPV : 30,000H

**QUE SEDALGIC® 325mg/37,5mg, comprimé pelliculé ET
DANS LES CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique ou le type d'activité :

SEDALGIC est une association de 2 analgésiques, le tramadol et le paracétamol, qui agissent ensemble pour soulager votre douleur.

Indications thérapeutiques :

SEDALGIC est indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses lorsque votre médecin pense qu'une association de chlorhydrate de tramadol et de paracétamol est nécessaire.

SEDALGIC est réservé à l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SEDALGIC® 325mg/37,5mg, comprimé pelliculé ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Ne prenez jamais SEDALGIC® 325mg/37,5mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au chlorhydrate de tramadol, au paracétamol ou à tout autre composant de ce médicament (cf. la rubrique 6).
- en cas d'intoxication aigüe par l'alcool, par les somnifères, par d'autres médicaments contre la douleur ou des médicaments psychotropes (médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions).
- si vous prenez en même temps des inhibiteurs de la Monoamine Oxydase (médicaments utilisés pour le traitement de la dépression ou la maladie de Parkinson) ou si vous en avez pris au cours des deux semaines précédant le traitement par SEDALGIC.
- si vous avez une maladie grave du foie.
- si vous avez une épilepsie non contrôlée par un traitement.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre SEDALGIC :

- si vous prenez d'autres médicaments contenant du paracétamol ou du tramadol.
- si vous avez des problèmes au foie ou une maladie du foie ou si vous remarquez que votre peau et vos yeux deviennent jaunes. Cela peut suggérer une jaunisse ou des troubles biliaires.
- si vous avez une maladie des reins.
- si vous avez des difficultés sévères à respirer telles que de l'asthme ou une maladie sévère des poumons.
- si vous êtes épileptique ou si vous avez déjà eu des convulsions.
- si vous avez eu récemment une blessure à la tête ou si vous avez de violents maux de tête accompagnés de vomissements.
- si vous êtes dépendant de médicaments notamment ceux utilisés pour soulager la douleur comme la morphine.
- si vous prenez d'autres médicaments contre la douleur, à base de buprénorphine, de nalbuphine ou de pentazocine.
- si vous allez prochainement subir une anesthésie. Dites à votre médecin ou à votre dentiste que vous prenez SEDALGIC.
- Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Si vous avez été concerné par l'un des points ci-dessus dans le passé ou si vous êtes concerné pendant la prise de SEDALGIC, assurez-vous que le professionnel de santé qui vous suit (médecin, dentiste, anesthésiste, ...) est au courant. Il/elle pourra décider de la poursuite éventuelle du traitement.

Enfants et adolescents :

SEDALGIC ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Autres médicaments et SEDALGIC 325 mg/37,5mg, comprimé pelliculé
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris

ou pourriez prendre tout autre médicament.

Important: Ce médicament contient du paracétamol et du tramadol. Informez votre médecin si vous prenez tout autre médicament contenant du paracétamol ou du chlorhydrate de tramadol, afin de ne pas dépasser les doses quotidiennes maximales.

Vous ne devez pas prendre SEDALGIC avec des inhibiteurs de la Monoamine Oxydase (IMAOs) (voir rubrique « Ne prenez jamais SEDALGIC »).

Il n'est pas recommandé de prendre SEDALGIC avec :

• carbamazépine (un médicament fréquemment utilisé pour traiter les crises ou d'autres types de douleurs tels que les attaques de douleur de la face, appelées névralgies du trijumeau).

• phénacetine, nalbuphine ou pentazocine (analgésiques de type opioïde) qui peut être réduit.

• les indésirables augmentent :

• le risque de crise de migraine ou des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (« IRS ») (traitement de la dépression).

Si vous rencontrez les symptômes suivants: confusion, étourdissements, transpiration, mouvements non coordonnés des membres ou des muscles incontrôlés ou une diarrhée, vous devez consulter votre médecin,

• des tranquillisants, des somnifères, d'autres analgésiques tels que la codeine (qui traite également la toux), le baclofène, les médicaments diminuant la pression artérielle, des anti-inflammatoires et des anti-allergiques. Vous risquez de vous sentir somnolent.

Si cela se produit, parlez-en à votre médecin, car il existe des médicaments susceptibles de provoquer des crises d'épilepsie), comme certains antidépresseurs ou

Le risque de crise d'épilepsie peut augmenter si vous prenez SEDALGIC en même temps. Votre médecin vous dira si SEDALGIC vous convient.

• Si vous prenez certains antidépresseurs, SEDALGIC peut interagir avec ces médicaments et vous pourrez ressentir des effets tels que des contractions musculaires involontaires et répétées notamment des muscles des yeux, une agitation, une transpiration excessive, des tremblements, une exacerbation des réflexes, une augmentation de la tension musculaire, de la fièvre (supérieure à 38°C).

• si vous prenez de la warfarine ou des dérivés de la coumarine (médicaments qui fluidifient le sang). L'efficacité de ces traitements sur la coagulation peut s'en trouver modifiée et il peut y avoir des hémorragies. Toute saignement prolongé ou inattendu doit être rapporté immédiatement à votre médecin.

L'efficacité de SEDALGIC peut être diminuée si vous prenez également des produits à base de :

• métoclopramide, dompéridone ou ondansétron (pour prévenir les nausées et les vomissements).

• cholestyramine (réduit le cholestérol dans le sang).

Pour votre médecin vous indiquer que quel traitements peuvent être pris avec SEDALGIC 325mg/37,5mg, comprimé pelliculé avec des aliments et de l'alcool. SEDALGIC peut provoquer une somnolence. La prise d'alcool pouvant agraver la somnolence, il est préférable de ne pas boire d'alcool pendant le traitement par SEDALGIC.

Grossesse allaitement et fertilité

En raison de la présence de chlorhydrate de tramadol, SEDALGIC ne doit pas être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin avant de prendre les prochains comprimés.

Le tramadol est excrété dans le lait maternel. Pour cette raison, SEDALGIC ne doit pas être pris plus d'une fois au cours de l'allaitement. Si vous prenez SEDALGIC de façon répétée, vous devez arrêter d'allaiter votre enfant.

D'après les données disponibles chez l'Homme, le tramadol n'aurait pas d'influence sur la fécondité féminine et masculine. Il n'existe aucune donnée disponible sur l'influence de l'association du tramadol et du paracétamol sur la fertilité.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'attention est attirée chez les conducteurs de véhicules ou les utilisateurs de machines sur les risques de somnolence suite à la prise de SEDALGIC.

Ce médicament contient du lactose :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SEDALGIC® 325mg/37,5mg, comprimé pelliculé ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Prenez toujours ce médicament en respectant strictement les instructions de votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est conseillé de prendre SEDALGIC pour une durée la plus courte possible.

SEDALGIC® 325 mg/37,5mg
comprimé pelliculé - Boîte de 20.
Paracétamol / Chlorhydrate de Tramadol

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Garder hors de portée des enfants.
- S'abstenir de conduire et d'utiliser des machines.

LOT : 200109
UT AV : 01/2022
PPV : 30,000H

**QUE SEDALGIC® 325mg/37,5mg, comprimé pelliculé ET
DANS LES CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique ou le type d'activité :

SEDALGIC est une association de 2 analgésiques, le tramadol et le paracétamol, qui agissent ensemble pour soulager votre douleur.

Indications thérapeutiques :

SEDALGIC est indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses lorsque votre médecin pense qu'une association de chlorhydrate de tramadol et de paracétamol est nécessaire.

SEDALGIC est réservé à l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SEDALGIC® 325mg/37,5mg, comprimé pelliculé ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Ne prenez jamais SEDALGIC® 325mg/37,5mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au chlorhydrate de tramadol, au paracétamol ou à tout autre composant de ce médicament (cf. la rubrique 6).
- en cas d'intoxication aigüe par l'alcool, par les somnifères, par d'autres médicaments contre la douleur ou des médicaments psychotropes (médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions).
- si vous prenez en même temps des inhibiteurs de la Monoamine Oxydase (médicaments utilisés pour le traitement de la dépression ou la maladie de Parkinson) ou si vous en avez pris au cours des deux semaines précédant le traitement par SEDALGIC.
- si vous avez une maladie grave du foie.
- si vous avez une épilepsie non contrôlée par un traitement.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre SEDALGIC :

- si vous prenez d'autres médicaments contenant du paracétamol ou du tramadol.
- si vous avez des problèmes au foie ou une maladie du foie ou si vous remarquez que votre peau et vos yeux deviennent jaunes. Cela peut suggérer une jaunisse ou des troubles biliaires.
- si vous avez une maladie des reins.
- si vous avez des difficultés sévères à respirer telles que de l'asthme ou une maladie sévère des poumons.
- si vous êtes épileptique ou si vous avez déjà eu des convulsions.
- si vous avez eu récemment une blessure à la tête ou si vous avez de violents maux de tête accompagnés de vomissements.
- si vous êtes dépendant de médicaments notamment ceux utilisés pour soulager la douleur comme la morphine.
- si vous prenez d'autres médicaments contre la douleur, à base de buprénorphine, de nalbuphine ou de pentazocine.
- si vous allez prochainement subir une anesthésie. Dites à votre médecin ou à votre dentiste que vous prenez SEDALGIC.
- Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Si vous avez été concerné par l'un des points ci-dessus dans le passé ou si vous êtes concerné pendant la prise de SEDALGIC, assurez-vous que le professionnel de santé qui vous suit (médecin, dentiste, anesthésiste, ...) est au courant. Il/elle pourra décider de la poursuite éventuelle du traitement.

Enfants et adolescents :

SEDALGIC ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Autres médicaments et SEDALGIC 325 mg/37,5mg, comprimé pelliculé
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris

ou pourriez prendre tout autre médicament.

Important: Ce médicament contient du paracétamol et du tramadol. Informez votre médecin si vous prenez tout autre médicament contenant du paracétamol ou du chlorhydrate de tramadol, afin de ne pas dépasser les doses quotidiennes maximales.

Vous ne devez pas prendre SEDALGIC avec des inhibiteurs de la Monoamine Oxydase (IMAOs) (voir rubrique « Ne prenez jamais SEDALGIC »).

Il n'est pas recommandé de prendre SEDALGIC avec :

• carbamazépine (un médicament fréquemment utilisé pour traiter les crises ou d'autres types de douleurs tels que les attaques de douleur de la face, appelées névralgies du trijumeau).

• phénacetine, nalbuphine ou pentazocine (analgésiques de type opioïde) qui peut être réduit.

• les indésirables augmentent :

• le risque de crise de migraine ou des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (« IRS ») (traitement de la dépression).

Si vous rencontrez les symptômes suivants : confusion, étourdissements, transpiration, mouvements non coordonnés des membres ou des muscles incontrôlés ou une diarrhée, vous devez consulter votre médecin,

• des tranquillisants, des somnifères, d'autres analgésiques tels que la codeine (qui traite également la toux), le baclofène, les médicaments diminuant la pression artérielle, des anti-inflammatoires et des anti-allergiques. Vous risquez de vous sentir somnolent.

Si cela se produit, parlez-en à votre médecin, car il existe des médicaments susceptibles de provoquer des crises d'épilepsie), comme certains antidépresseurs ou

Le risque de crise d'épilepsie peut augmenter si vous prenez SEDALGIC en même temps. Votre médecin vous dira si SEDALGIC vous convient.

• Si vous prenez certains antidépresseurs, SEDALGIC peut interagir avec ces médicaments et vous pourrez ressentir des effets tels que des contractions musculaires involontaires et répétées notamment des muscles des yeux, une agitation, une transpiration excessive, des tremblements, une exacerbation des réflexes, une augmentation de la tension musculaire, de la fièvre (supérieure à 38°C).

• si vous prenez de la warfarine ou des dérivés de la coumarine (médicaments qui fluidifient le sang). L'efficacité de ces traitements sur la coagulation peut s'en trouver modifiée et il peut y avoir des hémorragies. Toute saignement prolongé ou inattendu doit être rapporté immédiatement à votre médecin.

L'efficacité de SEDALGIC peut être diminuée si vous prenez également des produits à base de :

• métoclopramide, dompéridone ou ondansétrone (pour prévenir les nausées et les vomissements).

• cholestyramine (réduit le cholestérol dans le sang).

Pour votre médecin vous indiquer que quel traitements peuvent être pris avec SEDALGIC 325mg/37,5mg, comprimé pelliculé avec des aliments et de l'alcool. SEDALGIC peut provoquer une somnolence. La prise d'alcool pouvant agraver la somnolence, il est préférable de ne pas boire d'alcool pendant le traitement par SEDALGIC.

Grossesse allaitement et fertilité

En raison de la présence de chlorhydrate de tramadol, SEDALGIC ne doit pas être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin avant de prendre les prochains comprimés.

Le tramadol est excrété dans le lait maternel. Pour cette raison, SEDALGIC ne doit pas être pris plus d'une fois au cours de l'allaitement. Si vous prenez SEDALGIC de façon répétée, vous devez arrêter d'allaiter votre enfant.

D'après les données disponibles chez l'Homme, le tramadol n'aurait pas d'influence sur la fécondité féminine et masculine. Il n'existe aucune donnée disponible sur l'influence de l'association du tramadol et du paracétamol sur la fertilité.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'attention est attirée chez les conducteurs de véhicules ou les utilisateurs de machines sur les risques de somnolence suite à la prise de SEDALGIC.

Ce médicament contient du lactose :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SEDALGIC® 325mg/37,5mg, comprimé pelliculé ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Prenez toujours ce médicament en respectant strictement les instructions de votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est conseillé de prendre SEDALGIC pour une durée la plus courte possible.

DULASTAN® 500mg/2mg

Comprimé
Boîte de 20

Paracétamol - Thiocolchicoside

DULASTAN®

Boîte de 20 comprimés

دولا ستان

ملصق من 20 قرصاً

de prendre ce médicament.

Demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes.

Recherchez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.

500 mg

2 mg

q.s.p..... 1 comprimé

37,00

DANS

Ce médicament est prescrit dans :

- Traitement symptomatique de la douleur d'origine rhumatismale ou musculaire en traumatologie et gynécologie.
- Traitement d'appoint des contractures douloureuses au cours :
 - des affections vertébrales dégénératives et des troubles statiques vertébraux : torticolis, dorsalgies, lombalgie,
 - des affections traumatologiques et neurologiques (avec spasticité).

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :

- d'hypersensibilité au thiocolchicoside ou au paracétamol,
- de grossesse,
- d'allaitement,
- d'insuffisance hépatocellulaire,
- d'hypersensibilité à l'un des excipients du produit,
- chez l'enfant de moins de 15 ans.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique et/ou rénale, d'affections cardiaques ou pulmonaires, éviter les traitements prolongés.
- Pour éviter le risque de surdosage au paracétamol, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments.
- Le thiocolchicoside doit être administré avec prudence chez les patients épileptiques ou à risque de convulsions.
- En cas de diarrhée, prévez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la posologie.
- Éventuellement, ingérer les comprimés avec un pansement gastrique.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.
- Il est conseillé de consulter un médecin pour des traitements excédant 7 jours.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et de galactose, ou de déficit en lactose.

L'amidon de blé peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques au blé ainsi que des intolérances chez les personnes souffrant de maladies coeliaques.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

DULASTAN® peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

En cas de traitement avec des anticoagulants oraux, on peut l'administrer occasionnellement comme analgésique d'élection.

Examens paracliniques :

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose oxydase-peroxydase.

PS10406

SYNTHEMEDIC
22 rue zoubair bnoou al acoum roches
noires casablanca
INEXIUM

40 mg Cpr GR
Boite 14

641150MP/21NRQ P.P.V:123,60 DH

6 118001 020607

**INEXIUM® 40 mg,
comprimé
gastro-résistant
ésoméprazole**

إينكسيوم® 40 ملخ،
قرص صامد لحموضة
المعدة
ازومبرازول



۴۰ ملخ إينكسيوم
أزومبرازول
دواء معدة صائم
دواء معدة صائم
دواء معدة صائم

٤٠ ملخ إينكسيوم

AstraZeneca

PS10406

SYNTHEMEDIC
22 rue zoubair bnoou al acoum roches
noires casablanca
INEXIUM

40 mg Cpr GR
Boite 14

641150MP/21NRQ P.P.V:123,60 DH

6 118001 020607

**INEXIUM® 40 mg,
comprimé
gastro-résistant
ésoméprazole**

إينكسيوم® 40 ملخ،
قرص صامد لحموضة
المعدة
ازومبرازول



۴۰ ملخ إينكسيوم
أزومبرازول
دواء معدة صائم
دواء معدة صائم
دواء معدة صائم

٤٠ ملخ إينكسيوم

AstraZeneca

GROUPÉ RADIOLOGIQUE DE CASABLANCA

SCANNER - IRM

- ECHOGRAPHIE
- DOPPLER - DOPPLER ENERGIE
- RADIOLOGIE DENTAIRE



- SENOLOGIE
- STEREOTAXIE MAMMAIRE
- RADIODIAGNOSTIC

Centre d'imagerie médicale

Dr. K. Belyamani
Dr. H. Bengelloun
Dr. Z. Tazi chaoui

REFERENCE : 201028008 DATE : 28/10/2020

PATIENT BERREZZOUK SANAE

MEDECIN TRAITANT

EXAMENS REALISES IRM CERVICODORSO-LOMBAIRE

COMPTE RENDU

TECHNIQUE

Coupes sagittales T1 T2.

Coupes axiales T2 cervicales et lombaires.

RESULTATS

Pas d'anomalie de la charnière cervico occipitale.

Rectitude du rachis cervical.

Petite saillie C5-C6, médiane, comblant légèrement l'espace péri médullaire antérieur, sans compression médullaire ou radiculaire.

Le cordon médullaire dorsal est normal.

Le cône terminal est en place.

Le canal lombaire est de dimensions normales.

Pas de signe de conflit disco radiculaire aux différents étages lombaires examinés.

A noter un petit angiome en D6.

Signé :

DR. K. BELYAMANI

Docteur BEL YANNI Khalid
RADIOLOGIE
CVA
9, Rue Franklin
CASABLANCA

GROUPE RADIOLOGIQUE DE CASABLANCA

SCANNER - IRM

- ECHOGRAPHIE
- DOPPLER - DOPPLER ENERGIE
- RADIOLOGIE DENTAIRE



- SENOLOGIE
- STEREOTAXIE MAMMAIRE
- RADIODIAGNOSTIC

Centre d'imagerie médicale

Dr. K. Belyamani

Dr. H. Bengelloun

Dr. Z. Tazi chaoui

REFERENCE : 201028008

DATE :

28/10/2020

PATIENT BERREZZOUK SANAE

MEDECIN TRAITANT

EXAMENS REALISES IRM CERVICODORSO-LOMBAIRE

COMPTE RENDU

TECHNIQUE

Coupes sagittales T1 T2.

Coupes axiales T2 cervicales et lombaires.

RESULTATS

Pas d'anomalie de la charnière cervico occipitale.

Rectitude du rachis cervical.

Petite saillie C5-C6, médiane, comblant légèrement l'espace péri médullaire antérieur, sans compression médullaire ou radiculaire.

Le cordon médullaire dorsal est normal.

Le cône terminal est en place.

Le canal lombaire est de dimensions normales.

Pas de signe de conflit disco radiculaire aux différents étages lombaires examinés.

A noter un petit angiome en D6.

Signé :

DR. K. BELYAMANI

Docteur BEL YAMANI Khalid
RADIOLOGUE
CVA
Franklin Rezaie M.D.
9, Rue Franklin Rezaie M.D.
CASABLANCA