

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèse :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Déclaration : contact@mupras.com
Mise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

6 : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 052226

ND: 47021

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 4391 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : BERRADA ASSIA - Retraitée

Date de naissance : 21/02/1946

Adresse : 26 Bd Mohammed VI, Casablanca

Tél. : 066 113 47 23 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Professeur Hassan EL GHOMARI
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition
Abdelmoumen Center Angle Boulevard Anoual
et Abdelmoumen N° 313 - Casa - Tél : 05 22 88 14 11

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : BERRADA ASSIA Age : 56

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète + Neuropathie + HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : + Allergie

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa

Le : 10/11/20

Signature de l'adhérent(e) :

[Signature]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/11/2020			300 DM	Professeur Hassan EL GHOMRI Spécialiste en Endodontologie et Nutrition Abdelmoumen Center Angle Boulevard Anouar 23, Casablanca - Tél: 05 22 86 14 11

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Internationale SASALANCA SARL AU Rue Centrale (Markazid) Hassali - CASABLANCA	05/11/2020	1929,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
					</	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'...

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> </table>		H	H	25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H	H																
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
			DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'...

Docteur Hassan EL GHOMARI

Professeur à la F.M.P.C

Spécialiste en Endocrinologie - Diabétologie
Nutrition & Croissance

Ancien Attaché à l'hôpital Saint Luc
de Montréal - Canada



الدكتور حسن الغماري

أستاذ جامعي بكلية الطب والصيدلة
أخصائي أمراض الغدد - داء السكري
التغذية والنمو
طبيب سابقا بمستشفى سان لوك
مونترéal - كندا

Casablanca, le : 05 - 11 - 20 20 : الدار البيضاء، في

Mme BERRADA Assia

MIXTARD 30

196,50 32 ui matin - 18 ui soir pendant 3 Mois

NOVONORM 2 MG

20,80 x6 0 - 1 - 0 pendant 3 Mois

GLUCOPHAGE 500 MG

1 - 1 - 1 pendant 3 Mois

D CURE FORTE 100 000

1 amp / mois pendant 3 mois

VITANEVRIL FORT

136,50 x3 2 - 0 - 2 pendant 1 Mois

ALYSE 25 MG

90,50 1 - 0 - 1 pendant 2 Mois

XYSALL

83,10 x3 1 cp / jour pendant 3 Mois

TENORMINE 100 MG

150,10 x3 1/2 - 0 - 1/2 pendant 3 Mois

VASTAREL 35MG

40,30 1 - 0 - 1 pendant 3 Mois

XANAX 0.5 MG

1/2 cp le soir pendant 3 Mois

1929,20

PHARMACIE INTERNATIONALE
DE CASABLANCA SARL

2-4, Rue Centrale (Markazja)

Abdelmoumen Center

Abdelmoumen Center

Abdelmoumen Center

Abdelmoumen Center

Abdelmoumen Center

Abdelmoumen Center

مركز عبد المومن، زاوية شارع أنوال وشارع عبد المومن، الفاتح رقم 313 - الدار البيضاء
Adelmoumen Center, Angle Bd. Anoual et Bd. Abdelmoumen, 3^{ème} étage - N° 313 - Casablanca

الهاتف : 05 22 86 37 44 / 05 22 86 14 14 - البريد الإلكتروني : hassanelghomari@yahoo.fr

N° INP : 091028506 - ICE : 001663750000032

Xyzall[®]


5 mg, comprimé pellicu

- Comprimé nu :** cellulose microcristalline, lactose monohydraté, silice collo
Pelliculage : Opadry Y-1-7000 [hypromellose (E 464), dioxyde de ti

Ce médicament se présente sous la forme de comprimé pelliculé, boîte d'anti-allergique indiqué dans le traitement des symptômes associés à l'

EXP. CO. 2001

P.P.V. 95-50



Xyzall 5 mg

28 comprimés pelliculés

Non-embourgeoisé A&M



6 118000 021599

Xyzall[®]


5 mg, comprimé pellicu

- Comprimé nu :** cellulose microcristalline, lactose monohydraté, silice collo
Pelliculage : Opadry Y-1-7000 [hypromellose (E 464), dioxyde de ti

Ce médicament se présente sous la forme de comprimé pelliculé, boîte d'anti-allergique indiqué dans le traitement des symptômes associés à l'

EXP. CO. 2001

P.P.V. 95-50



28 comprimés pelliculés



Non-embourgeoisé A&M



6 118000 021599

Xyzall[®]


5 mg, comprimé pellicu

- Comprimé nu :** cellulose microcristalline, lactose monohydraté, silice collo
Pelliculage : Opadry Y-1-7000 [hypromellose (E 464), dioxyde de ti

Ce médicament se présente sous la forme de comprimé pelliculé, boîte d'anti-allergique indiqué dans le traitement des symptômes associés à l'

EXP. CO. 2001

P.P.V. 95-50



Xyzall 5 mg

28 comprimés pelliculés



Non-embourgeoisé A&M



6 118000 021599

غير أنه عليك الانتباه بنوع خاص إذا كنت تتناول غلوكوفاج مع أدوية أخرى ضد السكري والتي قد تسبب هي انخفاض معدل السكر في الدم (مثل السلغاميدات المحفزة لمعدل السكر في الدم، الإنسولين، المغليتينيدات). أعراض انخفاض معدل السكر في الدم هي بنوع خاص الإحساس بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، الاضطرابات البصرية، صعوبة التمكن من المشي. استخدم آلة إذا أمكن.

عليك

مراعاة
بدنية

ة ب
معية

بين 1 و
ليب، علما

20,80

مع أو 850 مغ من غلوكوفاج مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. الجرعة اليومية القصوى هي 3000 مغ متوزعة على ثلاث دفعات.

عند المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي مع DFG ما بين 45 و 60 مل/ دقيقة، الجرعة الأولية هي 500 ملغ أو 850 ملغ غلوكوفاج مرة واحدة في اليوم. الجرعة القصوى هي 1000 ملغ/ اليوم، في جرعتين مختلفتين. وظيفة الكلي يجب أن تراقب عن كثب (كل 3-6 أشهر). إذا كنت تتناول الإنسولين أيضا، سيصف لك الطبيب الجرعة الواجب تناولها من غلوكوفاج.

المراقبة

- سيراقب الطبيب بصورة منتظمة معدل السكر في الدم لديك وسيضبط الجرعة التي ستتناولها من غلوكوفاج تبعا لمعدل السكر في الدم. عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة. إن ذلك مهم بنوع خاص لدى الأطفال ولدى المراهقين وكذلك لدى المسنين. سيراقب الطبيب أيضا مرة في السنة على الأقل حالة عمل كليتيك، قد يكون من الضروري إجراء عدة فحوصات إذا كنت مسنا أو في حالة خلل وظيفة كليتك.

طريقة تناول غلوكوفاج

غير أنه عليك الانتباه بنوع خاص إذا كنت تتناول غلوكوفاج مع أدوية أخرى ضد السكري والتي قد تسبب هي انخفاض معدل السكر في الدم (مثل السلغاميدات المحفزة لمعدل السكر في الدم، الإنسولين، المغليتينيدات). أعراض انخفاض معدل السكر في الدم هي بنوع خاص الإحساس بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، الاضطرابات البصرية، صعوبة التمكن من المشي. استخدم آلة إذا أمكن.

عليك

مراعاة
بدنية

ة ب
معية

بين 1 و
ليب، علما

20,80

مع أو 850 مغ من غلوكوفاج مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. الجرعة اليومية القصوى هي 3000 مغ متوزعة على ثلاث دفعات.

عند المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي مع DFG ما بين 45 و 60 مل/ دقيقة، الجرعة الأولية هي 500 ملغ أو 850 ملغ غلوكوفاج مرة واحدة في اليوم. الجرعة القصوى هي 1000 ملغ/ اليوم، في جرعتين مختلفتين. وظيفة الكلي يجب أن تراقب عن كثب (كل 3-6 أشهر). إذا كنت تتناول الإنسولين أيضا، سيصف لك الطبيب الجرعة الواجب تناولها من غلوكوفاج.

المراقبة

- سيراقب الطبيب بصورة منتظمة معدل السكر في الدم لديك وسيضبط الجرعة التي ستتناولها من غلوكوفاج تبعا لمعدل السكر في الدم. عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة. إن ذلك مهم بنوع خاص لدى الأطفال ولدى المراهقين وكذلك لدى المسنين. سيراقب الطبيب أيضا مرة في السنة على الأقل حالة عمل كليتيك، قد يكون من الضروري إجراء عدة فحوصات إذا كنت مسنا أو في حالة خلل وظيفة كليتك.

طريقة تناول غلوكوفاج

غير أنه عليك الانتباه بنوع خاص إذا كنت تتناول غلوكوفاج مع أدوية أخرى ضد السكري والتي قد تسبب هي انخفاض معدل السكر في الدم (مثل السلغاميدات المحفزة لمعدل السكر في الدم، الإنسولين، المغليتينيدات). أعراض انخفاض معدل السكر في الدم هي بنوع خاص الإحساس بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، الاضطرابات البصرية، صعوبة التمكن من المشي. استخدم آلة إذا أمكن.

عليك

مراعاة
بدنية

ة ب
معية

بين 1 و
ليب، علما

20,80

مع أو 850 مغ من غلوكوفاج مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. الجرعة اليومية القصوى هي 3000 مغ متوزعة على ثلاث دفعات.

عند المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي مع DFG ما بين 45 و 60 مل/ دقيقة، الجرعة الأولية هي 500 ملغ أو 850 ملغ غلوكوفاج مرة واحدة في اليوم. الجرعة القصوى هي 1000 ملغ/ اليوم، في جرعتين مختلفتين. وظيفة الكلي يجب أن تراقب عن كثب (كل 3-6 أشهر). إذا كنت تتناول الإنسولين أيضا، سيصف لك الطبيب الجرعة الواجب تناولها من غلوكوفاج.

المراقبة

- سيراقب الطبيب بصورة منتظمة معدل السكر في الدم لديك وسيضبط الجرعة التي ستتناولها من غلوكوفاج تبعا لمعدل السكر في الدم. عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة. إن ذلك مهم بنوع خاص لدى الأطفال ولدى المراهقين وكذلك لدى المسنين. سيراقب الطبيب أيضا مرة في السنة على الأقل حالة عمل كليتيك، قد يكون من الضروري إجراء عدة فحوصات إذا كنت مسنا أو في حالة خلل وظيفة كليتك.

طريقة تناول غلوكوفاج

غير أنه عليك الانتباه بنوع خاص إذا كنت تتناول غلوكوفاج مع أدوية أخرى ضد السكري والتي قد تسبب هي انخفاض معدل السكر في الدم (مثل السلغاميدات المحفزة لمعدل السكر في الدم، الإنسولين، المغليتينيدات). أعراض انخفاض معدل السكر في الدم هي بنوع خاص الإحساس بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، الاضطرابات البصرية، صعوبة التمكن من المشي. استخدم آلة إذا أمكن.

عليك

مراعاة
بدنية

ة ب
معية

بين 1 و
ليب، علما

20,80

مع أو 850 مغ من غلوكوفاج مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. الجرعة اليومية القصوى هي 3000 مغ متوزعة على ثلاث دفعات.

عند المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي مع DFG ما بين 45 و 60 مل/ دقيقة، الجرعة الأولية هي 500 ملغ أو 850 ملغ غلوكوفاج مرة واحدة في اليوم. الجرعة القصوى هي 1000 ملغ/ اليوم، في جرعتين مختلفتين. وظيفة الكلي يجب أن تراقب عن كثب (كل 3-6 أشهر). إذا كنت تتناول الإنسولين أيضا، سيصف لك الطبيب الجرعة الواجب تناولها من غلوكوفاج.

المراقبة

- سيراقب الطبيب بصورة منتظمة معدل السكر في الدم لديك وسيضبط الجرعة التي ستتناولها من غلوكوفاج تبعا لمعدل السكر في الدم. عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة. إن ذلك مهم بنوع خاص لدى الأطفال ولدى المراهقين وكذلك لدى المسنين. سيراقب الطبيب أيضا مرة في السنة على الأقل حالة عمل كليتيك، قد يكون من الضروري إجراء عدة فحوصات إذا كنت مسنا أو في حالة خلل وظيفة كليتك.

طريقة تناول غلوكوفاج

غير أنه عليك الانتباه بنوع خاص إذا كنت تتناول غلوكوفاج مع أدوية أخرى ضد السكري والتي قد تسبب هي انخفاض معدل السكر في الدم (مثل السلغاميدات المحفزة لمعدل السكر في الدم، الإنسولين، المغليتينيدات). أعراض انخفاض معدل السكر في الدم هي بنوع خاص الإحساس بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، الاضطرابات البصرية، صعوبة التمكن من المشي. استخدم آلة إذا أمكن.

عليك

مراعاة
بدنية

ة ب
معية

بين 1 و
ليب، علما

20,80

مع أو 850 مغ من غلوكوفاج مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. الجرعة اليومية القصوى هي 3000 مغ متوزعة على ثلاث دفعات.

عند المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي مع DFG ما بين 45 و 60 مل/ دقيقة، الجرعة الأولية هي 500 ملغ أو 850 ملغ غلوكوفاج مرة واحدة في اليوم. الجرعة القصوى هي 1000 ملغ/ اليوم، في جرعتين مختلفتين. وظيفة الكلي يجب أن تراقب عن كثب (كل 3-6 أشهر). إذا كنت تتناول الإنسولين أيضا، سيصف لك الطبيب الجرعة الواجب تناولها من غلوكوفاج.

المراقبة

- سيراقب الطبيب بصورة منتظمة معدل السكر في الدم لديك وسيضبط الجرعة التي ستتناولها من غلوكوفاج تبعا لمعدل السكر في الدم. عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة. إن ذلك مهم بنوع خاص لدى الأطفال ولدى المراهقين وكذلك لدى المسنين. سيراقب الطبيب أيضا مرة في السنة على الأقل حالة عمل كليتيك، قد يكون من الضروري إجراء عدة فحوصات إذا كنت مسنا أو في حالة خلل وظيفة كليتك.

طريقة تناول غلوكوفاج

غير أنه عليك الانتباه بنوع خاص إذا كنت تتناول غلوكوفاج مع أدوية أخرى ضد السكري والتي قد تسبب هي انخفاض معدل السكر في الدم (مثل السلغاميدات المحفزة لمعدل السكر في الدم، الإنسولين، المغليتينيدات). أعراض انخفاض معدل السكر في الدم هي بنوع خاص الإحساس بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، الاضطرابات البصرية، صعوبة التمكن من المشي. استخدم آلة إذا أمكن.

عليك

مراعاة
بدنية

ة ب
معية

بين 1 و
ليب، علما

20,80

مع أو 850 مغ من غلوكوفاج مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. الجرعة اليومية القصوى هي 3000 مغ متوزعة على ثلاث دفعات.

عند المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي مع DFG ما بين 45 و 60 مل/ دقيقة، الجرعة الأولية هي 500 ملغ أو 850 ملغ غلوكوفاج مرة واحدة في اليوم. الجرعة القصوى هي 1000 ملغ/ اليوم، في جرعتين مختلفتين. وظيفة الكلي يجب أن تراقب عن كثب (كل 3-6 أشهر). إذا كنت تتناول الإنسولين أيضا، سيصف لك الطبيب الجرعة الواجب تناولها من غلوكوفاج.

المراقبة

- سيراقب الطبيب بصورة منتظمة معدل السكر في الدم لديك وسيضبط الجرعة التي ستتناولها من غلوكوفاج تبعا لمعدل السكر في الدم. عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة. إن ذلك مهم بنوع خاص لدى الأطفال ولدى المراهقين وكذلك لدى المسنين. سيراقب الطبيب أيضا مرة في السنة على الأقل حالة عمل كليتيك، قد يكون من الضروري إجراء عدة فحوصات إذا كنت مسنا أو في حالة خلل وظيفة كليتك.

طريقة تناول غلوكوفاج

85591

100

ables

∞l

PPV: 49,60 DH

LOT: 20E25

EXP: 05/2023

trait pas mentionné dans cette notice.

Modalités d'emploi

Prendre Xanax 0,50 mg, comprimé sécable.
Surveiller les difficultés liées à une anxiété. Il
est indiqué les conduites pouvant aider à la

prise du médicament, n'augmentez pas la

dose, surtout en cas d'utilisation prolongée, un
excès semble favoriser la survenue de la

et ou non, y compris alcoolique.
ces facteurs favorisants.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien.

En cas d'apparition d'un phénomène de
douleurs ou en quelques jours, de signes
mais on peut observer également
une léthargie, un engourdissement
à la lumière ou au bruit.

En cas de

attendu dans la population générale.
Si vous prenez Xanax au zéro, les
mouvements actifs fœtaux et
Si vous prenez Xanax en fin de
nouveau-né pourrait être affecté
d'alimentation (troubles de la
agitation ou des tremblements).
A fortes doses, une insuffisance
du corps (hypothermie) pourra
Si votre bébé présente un ou plusieurs
naissances, contactez votre médecin.
Ce médicament passe dans le lait.
Demandez conseil à votre médecin.

10. Les effets secondaires
certains

Xanax 0,50mg

40130

- et de
autres questionnaires
médecin ou à votre pharmacien.
Conditions de prescription
- Tenir hors de la portée et en l'absence de
- Ne pas utiliser après la date de péremption
- La dernière date à laquelle

ainsi que des troubles
Le sujet âgé et le patient affaibli afin d'éviter les
ou de surdosage.

contactez le plus rapidement possible votre

être utilisés avec prudence chez le sujet âgé,
surtout en cas de troubles musculaires qui peuvent favoriser les
chez cette population.

Lot:

19 J 8 12

09.2021

Per:

PPV: 136DH50

A20012113/00

TENORMINE 100 mg

ATENLOL

Veillez lire attentivement
Si vous avez des
d'inform
Gardez cette notice

Composition qualitative
Aténolol 100 mg
Excipients : carbonate
sodium, stéarate de magnésium

Forme pharmaceutique
Comprimé pelliculé sécable

Classe pharmacothérapeutique
BETA-BLOQUANT/SEL

(Système cardio-vasculaire)
DANS QUELS CAS

Ce médicament est un « médicament de régulation cardio-vasculaire »

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants :

- hypertension artérielle
- prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine
- après un infarctus du myocarde
- certains troubles du rythme

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement).
- insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement).
- choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque).
- bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque).
- angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie), (variété de crises d'angine de poitrine).
- maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire).
- bradycardie importante (< 45-50 battements par minute), (ralentissement du rythme cardiaque).

83,10

100 mg

تنورمين



TENORMINE 100 mg

ATENLOL

Veillez lire attentivement
Si vous avez des
d'inform
Gardez cette notice

Composition qualitative
Aténolol 100 mg
Excipients : carbonate
sodium, stéarate de magnésium

Forme pharmaceutique
Comprimé pelliculé sécable

Classe pharmacothérapeutique
BETA-BLOQUANT/SEL

(Système cardio-vasculaire)
DANS QUELS CAS

Ce médicament est un « médicament de régulation cardio-vasculaire »

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants :

- hypertension artérielle
- prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine
- après un infarctus du myocarde
- certains troubles du rythme

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement).
- insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement).
- choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque).
- bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque).
- angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie), (variété de crises d'angine de poitrine).
- maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire).
- bradycardie importante (< 45-50 battements par minute), (ralentissement du rythme cardiaque).

83,10

100 mg

تنورمين



TENORMINE 100 mg

ATENLOL

Veillez lire attentivement
Si vous avez des
d'inform
Gardez cette notice

Composition qualitative
Aténolol 100 mg
Excipients : carbonate
sodium, stéarate de magnésium

Forme pharmaceutique
Comprimé pelliculé sécable

Classe pharmacothérapeutique
BETA-BLOQUANT/SEL

(Système cardio-vasculaire)
DANS QUELS CAS

Ce médicament est un « Beta-bloquant ».

Le médicament est préconisé dans les cas suivants :
système sympathique de régulation cardio-vasculaire.

- hypertension artérielle
- prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine
- après un infarctus du myocarde
- certains troubles du rythme

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement).

- insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement).

- choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque).
- bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque).

- angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie), (variété de crises d'angine de poitrine).

- maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire).

- bradycardie importante (< 45-50 battements par minute), (ralentissement du rythme cardiaque).

83,10

100 mg

تنورمين



الرجاء الرجوع الى الطبيب المعالج
في حالة الشعور بالآثار الجانبية

la réponse du patient au



NovoNorm®

0,5 mg c

1 mg co

2 mg cc

NovoNorm®
2mg
90 comprimés
PPV: 196 DH 50



Répaglinide

Composition qualitative

NovoNorm® contient du répaglinide comme
autres composants sont mentionnés dans Liste des excipients

Une baisse de la glycémie dépendante de la dose a été mise en évidence chez les patients diabétiques de type 2 ayant reçu des doses de répaglinide comprises entre 0,5 et 4 mg. Les résultats des études cliniques ont montré que, pour un résultat optimal, le répaglinide doit être administré en rapport avec les repas principaux (administration préprandiale). Les doses sont

0
8-1785-73-210-1
d'insuline par le pancréas, un effet qui dépend du bon fonctionnement des cellules β des îlots pancréatiques. Le répaglinide ferme les canaux potassiques sensibles à l'ATP sur la membrane des cellules β via une protéine cible différente des cellules β. Les cellules β sont ainsi dépolarisées, l'ouverture des canaux calciques. L'augmentation du calcium induit alors une sécrétion d'insuline. Effets pharmacodynamiques
Chez des patients atteints de diabète de type 2, l'insulinothérapie à un repas est survenue 30 minutes avant le repas. Ceci s'explique par l'effet oral d'une dose de répaglinide. Ceci s'explique par l'effet hypoglycémiant tout au long de la période d'exposition au repas. Les taux plasmatiques d'insuline élevés d'insuline n'ont pas persisté, ont été relevés chez les patients diabétiques de type 2.

que et médical attentif doit être
spéciales et précautions d'emploi).
te de clopidogrel (dose de charge de
YP2C8, a multiplié par 5,1 l'exposi-
e), et l'administration continue (dose
multiplié par 3,9 l'exposition au répagli-
on, faible et significative, des
observée. Si le répaglinide et le clopi-
nitance, une surveillance clinique
rote de la glycémie doivent être
e spéciales et précautions d'emploi).
masquer les symptômes de
nte de cimétidine, de nifédipine,
atine, tous substrats du CYP3A4,
s affecté de façon significative les
ques du répaglinide.
et cliniquement pertinent sur les
ues à l'état d'équilibre de la
ou de la warfarine administrées à
aucun ajustement de la posologie
essaire en cas d'administration