

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles


- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 0 Réclamation | contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | adhésion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-536553

ND: 4781

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule :	5581	Société :	
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
SENHAJI ASSEULATIF			
Nom & Prénom :			
Date de naissance :			
03 12 1957			
Adresse : Roudate lot AL Boustante 577 C3 n° 15			
Tél. : 0644 71 44 5x Total des frais engagés : Dhs			

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
 <p>Dr. Jamel RAHIB Médecin Généraliste Echographie Gynéco-Obstétrique Av. Prince Moulay Abdellah Immeuble Ben Youssef Tel: 05 27 20 45 45</p>			
Date de consultation : 10 NOV. 2020			
Nom et prénom du malade : M. SENAYASI JAFAR BEN ABDELLAH			
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Companion <input type="checkbox"/> Enfant			
Nature de la maladie : Off. Age 64			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements suivants à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) :




Dr. Jamel RAHIB
Médecin Généraliste
Echographie Gynéco-Obstétrique
Av. Prince Moulay Abdellah
Immeuble Ben Youssef
Tel: 05 27 20 45 45



19 NOV. 2020



ACCUEIL

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
0 NOV 2020			135,00	 Dr. Jansal RAHIM Médecine Générale Future Optique G. Inc. 1000, 4th Avenue Imm. Av. France N° 1000 Tel: Bon: 433-4333

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	10/11/2020	683,00

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES																						
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.																						
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF																						
SOINS DENTAIRES 	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>																		
				COEFFICIENT DES TRAVAUX																		
				MONTANTS DES SOINS																		
				DEBUT D'EXECUTION																		
				FIN D'EXECUTION																		
				ODF PROTHÉSES DENTAIRES 																		
				DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>01432650</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">D</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">35533411</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">11433553</td> </tr> </table>					H	G	25533412	01432650	00000000	00000000	D		B		35533411		11433553	
				H	G																	
				25533412	01432650																	
				00000000	00000000																	
D																						
B																						
35533411																						
11433553																						
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel Therapeutique, nécessaire à la profession																						
COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> DATE DU DEVIS <input type="text"/> DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>																						

Dr Jamal RAHIB
Médecine Générale
ECHOGRAPHIE GENERALE

Lauréat de la Faculté de Médecine de Casablanca
DU de GERONTOLOGIE- GÉRIATRIE
de l'université de Bordeaux (France)

الدكتور جمال رحيب
الطب العام
الفحص بالصدى الصوتي
خريج كلية الطب بالدار البيضاء
طب و أمراض الشيخوخة
من جامعة بوردو (فرنسا)

Sur Rendez-vous

Marrakech, le 10 NOV 2020 مراكش في

Mr. SENYAKO WATIE
1) 98,30 x 5 AB JELLAF
A Urografil → 3 ml
49,80 SV 1 l → 3 ml
2) Flegyl → 5 ml
60,00 SV 1 l → 5 ml
3) Enterosgel → AB
Sen → 5 ml

شارع مولاي عبد الله (شارع اسفي سابقا) عمارة ابن الرايس شقة رقم 1 (قرب صيدلية القعده و مقهى
امبكتور) مراكش الهاتف: العيادة 05 24 43 32 33 المحمول : 06 66 10 28 83
Av. Prince Moulay Abdellah, Imm. Ben Rais, Appt N°1 (près de la pharmacie Kaadoud)
Tél.: Cabi.net : 05 24 43 32 33 GSM : 06 66 10 28 83 - Patente N°: 45314568

4/17 ^{147.20} Nine West gift

34,50 Dals

9 Shawnee, F

28-11-2016

683,00

12/15
100082

PPV 34DH50

PER 11-21

LOT E2143

احتياطات الإستعمال :

لا يستعمل استعمالاً مطولاً بدون
استشارة طبية.

الإستعمال المطول و بمقادير قوية
غير موصى به في حالة ضعف الكلى
المزمن و المتقدم.

عاجة تحتوى على 20 كيساً



®

سل

LOT : 7051
UT. AV : 12-24
P.P.V : 47 DH 20

at
utine

vant d'utiliser ce médicament.
ne, demandez plus d'informations
le donnez jamais à quelqu'un
pourra lui être nocif.
remarquez un effet indésirable,
n'écoulez pas au pharmacien.
le, flacon de 250ml.

COMPOSITION

Substance active : Trimébutine

Nom du médicament	Substance active	Excipients
TRIMEDAT® 0,787% granulés pour suspension buvable	Trimébutine base.....0,787g	q.s.p. 100 g
TRIMEDAT® 150 mg gélules	Trimébutine malate.....150mg par gélule	q.s.p. 1 gélule

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antispasmodique musculotrope.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique des douleurs, des troubles du transit et de l'inconfort intestinal liés aux troubles fonctionnels intestinaux.

CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais TRIMEDAT® :

- La trimébutine est contre-indiquée chez l'enfant de moins de 2 ans.
- En cas d'hypersensibilité à la trimébutine ou à l'un des autres composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Mises en garde spéciales

TRIMEDAT® 0,787% granulés pour suspension buvable

En raison de la présence du saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies métaboliques rares).

TRIMEDAT® 0,787% granulés pour suspension buvable, flacon de 250 ml contient du parahydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

Précautions d'emploi

TRIMEDAT® 0,787% granulés pour suspension buvable

5 ml de la suspension reconstituée contient 3 g de saccharose.

Il faut en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

Il est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au saccharose (maladie héréditaire).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

INTERACTIONS AVEC LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

Sans objet.

INTERACTIONS AVEC LES PRODUITS DE PHYTOTHERAPIE OU THERAPIES ALTERNATIVES

Sans objet.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitemt

Il est préférable de ne pas prendre ce médicament si vous allaitez. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

SPORTIFS

Sans objet.

EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES OU A UTILISER DES MACHINES

Sans objet.

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

TRIMEDAT® 0,787% granulés pour suspension buvable en flacon de 250 ml contient du saccharose et du parahydroxybenzoate de méthyle.

POSOLOGIE, MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Posologie

DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

TRIMEDAT® 150 mg gélules :

La posologie usuelle est de 300 mg par jour en 2 prises. Exceptionnellement, cette posologie peut être augmentée jusqu'à 600 mg par jour en 2 à 3 prises.

Le traitement doit être de courte durée.

TRIMEDAT® 0,787% granulés pour suspension buvable

Adultes :

1 cuillère à soupe 3 fois par jour au cours des principaux repas.

Exceptionnellement, cette posologie peut être augmentée jusqu'à 6 cuillères à soupe par jour.

Enfants :

- De 2 ans à 5 ans : 1 cuillère à café 3 fois par jour

- Au-dessus de 5 ans : 2 cuillères à café 3 fois par jour.

Mode et voie d'administration :

TRIMEDAT® 150 mg gélules :

Voie orale.

Les gélules doivent être avalées avec un verre d'eau.

TRIMEDAT® 0,787% granulés pour suspension buvable

Voie orale.

PRÉPARATION DE LA SUSPENSION BUVABLE INSTANTANÉE

- Introduire de l'eau minérale non gazeuse ou bouillie refroidie par étapes jusqu'au col du flacon.

- Fermer et agiter le flacon au fur et à mesure jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

- la suspension est prête à l'emploi

- il convient d'agiter le flacon avant chaque utilisation.

SURDOSE

Si vous avez pris plus de TRIMEDAT® 150 mg gélules, ou TRIMEDAT® 0,787% granulés pour suspension buvable que vous n'auriez dû :
EN CAS DE SURDOSE, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

INSTRUCTIONS EN CAS D'OMISSION D'UNE OU DE PLUSIEURS DOSES

Sans objet.

RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

Sans objet.

EFFECTS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, TRIMEDAT® est susceptible d'avoir des effets indésirables bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Rares réactions cutanées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

DECLARATION DES EFFETS INDESIRABLES :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

CONSERVATION

TRIMEDAT® 150mg gélules :

Pas de précautions particulières de conservation

TRIMEDAT® 0,787% granulés pour suspension buvable :

Avant ouverture : Pas de précautions particulières de conservation.

Après reconstitution : La suspension buvable ne doit pas être conservée plus de 4 semaines à température ambiante.

Ne pas laisser à la portée des enfants

CONDITIONS DE DELIVRANCE

Liste II

PEREMPTION

Ne pas utiliser TRIMEDAT® après la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Août 2017

Laboratoires Pharma 5

21 Rue des Asphodèles - Casablanca - Maroc

Site de fabrication: Zone Industrielle Ouled Saleh - Bouskoura - Maroc

Yasmine LAHLOU FILALI - Pharmacien Responsable

PHARMA 5

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Enterogermina, susp b 10 ml
P.P.V: 60,00 DH
5 118001 081653

planning to become pregnant, or are breast-feeding, talk to your doctor or pharmacist

and lactation.

in the ability to drive or operate machinery.

Read this leaflet or as instructed by your doctor or pharmacist. Check with your doctor or

during the day.

Take 1-2 vials per day.

Oral use only. Do not inject or administer in any other way [see "Warnings and Precautions".]

Shake well before use. To open the vial, unscrew the top part and remove it.



Take the contents as it is, or dilute it in water or any other beverage (for example: milk, tea, orange juice). Once open, take the medicine within a short period of time in order to avoid the alteration of medicine.

Capsules

Adults: 2-3 capsules daily.

Children: 1-2 capsules daily.

Swallow the capsules with a sip of water or other beverages. If you have difficulty swallowing the hard capsules (especially in younger children), use the vials.

Warning: do not exceed the indicated doses without your doctor's advice. Use only for short periods of treatment. Consult your doctor if the disorder occurs repeatedly or if you have noticed a recent change of any kind in its characteristics.

If you take more Enterogermina than you should

In case of accidental ingestion/administration of an overdose of Enterogermina, immediately notify your doctor or go to the nearest hospital.

If you forget to take Enterogermina

Do not take a double dose to make up for a missed dose.

Proper and regular intake of this medicine promotes a better therapeutic effect.

If you stop taking Enterogermina

No particular effects have been reported, apart from the lack of therapeutic effect.

If you have any doubts regarding the use of this medicine, speak to your doctor or pharmacist.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

As with all medicines, this medicine can cause undesirable effects, although not everyone is affected.

There have been reports of allergic reactions (hypersensitivity), including skin rash, urticaria and angioedema.

Reporting of undesirable effects

If you experience any undesirable effects, including those not listed in this leaflet, please speak to your doctor or pharmacist.

By reporting undesirable effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. HOW TO STORE ENTEROGERMINA

KEEP THIS MEDICINE OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the package after "Exp.". The expiry date refers to the last day of

FLAGYL® 500

Métronidazole

Comprimé pelliculé.

PER... 11-2024
LOT : 196014

FLAGYL 500 mg
CP PEL B20

P.P.V : 49DH80



SANOFI

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) Dénomination :

FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé.

b) Composition :

Métronidazole 500mg.
Excipients : amidon de blé, povidone K 30, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 20000, pour un comprimé pelliculé.

c) Forme pharmaceutique et présentation :

Comprimé pelliculé, boîte de 20.

d) Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTIBIOTIQUES ANTIBACTÉRIENS ANTI-PARASITAIRES de la famille des nitro-5- imidazolés.

2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines infections à germes sensibles (bactéries, parasites).

3. ATTENTION !

a) Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament :

- Ce médicament ne doit jamais être utilisé dans les cas suivants :
- allergie aux médicaments de la famille des imidazolés (famille d'antibiotiques à laquelle appartient le métronidazole),
- intolérance ou allergie au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten).
- Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé en association avec le disulfiram ou l'alcool (boissons alcoolisées, médicaments contenant de l'alcool).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Mises en garde spéciales :

• La prise de boissons alcoolisées durant ce traitement est déconseillée en raison du risque de réactions à type de rougeur du visage, chaleur, vomissements, accélération du rythme cardiaque.

• Il convient d'interrompre le traitement et de consulter un médecin en cas d'apparition d'une mauvaise coordination des mouvements volontaires, apparition de vertiges ou de confusion.

• Attention à la prise de ce médicament si vous souffrez de troubles nerveux sévères, chroniques ou qui évoluent.

• La prise de ce comprimé est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans car il peut avaler de travers et s'étouffer.

c) Précautions d'emploi :

• En cas d'antécédents de troubles sanguins, de traitement à forte dose et/ou de traitement prolongé, votre médecin peut être amené à contrôler régulièrement par des examens sanguins votre numération formule sanguine.



6 118000 060062

ngé, il est important de prévenir survenue de troubles nerveux (fourmillements, difficulté à coordonner des mouvements, vertiges, convulsions).

EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, et notamment avec le disulfiram et l'alcool, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

La prise de ce médicament peut perturber les résultats de certains examens de laboratoire (recherche de tréponèmes) ; le métronidazole peut en effet faussement positiver un test de Nelson.

e) Grossesse - Allaitement :

En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. Il convient cependant de demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Eviter l'allaitement pendant la prise de ce médicament.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSEZ OU DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

f) Conducteurs et utilisateurs de machines :

L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de vertiges, de confusion, d'hallucinations ou de convulsions, attachés à l'emploi de ce médicament.

g) Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients :
Amidon de blé (gluten).

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

a) Posologie :

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de six ans. Chez l'enfant de moins de six ans, il existe des formes pharmaceutiques plus adaptées.

La posologie dépend de l'âge et de l'indication thérapeutique. À titre indicatif, la posologie usuelle est :

- chez l'adulte : de 0,750 g/jour à 2 g/jour,
- chez l'enfant : 500 mg/jour à 20 - 40 mg/kg/jour.

Dans certains cas, votre partenaire doit être impérativement traité, qu'il présente ou non des signes cliniques.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

b) Mode et voie d'administration :

Voie orale.

• كالدبرات المياميسين
• قاتلة المكمر - مليئة من قطة
• كالدبرات المياميسين

الدراهم قبل تناول هذا الدواء.

إن كانت لديك أسلحة أخرى، إما كان لديك معلم، ألمزيد من المعلومات أو
تحتاج بهذه المعرفة، قد تساعد إلى فراغها من خطبة

غير من مسؤوليه، ومتى حد سقوط العصبة
إذا أضحي أحد الشاهزادات غير ملائكي، ففيها
غير من مسؤوليه، ومتى حد سقوط العصبة

مکالمہ ایجاد

30 لـ كيلو إيتامبراد بـ المسادة الماء بـ المعلان

رسائل نبا الطالب: السلاك الغوري استناداً إلى المقتضي، مثليل السلطنة، فرسان السلطنة

السمومات ذات التأثير المعلوم لا يدخل
مارادي المهدودين، أبديه ميلاد، ماتكر عول 8000 وشاتي إكتيد الشهان

2. المعدل العلجي أو ترميم المحتاط

الصنف: العسلاني العلاجي. الرمز التسويقي: AX03. الكمية: 500g. هذا الدواء مختار للأطباء.

3. دواعی الاستعمال

ପରିବହନ ବିଭାଗ

اللزم بخطرة بوصفة الطبيب

في بعض الحالات يمكن للطبيب أن يكفي توجيهها الجرعة
ويمكن بعد ذلك بدون رسمة طبية أن يكتفى بإذن من المريض.

إذا لاحظت أن تأثير المثيل 30 على فرق ملبيس قابل للكسر فهو أو أقل من ذلك، استثمر طبيتك أو

الطبقة الاجتماعية

يُنطَلِّعُ الْأَفْرَادُ مِنْ كَاسِ الْمَاءِ دَرْدَنْ مَعْنَهُمْ

يمكن للجريدة اليومية أن تقسم هلال اليوم أو تأخذ من الأفضل مسافة عند النوم.

مقدمة للعلاج النفسي - نظرية وتطبيقات

إنلزم بمنحة موصولة للطبيب، ولا يزولق أحد هذا الدوام بدون رأي الطبيب.

لـ "العمل الشفاف" 30 يوماً من أجل تحرير الأسرى.

الروايات المعاصرة في الأدب العربي

بصفة عامة، هذا الدواء لا يجب أن يستعمل في الحالات التالية، إلا في حالة رأى مضرار لمفاسير

وأستخدام مع الكحول (الماء المقطرة: التعاملات مع الجوية المجرى)
في حالة الم Urdu من المجرى المبتدأة الطبيب أو الصيدلي

٩ التأثيرات على المعلم

PPV 98.30DH
EXP 06/2023
LOT 200812

بيان الأصناف
الإعصاريات المائية
أذكار قدرة الله العظيم
من محبته للأذى
مفعولها
الإذن في العصا
مكروه العذاب
من الله لآياته العظيم
أذى من 25

٢٠١٣ - علية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة رقم ٣٠٣٣٣

لا ينبع بانتباوه على هذه التشرىء قبل تناول هذا الدواء.

إن كانت الجملة أسلمةً أخرى، فإن كان الجملة مثلاً الجملة المزدوجة من المدلولات أو الجملة المزدوجة المترددة، فتحتاج إلى فرازتها من حيث:

إذا أمست أبعدَ الشَّامِلَاتِ غَيْرَ الْمُغْلِقَاتِ فَوْهَا مُهْلِكًا لَا حَلَّتْ أَيْ تَائِدٌ غَيْرُ مُغْرِبٍ فِيهِ لَمْ يَذْكُرْ
عَذَّابَ مُنْسَبَهُ، وَهُنَّ مُدْعَوْنَ الْمُسْرِفُونَ

مكتبة الإسكندرية | أحدث إصدارات | مكتبة الإسكندرية | www.bibalex.org

نهايات الطلاق: السلك الفوري يستلزم العدديه، مثل السليل، فوصلات الكسوم

أحادي الميوردين إبريمولون، ماكروغول 8000 و تانسي إكسيد النيتان

2 المنهج العددي أو نرم المنهج

ن06AX03
هذا الدواء مضاد للأكتئاب
المنتفع المستدل العلاجي الشرجي العلاجي الكيميائي

3. دوامی الاستعمال

يُوصى هذا الدواء لعلاج النوبات الإكتابية.

النظام يندرج في المجموعة الموسّعة المطبّقة

لا تؤدي علاجك بدلاً رأيك طبعاً مثل لو ألمست بمخض
في بعض الحالات، يمكن لطريقك أن يكفي تدريجها
البرعمية

في جميع الحالات، التزام بمتطلبات طبيتك.
إذا لاحظت أنك تتحمل 30 سنت قرض طبيتك قبل المقرر أخرى أو أصعب، استشر طبيتك أو

المرصد لأنّي مستعمل طريقة الإيمان

عن طريق الماء ينبع من الأنهار حفاظاً على البيئة.

ويكون للأجرة التقويمية أن تسمى عدال اليوم أو تأخذ من الأفضل مثلاً عند اللوم

اللزام بتدوين ملخص الدروس في المدرسة، لا يتحقق أخذ هذا الدليل بدروز رأسي الطالب.

الطباطبائي

الدواي .. ١٢٠، ١١-١٠
الدواي .. ١٢٠، ١١-١٠

يُنْهَى عَمَّا يَعْلَمُ هَذَا الدِّرْوَاءُ لَا يَجِدُ أَنْ يَسْتَعْدِلُ فِي الْحَدَّالَاتِ الْمُتَلِّيَّةِ إِلَّا فِي حَالَةِ إِلَى مُضَادِ الْمُطَهِّرِ

استعمال مع الكحول (انظر الفقرة الفرعية الفاعلات مع أدوية المهدئ)
في حالة الملاطفة من العسرة لاستئصال المطين أو المصيل

٩٣٦٦

PPV 98.30DH
EXP 06/2023
LOT 200812

بيان الأصناف
الإعصاريات المائية
أذكار قدرة الله العظيم
من محبته للأذى
مفعولها
الإذن في العصا
مكروه العذاب
من الله لآياته العظيم
أذى من 25

كلوديرات المياميسين) 20
نسبة قابلة للكسر - مليء من
النمس، جناب الفم، جناب الماء.

الخلاع يانتهاه على هذه النشرة قبل تناول هذا الدواء.

إن كانت الجملة أسلطاً آخر، فما كان يدرك ذلك، لمزيد من المعلومات أو
تحفظ بهذه المعرفة، فد سمعت أن مارادونا من خطيبه.

غير من مسؤوليه، ومتى حد سقوط العصبة
إذا أضحي أحد الشاهزادات غير قادرًا على حملها أو لا يحلط
غير من مسؤوليه، ومتى حد سقوط العصبة

مکالمہ

السادسة المذكورة أعلاه، كل ذلك أثبت المتأسف في

رسائل نبا الطالب: السلطان العثماني، مظيل السلطان، فؤاد الثاني

السلطان رابع الشاهزاده المعظول لا يملك
هاري الهمبروجين، إمبراطور، ملك عز 8000 راتب

٢- العدل العدلي أو توسيع النشاط

المنفذ المستبدلي العلاجي. الرمز التشريحي العلاجي الكيميائي N06AX03 هذا الدواء مختار للأطباء

3. دواعی الاستعمال

16 CONVERSATION IN A CHINESE CLASSROOM

اللهم يسألك برحمتك وبرحمتك يا مهرب

في بعض الحالات يمكن للطبيب أن يكشف تدريجياً الجرعة التي يجب تناولها يومياً.

إذا لاحظت أن تأثير المثيل 30 على تردد مجلس قابل للكسر فهو أو أخفى، استشر طبيبك أو

طريقة الاستعمال [View details](#)

يُطلع الأفرادَ سُبْحَانَ كَلْمَسِينَ الْمَاءِ دُرْنَ مَعْنَفِهِ

يمكن للجريدة اليومية أن تقسم هلال اليوم أو تأخذ من الأفضل مسافة عند النوم.

مقدمة للعلاج النفسي - نظرية وتطبيقات

الترم بمقدمة المطلوب، لا توقيف أحد الدوام بدون رأي الطبيب.

لا تستعمل أبداً المثليل 30 ملليغ لمرض ملبيس قابل للتكسر **ولا يكتسب تأثيراً من حساسية الملازيم**، **أو المكونات الأخرى** **الملازيم** **في طبقة** "مك الـ

يصفه عامة، هذا الدواء لا يجب أن يستعمل في الحالات الشائنة، إلا في حالة رأى مختار لمطهير

و استعمال مع الكحول (انظر الفقرة المتعاملات مع ابتنية المدى) في حالة المشكك من المدرر أو المهدئ أو المهدئ.

التأثير على الطلاب طبعاً

PPV 98.30DH
EXP 06/2023
LOT 200812

- كالدبريات (المباشرين)
- 20 سنة قاتلة للкцион - علىه من
- جناب الفم.
- جناب المسم.

البلاغ بانتهائه على هذه النشرة قبل تناول مذاadro.

إذا كانت لديك أسلحة أخرى، إذا كان لديك مثل، إطار المزدوج من المعلومات أو المصطلحات، فاستخدمها، إذا من معرفتك من جدوى.

لقد تم وصف هذا الدواء أنه يشكل مشخصاً لا يتم بإعطائه لشخص آخر حتى في حال وجود

إذا أسمى حد التأثيرات غير المرغوب فيها خطاً أو لا يحتمل أي تأثير غير مرجوب فيه لم يذكر في هذه النشرة، لكنه المطابق أو المماثل.

١ مكونات الدواء

مبلغ 30 مليون دينار تبرعات المحسنين

السوانح ذات الطابع المعموري لا يوجد

هذا الدليل يقدّم مقداراً لإكتشاف
البيئة المائية في مصر من حيث
النوع والكم.

گفتگوی ایرانیان از ایران

▪ يوصى هذا الدواء لعلاج التهابات إيكناجية.

المرجع: [المرجع](#) (2010-2011)

لـ تـوقـفـ عـلـمـكـ بـدـقـنـ رـأـيـ طـرـنـ،ـ حـتـىـ لـأـخـسـسـ بـلـمـسـنـ

في جميع المدارس، رغم إنتهاء 30 مليون طلاب في المدارس، إلا أن احتفظت المدارس بـ 10% من طلابها.

طريقه الاستعمال
السبعين - ١٩٩٣

البتل الأفراص مع كأس من الماء دون ملئها

يمكن للجامعة البويرية ان تقسم هلال اليوم او تأخذ من الافضل مسماً عند النوم.

مقدمة العلاج - ١٠٢ - ١١٠ - ١٢٠ - ١٣٠ - ١٤٠ - ١٥٠ - ١٦٠ - ١٧٠ - ١٨٠ - ١٩٠ - ٢٠٠

إنتم سبطه بوصيتي للطهرين، لا ترافق أحد هذا الدارواه بدرن رامي الطهرين
في مجهوده العظيم للتزويه بشهادة يهودي طهرين.

5. مواطن الاستعمال

إذا كنت تعاني من حساسية المبايسرين أو أحد المكونات الأخرى الواردة في مقدمة "مكونات الأدوية" في طبقة

• مرض الكبد العدار

• استعمال مع الكحول (النظر المفرغة: النطافات مع أدوية أخرى)

في حالة الملك، فمن المفترضي استشارة الطبيب أو الصيدلي

PPV 98.30DH
EXP 06/2023
LOT 200812

يُعَلَّمُ بِالْمُنْتَهِيَّهُ عَلَى هَذِهِ التَّشْرِيَّهِ قَبْلَ تَنَاهُ عَنْهَا الدَّوَامُ

إن كانت الجملة أسلمةً أخرى، فإن كان الجملة مثلاً الجملة المزددة من المطلوبات أو الجملة المزددة المترددة، فنستخرج إلى ما وردتها من خطأ.

غير من مسؤوليه، ومتى حد سقوط العصبة
إذا أضحي أحد الشاهزادات غير ملوكه ففيها
غير من مسؤوليه، ومتى حد سقوط العصبة

مکالمہ ایجاد

30 لـ كيلو إيتامبراد بـ المسادة الماء بـ المعلان

رسائل نبا الطالب: السلاك الغوري استناداً إلى المقتضي، مثليل السلطنة، فرسان السلطنة

السمومات ذات التأثير المعلوم لا يدخل
مارادي المهدودين، أبديه ميلاد، ماتكر عول 8000 وشاتي إكتيد الشهان

2. المعدل العلجي أو ترميم المحتاط

الصنف: العسلاني العلاجي. الرمز التسويقي: AX03. الكمية: 500g. هذا الدواء مختار للأطباء.

3. دواعی الاستعمال

ପରିବହନ ବିଭାଗ ରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବହନ ବିଭାଗ

اللزم بخطرة بوصفة الطبيب

في بعض الحالات يمكن للطبيب أن يكفي توجيهها الجرعة
ويمكن بعد ذلك بدون رسمة طبية أن يكتفى بإذن من المريض.

إذا لاحظت أن تأثير المثيل 30 على فرق ملبيس قابل للكسر فهو أو أقل من ذلك، استثمر طريقك أو

الطبقة الاجتماعية

يُنطَلِّعُ الْأَفْرَادُ مِنْ كَاسِ الْمَاءِ دَرْدَنْ مَعْنَهُمْ

يمكن للجريدة اليومية أن تقسم هلال اليوم أو تأخذ من الأفضل مسافة عند النوم.

مقدمة للعلاج النفسي - نظرية وتطبيقات

الترم بمقدمة موصولة للطلاب، لا توقيف أحد الدوام بدون رأي الطبيب.

لا يستعمل أبداً العليل 30 على لفون مليس لابل للكسر
* لا يكتب: 30 من عباس العباس

الدراز، محمد، الكوكب العذاب، طه، بيروت، 1990.

بصفة عامة، هذا الدواء لا يجب أن يستعمل في الحالات التالية، إلا في حالة رأى مقدار لطيف

وأستخدام الكحول (انظر الفقرة المتعاملات مع انتوية المدري) في حالة الحال من المدروري استخدام المطهر أو المطهيل

التأثيرات على الطلاب عليها

PPV 98.30DH
EXP 06/2023
LOT 200812