

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèse dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 047081

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8482 Société : RAM

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : MOULGOURI Mustapha

Date de naissance : 4-3-1958

Adresse : *[illegible]*

Tél. 066 192 86 24 Total des frais engagés : 132 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 04 NOV. 2020

Nom et prénom du malade : Karim M. M. Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Dyslipémie + Emot - Urg

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 9/11/2020

Signature de l'adhérent(e) : *[Signature]*



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12 NOV 2020	Analys	1	\$	
04 NOV 2020	exam	1	lms	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	04/11/2020	52620

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	02/11/20	B440+R	6000H

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION




O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

OMNIPRATICIEN

Diplôme universitaire en diabétologie
 Diplôme universitaire en Diététique médicale et Nutrition
 Diplôme universitaire en échographie clinique
 Faculté de Médecine Montpellier France
 ELECTROCARDIOGRAMME
 Membre de la Société Francophone du Diabète
 sur rendez-vous

الطب العام

دبلوم جامعي في مرض السكري
 دبلوم جامعي في الحماية الطبية والتغذية
 دبلوم جامعي في الفحص بالصدى
 من كلية الطب مونبوليي - فرنسا
 التخطيط الكهربائي للقلب
 عضو الجمعية الفرونكوفونية لمرض السكري
 بالموعد

04 NOV. 2020

Casablanca, le..... في الدار البيضاء.

MF Khandouk Mouna

15940 x3

Bestor (S) 407

Amir 203

24 x 2

Mynap (S) 1002

1M 400

Tanfajil 2

Beckm 2

171

Dr. Hassan Chahid
 146, Rue Moulay Idriss Hay Baladia - Casablanca
 Tél.: 05 22 21 73 64

Dr. Hassan CHAHID
 OMNIPRATICIEN - Echographie Clinique
 D.U. en Diabétologie
 146, Rue Moulay Idriss Hay Baladia - Casablanca
 (au dessus de la pharmacie "Hay Baladia")
 Tél.: 05 22 80 91 91

MYNAZOL® 150 mg

boîte de 1, 4 et 8 gélules
Fluconazole

241,00

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT :

MYNAZOL 150 mg, boîte de 1, 4 et 8 gélules

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Fluconazole (DCI) 150 mg pour une gélule

Excipients : Lactose monohydraté, amidon préagglutiné, laurilsulfate de sodium, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre.

Excipients à effet notoire : Lactose monohydraté

3. CLASSE PHARMACO THERAPEUTIQUE :

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : J02AC01

Mynazol fait partie d'un groupe de médicaments appelés « antifongiques ». La substance active est le fluconazole.

Mynazol 150 mg est utilisé pour traiter les infections dues à des champignons et peut également être utilisé pour vous empêcher de développer une infection à Candida. La cause la plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée Candida.

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Mynazol 150 mg est utilisé pour traiter les infections dues à des champignons et peut également être utilisé pour vous empêcher de développer une infection à Candida. La cause la plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée Candida.

Adultes

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les infections fongiques suivantes :

- Méningite à cryptocoques- infection fongique du cerveau,
- Coccidioidomycose- une maladie du système bronchopulmonaire, à une prothèse dentaire,
- Mycose génitale- infection du vagin ou du pénis,
- Infections cutanées - ex. pied d'athlète, herpès circiné, eczéma marginé de Hebra, infection des ongles.

Vous pourriez aussi recevoir du Mynazol 150 mg pour :

- Eviter la récurrence d'une méningite à cryptocoques,
- Eviter la récurrence d'une mycose de la muqueuse,
- Diminuer le risque de récurrence de mycose vaginale,
- Eviter de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement).

Enfants et adolescents (0 à 17 ans)

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les types suivants d'infections fongiques :

- Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge, à une prothèse dentaire,
 - Infections à Candida, retrouvées dans le sang, infections des organes (p.ex. cœur, poumons) ou des voies urinaires,
 - Méningite à cryptocoques- infection fongique du cerveau.
- Vous pourriez aussi recevoir du Mynazol 150 mg pour :
- Vous empêcher de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement),
 - Eviter la récurrence d'une méningite à cryptocoques.

5. POSOLOGIE :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les gélules ne sont pas indiquées chez l'enfant de moins de 6 ans, en raison de la forme pharmaceutique.

ATC		
Pg	cryptocoques	vous, vous pourriez vous sentir malade. Contactez vos soins urgences de l'hôpital le plus proche. Les effets indésirables peuvent être d'origine allergique.
	Pour éviter la récurrence d'une méningite à cryptocoques	200 mg par kg de poids corporel, une fois par jour pendant 14 jours.
	Pour traiter une coccidioidomycose	150 mg par kg de poids corporel, une fois par jour pendant 12 semaines.
	Pour traiter une infection fongique interne due à Candida	800 mg par kg de poids corporel, une fois par jour pendant 14 jours.
	Pour traiter une infection de la muqueuse buccale, de la gorge et de plaies dues à une prothèse dentaire	200 mg par kg de poids corporel, une fois par jour pendant 14 jours.
	Pour traiter une mycose de la muqueuse - la dose dépendant de la localisation de l'infection	50 mg par kg de poids corporel, une fois par jour pendant 14 jours.
	Pour éviter une infection de la muqueuse buccale et de la gorge	100 mg par kg de poids corporel, une fois par jour pendant 14 jours.
	Pour traiter une mycose génitale	150 mg par kg de poids corporel, une fois par jour pendant 14 jours.
	Pour diminuer le risque de récurrence de mycose vaginale	150 mg par kg de poids corporel, une fois par jour pendant 14 jours.
	Pour traiter une infection fongique de la peau et des ongles	50 mg par kg de poids corporel, une fois par jour pendant 14 jours.
	Pour éviter de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement)	200 mg par kg de poids corporel, une fois par jour pendant 14 jours.

Adolescents âgés de 12 à 17 ans

Respectez la posologie indiquée par votre médecin. Cette notice ne doit pas être utilisée pour diagnostiquer ou traiter une affection entraînant la formation de bulles ou de plaques sur la peau. Les signes de problèmes hépatiques comprennent :

Affection

Mycose de la muqueuse et infections de la gorge dues à Candida - la dose et la durée dépendent de la sévérité de l'infection et de sa localisation

Méningite à cryptocoques ou infections fongiques internes dues à Candida

Pour empêcher les enfants de développer une infection à Candida (si leur système immunitaire ne fonctionne pas correctement)

Enfants âgés de 0 à 4 semaines

Enfants âgés de 3 à 4 semaines :
Même posologie que ci-dessus mais à une posologie maximale est de 12 mg par kg de poids corporel, une fois par jour pendant 14 jours.

Enfants âgés de moins de 3 semaines :
Même posologie que ci-dessus mais à une posologie maximale est de 12 mg par kg de poids corporel, une fois par jour pendant 14 jours.

بيستور 5 ملغ و 10 ملغ و 20 ملغ م
قرص مغلف
روزوفاستاتين
علية من 30

036720 0622
PPV 159DH40

159,40

قم بقراءة هذه النشرة جيداً قبل استعمال هذا الدواء
احتفظ بهذه النشرة لأنه قد تحتاج إليها لاحقاً.
في حال كنت لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب
الصيدلي.

إن هذا دواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناءً على وصفة طبية. ولذا يجب عدم إعطائه لأي شخص حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وإن عانيت منها.
قم بالاتصال بطبيبك المعالج أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

مكونات هذه النشرة
ما هو بيستور وما هي دواعي استعماله.

قبل القيام باستعمال بيستور.

طريقة استخدام بيستور.

الأعراض الجانبية.

ظروف تخزين بيستور.

معلومات إضافية.

ما هو بيستور وما هي دواعي استعماله

الصفى الصيدلي والمعالجة

يلتقي بيستور إلى مجموعة الأدوية المسماة الستاتينات.

لقد تم وصف بيستور لك للأصليب التالية:

• لديك ارتفاع في الكوليسترول مما يعني أنك في خطر الإصابة بنبوية قلبية أو سكتة

دماعية.

فمن المستحسن أن تأخذ الستاتين لأن في بعض الأحيان النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية ليس كافياً لموازنة الكوليسترول لديك. يجب الاستمرار في اتباع نظام غذاء منخفض الكوليسترول والنشاط البدني في نفس الوقت مع بيستور أو

• إن يكون لديك عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة بنبوية قلبية والسكتة الدماغية أو مشاكل صحية متعلقة بهذه العوامل.

يمكن أن يكون سبب النبوية القلبية، والسكتة الدماغية أو المشاكل الصحية المرتبطة بهذه العوامل هو مرض يدعى تصلب الشرايين. وتصلب الشرايين ناتج عن تراكم رواسب الدهون في الشرايين.

قبل القيام باستعمال بيستور:

لا تستعمل أقراص بيستور.

إذا كان لديك حساسية من روزوفاستاتين أو لأي من المكونات الأخرى لهذا

الدواء.

إذا كنت حاملاً، وإذا كنت ترضعن طفلك رضاعة طبيعية، يجب التوقف عن العلاج على الفور وأخبري طبيبك؛ ينبغي أخذ وسائل منع الحمل المناسبة لتجنب الحمل خلال العلاج بيستور.

إذا كان لديك حالياً مشاكل في الكبد.

إذا كان لديك مشاكل في الكلى حادة (إذا كنت في شك، اسأل طبيبك).

إذا كان لديك اضطراب في العضلات يسمى اعتلال عضلي (الأم في العضلات

متكررة أو غير متكررة).

إذا كنت تأخذ السيكلوسبورين (تستخدم على سبيل المثال في عمليات زرع

الأعضاء).

إذا كنت تعاني من هذه الحالات (أو إذا كنت غير متأكد)، تحدث عن ذلك مع

الطبيب.

بالإضافة إلى ذلك، لا يجب أخذ 40 ملغ من بيستور (أعلى جرعة) إذا:

• إذا كان لديك فسور كلوي معتدل (إذا كنت في شك، اسأل طبيبك).

• إذا كان لديك اضطراب في الكلى الحادة الدرقية.

• إذا كان لديك الأم في العضلات متكررة أو غير متكررة، وسابق شخصية أو عائلية عن مشاكل في العضلات أو إذا سبق أن عانيت من الأم في العضلات مع دواء آخر

مخفض الكوليسترول.

• إذا كنت تستهلك بانتظام كميات كبيرة من الكحول.

• إذا كنت من أصل أسوي.

• إذا سبق أن تناولت دواء آخر مخفض الكوليسترول يدعى الفيبرات.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الحالات (أو إذا كنت غير متأكد)، تحدث عن ذلك مع الطبيب.

ب. الاحتياطات عند استعمال أقراص بيستور

• إذا كنت تأخذ دواء آخر مخفض الكوليسترول يدعى الفيبرات؛ يرجى مراجعة المعلومات الواردة في النشرة، حتى لو كنت قد أخذت في الماضي، دواء يخفض الكوليسترول.

• إذا كنت تأخذ الأدوية لعلاج العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، على سبيل المثال ريتونايفير مع لوبينافير و / أو اتزانيفير.

• إذا كنت تأخذ مضادات حيوية تحتوي على حمض القوسيدك

• إذا كان المريض هو طفل دون سن 6 سنوات: لا ينبغي إعطاء بيستور للأطفال دون سن 6 سنوات.

• إذا كان لديك أكثر من 70 عاماً (بحسب طبيبك لتحديد الجرعة الأولى من بيستور المناسبة لك).

• إذا كان لديك فشل حاد في الجهاز التنفسي.

• إذا كنت من أصل أسوي (بحسب طبيبك لتحديد الجرعة الأولى من بيستور المناسبة لك).

• لا يجب أخذ 40 ملغ من بيستور (أعلى جرعة)؛ يجب أن تتحقق من جرعة بيستور مع الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج.

عند بدء قيلول من المرض، في بوتر الستاتين على الكبد، يتم التعرف على ذلك بواسطة اختبار بسيط للزيادة في الزيمات الكبد في الدم. لهذا السبب، عادة ما يقوم الطبيب بفحص الدم (اختبارات وظائف الكبد) قبل العلاج وأثناء العلاج.

خلال العلاج بهذا الدواء، سوف ترتفع نسبة من قبل الطبيب إذا كنت مصاباً بمرض السكري أو إذا كان لديك خطر الإصابة به. يمكن الإصابة بمرض السكري إذا كان لديك نسبة السكر (الجلوكوز) والدهون عالية في الدم، إذا كنت بدينًا وإذا كان لديك ارتفاع ضغط الدم (التوتر) عالي.

ج. التداخلات الدوائية من أخذ هذا المستحضر مع أي أدوية أخرى أو أعشاب أو

مكملات غذائية.

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ، اتخذت مؤخرًا أو قد تتناول دواء آخر. أخبر طبيبك إذا كنت تأخذ الأدوية التالية: السيكلوسبورين (التي تستخدم في عمليات زراعة الأعضاء)، الأورافارين أو كلويدوجيل (أدوية تساعد على تخفيف الدم)،

الفيبرات أو أي أدوية أخرى تخفف نسبة الكوليسترول في الدم (مثل إرتيميب)، مضادات الحموضة (التي تستخدم لتخفيف حموضة المعدة)، الأرابروميسين (المضادات الحيوية)، حمض القوسيدك (مضاد حيوي)، ووسائل منع الحمل عن طريق الفم، العلاج الهرموني البديل لانقطاع الطمث أو ريتونايفير مع لوبينافير و /

أو اتزانيفير (التي تستخدم لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية). آثار هذه الأدوية قد تزداد من قبل بيستور أو تغير مفعول بيستور.

د. الحمل والرضاعة:

يجب أن لا تأخذ بيستور إذا كنت حاملاً أو ترضعن. إذا اكتشفت أنك حاملاً أثناء العلاج، توقف عن العلاج فوراً واستشري طبيبك. يجب على النساء تجنب الحمل خلال العلاج بيستور باستخدام وسائل منع الحمل المناسبة.

إسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء

والغذاء وتشغيل الآلات

معظم الناس يمكنهم قيادة السيارة أو تشغيل الآلات عند أخذ بيستور، إذ لا تتأثر قدرتهم ومع ذلك، فإن بعض الناس يعانون من الدوار أثناء العلاج بـ روزوفاستاتين. إذا أصبحت بالدوخة، استشر الطبيب قبل القيادة أو استخدام الآلات.

طريقة استخدام بيستور:

يجب دائماً أخذ هذا الدواء حسب توجيهات الطبيب. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

الجرعة المعتادة لدى البالغين:

إذا كنت تأخذ بيستور لارتفاع في الكوليسترول:

الجرعة الأولى:

ينبغي أن تبدأ العلاج بيستور بجرعة 5 أو 10 ملغ، حتى لو كنت تأخذ من قبل جرعة أعلى من ستاتين آخر.

يتمدد اختيار الجرعة الأولى على:

• نسبة الكوليسترول لديك،

• خطر الإصابة بنبوية قلبية أو سكتة دماغية،

• عوامل قد تجعلك أكثر حساسية لبعض الآثار الجانبية.

يرجى مراجعة طبيبك أو الصيدلي الجرعة الأولى الأفضل بالنسبة لك.

بيستور 5 ملغ و 10 ملغ و 20 ملغ م

قرص مغلف

روزوفاستاتين

علبة من 30

036720 0622

PPV 159DH40

159,40

قم بقراءة هذه النشرة جيداً قبل استعمال هذا الدواء
احتفظ بهذه النشرة لأنك قد تحتاج إليها لاحقاً.
في حال كنت لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب
الصيدلي.

إن هذا دواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناءً على وصفة طبية. ولذا يجب عدم إعطائه لأي شخص حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وإن عانيت منها.
قم بالاتصال بطبيبك المعالج أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

مكونات هذه النشرة

ما هو بيستور وما هي دواعي استعماله.

قبل القيام باستعمال بيستور.

طريقة استخدام بيستور.

الأعراض الجانبية.

ظروف تخزين بيستور.

معلومات إضافية.

ما هو بيستور وما هي دواعي استعماله

الصفى الصيدلي والمعالجة

يلتقي بيستور إلى مجموعة الأدوية المسماة الستاتينات.

لقد تم وصف بيستور لك للأصليب التالية:

• لتبكي ارتفاع في الكوليسترول مما يعني أنك في خطر الإصابة بنبوية قلبية أو سكتة

دماعية.

فمن المستحسن أن تأخذ الستاتين لأن في بعض الأحيان النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية ليس كافياً لموازنة الكوليسترول لديك. يجب الاستمرار في اتباع نظام غذائي مخفض الكوليسترول والنشاط البدني في نفس الوقت مع بيستور أو إن يكون لديك عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة بنبوية قلبية والسكتة الدماغية أو مشاكل صحية متعلقة بهذه العوامل.

يمكن أن يكون سبب النبوية القلبية، والسكتة الدماغية أو المشاكل الصحية المرتبطة بهذه العوامل هو مرض يدعى تصلب الشرايين. وتصلب الشرايين ناتج عن تراكم رواسب الدهون في الشرايين.

قبل القيام باستعمال بيستور:

لا تستعمل أقراص بيستور.

إذا كان لديك حساسية من روزوفاستاتين أو لأي من المكونات الأخرى لهذا

الدواء.

إذا كنت حاملاً، وإذا كنت ترضعن طفلك رضاعة طبيعية، يجب التوقف عن

العلاج على الفور وأخبري طبيبك؛ ينبغي أخذ وسائل منع الحمل المناسبة لتجنب

الحمل خلال العلاج بيستور.

إذا كان لديك حالياً مشاكل في الكبد.

إذا كان لديك مشاكل في الكلى حادة (إذا كنت في شك، اسأل طبيبك).

إذا كان لديك اضطراب في العضلات يسمى اعتلال عضلي (الأم في العضلات

متكررة أو غير مبررة).

إذا كنت تأخذ السيكلوسبورين (تستخدم على سبيل المثال في عمليات زرع

الأعضاء).

إذا كنت تعاني من هذه الحالات (أو إذا كنت غير متأكد)، تحدث عن ذلك مع

الطبيب.

بالإضافة إلى ذلك، لا يجب أخذ 40 ملغ من بيستور (أعلى جرعة) إذا:

• إذا كان لديك فسور كلوي معتدل (إذا كنت في شك، اسأل طبيبك).

• إذا كان لديك اضطراب في الكلى الحادة الدرقية.

• إذا كان لديك الأم في العضلات متكررة أو غير مبررة، سوابق شخصية أو عائلية

عن مشاكل في العضلات أو إذا سبق وأن عانيت من الأم في العضلات مع دواء آخر

مخفض الكوليسترول.

• إذا كنت تستهلك بانتظام كميات كبيرة من الكحول.

• إذا كنت من أصل أسوي.

• إذا سبق أن تناولت دواء آخر مخفض الكوليسترول يدعى الفيبرات.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الحالات (أو إذا كنت غير متأكد)، تحدث عن ذلك مع

الطبيب.

ب. الاحتياطات عند استعمال أقراص بيستور

• إذا كنت تأخذ دواء آخر مخفض الكوليسترول يدعى الفيبرات؛ يرجى مراجعة المعلومات الواردة في النشرة، حتى لو كنت قد أخذت في الماضي، دواء يخفض الكوليسترول.

• إذا كنت تأخذ الأدوية لعلاج العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، على سبيل المثال ريتونايفير مع لوبينافير و / أو اتزانيفير.

• إذا كنت تأخذ مضادات حيوية تحتوي على حمض القوسيدك

• إذا كان المريض هو طفل دون سن 6 سنوات: لا ينبغي إعطاء بيستور للأطفال دون سن 6 سنوات.

• إذا كان لديك أكثر من 70 عاماً (بحاجة طبيبك لتحديد الجرعة الأولى من بيستور المناسبة لك).

• إذا كان لديك فشل حاد في الجهاز التنفسي.

• إذا كنت من أصل أسوي (بحاجة طبيبك لتحديد الجرعة الأولى من بيستور المناسبة لك).

• لا يجب أخذ 40 ملغ من بيستور (أعلى جرعة)؛ يجب أن تتحقق من جرعة بيستور مع الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج.

عند بدء قيلول من المرض، في بوتر الستاتين على الكبد، يتم التعرف على ذلك بواسطة اختبار بسيط للزيادة في الزيمات الكبد في الدم لهذا السبب، عادة ما يقوم الطبيب بفحص الدم (اختبارات وظائف الكبد) قبل العلاج وأثناء العلاج.

خلال العلاج بهذا الدواء، سوف ترتفع نسبة من قبل الطبيب إذا كنت مصاباً بمرض السكري أو إذا كان لديك خطر الإصابة به. يمكن الإصابة بمرض السكري إذا كان لديك نسبة السكر (الجلوكوز) والدهون عالية في الدم، إذا كنت بدينًا وإذا كان لديك ارتفاع ضغط الدم (التوتر) عالي.

ج. التداخلات الدوائية من أخذ هذا المستحضر مع أي أدوية أخرى أو أعشاب أو مكملات غذائية.

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ، اتخذت مؤخرًا أو قد تتناول دواء آخر. أخبر طبيبك إذا كنت تأخذ الأدوية التالية: السيكلوسبورين (التي تستخدم في عمليات زراعة الأعضاء)، الأورافارين أو كلويدوجيل (أدوية تساعد على تخفيف الدم)، الفيبرات أو أي أدوية أخرى تخفف نسبة الكوليسترول في الدم (مثل إرتيميب)، مضادات الحموضة (التي تستخدم لتخفيف حموضة المعدة)، الأرابروميسين (المضادات الحيوية)، حمض القوسيدك (مضاد حيوي)، ووسائل منع الحمل عن طريق الفم، العلاج الهرموني البديل لانقطاع الطمث أو ريتونايفير مع لوبينافير و / أو اتزانيفير (التي تستخدم لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية). آثار هذه

الأدوية قد تعدل من قبل بيستور أو تغير مفعول بيستور.

د. الحمل والرضاعة:

يجب أن لا تأخذ بيستور إذا كنت حاملاً أو ترضعن. إذا اكتشفت أنك حاملاً أثناء العلاج، توقف عن العلاج فوراً واستشري طبيبك. يجب على النساء تجنب الحمل خلال العلاج بيستور باستخدام وسائل منع الحمل المناسبة.

إسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء

والغذاء وتشغيل الآلات

معظم الناس يمكنهم قيادة السيارة أو تشغيل الآلات عند أخذ بيستور، إذ لا تتأثر قدرتهم ومع ذلك، فإن بعض الناس يعانون من الدوار أثناء العلاج بروزوفاستاتين. إذا أصبحت بالدوخة، استشر الطبيب قبل القيادة أو استخدام الآلات.

طريقة استخدام بيستور:

يجب دائماً أخذ هذا الدواء حسب توجيهات الطبيب. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

الجرعة المعتادة لدى البالغين:

إذا كنت تأخذ بيستور لارتفاع في الكوليسترول:

الجرعة الأولى:

ينبغي أن تبدأ العلاج بيستور بجرعة 5 أو 10 ملغ، حتى لو كنت تأخذ من قبل جرعة أعلى من ستاتين آخر.

يتمدد اختيار الجرعة الأولى على:

• نسبة الكوليسترول لديك،

• خطر الإصابة بنبوية قلبية أو سكتة دماغية،

• عوامل قد تجعلك أكثر حساسية لبعض الآثار الجانبية.

يرجى مراجعة طبيبك أو الصيدلي الجرعة الأولى الأفضل بالنسبة لك.

بيستور 5 ملغ و 10 ملغ و 20 ملغ م
قرص مغلف
روزوفاستاتين
علبة من 30

036720 0622
PPV 159DH40

159,40

قم بقراءة هذه النشرة جيداً قبل استعمال هذا الدواء
احتفظ بهذه النشرة لأنك قد تحتاج إليها لاحقاً.
في حال كنت لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب
الصيدلي.

إن هذا دواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناءً على وصفة طبية. ولذا يجب عدم إعطائه لأي شخص حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وإن عانيت منها.
قم بالاتصال بطبيبك المعالج أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

مكونات هذه النشرة
ما هو بيستور وما هي دواعي استعماله.

قبل القيام باستعمال بيستور.

طريقة استخدام بيستور.

الأعراض الجانبية.

ظروف تخزين بيستور.

معلومات إضافية.

ما هو بيستور وما هي دواعي استعماله

الصفى الصيدلي والمعالجة

يلتقي بيستور إلى مجموعة الأدوية المسماة الستاتينات.

لقد تم وصف بيستور لك للأصليب التالية:

• لتبكي ارتفاع في الكوليسترول مما يعني أنك في خطر الإصابة بنبوية قلبية أو سكتة

دماعية.

فمن المستحسن أن تأخذ الستاتين لأن في بعض الأحيان النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية ليس كافياً لموازنة الكوليسترول لديك. يجب الاستمرار في اتباع نظام غذائي مخفض الكوليسترول والنشاط البدني في نفس الوقت مع بيستور أو

• إن يكون لديك عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة بنبوية قلبية والسكتة الدماغية أو مشاكل صحية متعلقة بهذه العوامل.

يمكن أن يكون سبب النبوية القلبية، والسكتة الدماغية أو المشاكل الصحية المرتبطة بهذه العوامل هو مرض يدعى تصلب الشرايين. وتصلب الشرايين ناتج عن تراكم رواسب الدهون في الشرايين.

قبل القيام باستعمال بيستور:

لا تستعمل أقراص بيستور.

إذا كان لديك حساسية من روزوفاستاتين أو لأي من المكونات الأخرى لهذا

الدواء.

إذا كنت حاملاً، وإذا كنت ترضعن طفلك رضاعة طبيعية، يجب التوقف عن العلاج على الفور وأخبري طبيبك؛ ينبغي أخذ وسائل منع الحمل المناسبة لتجنب الحمل خلال العلاج بيستور.

إذا كان لديك حالياً مشاكل في الكبد.

إذا كان لديك مشاكل في الكلى حادة (إذا كنت في شك، اسأل طبيبك).

إذا كان لديك اضطراب في العضلات يسمى اعتلال عضلي (الأم في العضلات

متكررة أو غير متكررة).

إذا كنت تأخذ السيكلوسبورين (تستخدم على سبيل المثال في عمليات زرع

الأعضاء).

إذا كنت تعاني من هذه الحالات (أو إذا كنت غير متأكد)، تحدث عن ذلك مع

الطبيب.

بالإضافة إلى ذلك، لا يجب أخذ 40 ملغ من بيستور (أعلى جرعة) إذا:

• إذا كان لديك فسور كلوي معتدل (إذا كنت في شك، اسأل طبيبك).

• إذا كان لديك اضطراب في الكلى الحادة الدرقية.

• إذا كان لديك الأم في العضلات متكررة أو غير متكررة، سوابق شخصية أو عائلية عن مشاكل في العضلات أو إذا سبق وأن عانيت من الأم في العضلات مع دواء آخر

مخفض الكوليسترول.

• إذا كنت تستهلك بانتظام كميات كبيرة من الكحول.

• إذا كنت من أصل أسوي.

• إذا سبق أن تناولت دواء آخر مخفض الكوليسترول يدعى الفيبرات.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الحالات (أو إذا كنت غير متأكد)، تحدث عن ذلك مع الطبيب.

ب. الاحتياطات عند استعمال أقراص بيستور

• إذا كنت تأخذ دواء آخر مخفض الكوليسترول يدعى الفيبرات؛ يرجى مراجعة المعلومات الواردة في النشرة، حتى لو كنت قد أخذت في الماضي، دواء يخفض الكوليسترول.

• إذا كنت تأخذ الأدوية لعلاج العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، على سبيل المثال ريتونايفير مع لوبينافير / أو اتزانيفير.

• إذا كنت تأخذ مضادات حيوية تحتوي على حمض القوسنيك

• إذا كان المريض هو طفل دون سن 6 سنوات: لا ينبغي إعطاء بيستور للأطفال دون سن 6 سنوات.

• إذا كان لديك أكثر من 70 عاماً (بحسب طبيبك لتحديد الجرعة الأولى من بيستور المناسبة لك).

• إذا كان لديك فشل حاد في الجهاز التنفسي.

• إذا كنت من أصل أسوي (بحسب طبيبك لتحديد الجرعة الأولى من بيستور المناسبة لك).

• لا يجب أخذ 40 ملغ من بيستور (أعلى جرعة)؛ يجب أن تتحقق من جرعة بيستور مع الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج.

عند بدء قيلول من المرض، في بوتر الستاتين على الكبد، يتم التعرف على ذلك بواسطة اختبار بسيط للزيادة في الزيمات الكبد في الدم. لهذا السبب، عادة ما يقوم الطبيب بفحص الدم (اختبارات وظائف الكبد) قبل العلاج وأثناء العلاج.

خلال العلاج بهذا الدواء، سوف ترتفع نسبة من قبل الطبيب إذا كنت مصاباً بمرض السكري أو إذا كان لديك خطر الإصابة به. يمكن الإصابة بمرض السكري إذا كان لديك نسبة السكر (الجلوكوز) والدهون عالية في الدم، إذا كنت بدينًا وإذا كان لديك ارتفاع ضغط الدم (التوتر) عالي.

ج. التداخلات الدوائية من أخذ هذا المستحضر مع أي أدوية أخرى أو أعشاب أو

مكملات غذائية.

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ، اتخذت مؤخرًا أو قد تتناول دواء آخر.

أخبر طبيبك إذا كنت تأخذ الأدوية التالية: السيكلوسبورين (التي تستخدم في عمليات زراعة الأعضاء)، الأورافارين أو كلويدوجيل (أدوية تساعد على تخفيف الدم)،

الفيبرات أو أي أدوية أخرى تخفف نسبة الكوليسترول في الدم (مثل إرتيميب)، مضادات الحموضة (التي تستخدم لتخفيف حموضة المعدة)، الأرابروميسين

(المضادات الحيوية)، حمض القوسنيك (مضاد حيوي)، ووسائل منع الحمل عن طريق الفم، العلاج الهرموني البديل لانقطاع الطمث أو ريتونايفير مع لوبينافير /

أو اتزانيفير (التي تستخدم لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية). آثار هذه الأدوية قد تزداد من قبل بيستور أو تغير مفعول بيستور.

د. الحمل والرضاعة:

يجب أن لا تأخذ بيستور إذا كنت حاملاً أو ترضعين. إذا اكتشفت أنك حاملاً أثناء

العلاج، فقم بذلك، فمع ذلك، يجب أن يخبري طبيبك. يجب على النساء تجنب الحمل خلال العلاج بيستور باستخدام وسائل منع الحمل المناسبة.

إسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء

والغذاء وتشغيل الآلات

معظم الناس يمكنهم قيادة السيارة أو تشغيل الآلات عند أخذ بيستور، إذ لا تتأثر قدرتهم ومع ذلك، يجب أن يخبري طبيبك فوراً واستشر طبيبك. يجب على النساء تجنب الحمل إذا أصبحت بالوخة، استشر الطبيب قبل القيادة أو استخدام الآلات.

طريقة استخدام بيستور:

يجب دائماً أخذ هذا الدواء حسب توجيهات الطبيب. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

الجرعة المعتادة لدى البالغين:

إذا كنت تأخذ بيستور لارتفاع في الكوليسترول:

الجرعة الأولى:

ينبغي أن تبدأ العلاج بيستور بجرعة 5 أو 10 ملغ، حتى لو كنت تأخذ من قبل جرعة أعلى من ستاتين آخر.

يتمدد اختيار الجرعة الأولى على:

• نسبة الكوليسترول لديك،

• خطر الإصابة بنبوية قلبية أو سكتة دماغية،

• عوامل قد تجعلك أكثر حساسية لبعض الآثار الجانبية.

يرجى مراجعة طبيبك أو الصيدلي الجرعة الأولى الأفضل بالنسبة لك.

OMNIPRATICIEN

Diplôme universitaire en diabétologie
Diplôme universitaire en Diététique Médicale et Nutrition
Diplôme universitaire en échographie clinique
Faculté de Médecine Montpellier France
ELECTROCARDIOGRAMME
Membre de la Société Francophone du Diabète
sur rendez-vous

الطب العام

دبلوم جامعي في مرض السكري
دبلوم جامعي في الحماية الطبية و التغذية
دبلوم جامعي في الفحص بالصدى
من كلية الطب موبوليبي - فرنسا
التخطيط الكهربائي للقلب
عضو الجمعية الفرونكوفونية لمرض السكري
بالموعد

Casablanca, le 02 NOV. 2020 في الدار البيضاء.

م = Kausil Mingu

- TSH us
- CTL M H22
- B3

LABORATOIRE PANORAMIQUE
ANALYSES MEDICALES
Dr. KADIM Mohamed
Bd Panoramic - Casablanca
Tel: 05 22 52 29 61

Dr. Hassan CHAHID
OMNIPRATICIEN Echographie Clinique
D.U. en Diabète
146 Rue Moulay Idriss, Hay Baladia - Casablanca
au dessus de la pharmacie
Tel.: 05 22 80 91 91



الرئيس (الفاوري) محمد
أخصائي في التحليلات الطبية

مختبر التحليلات الطبية بانوراميك LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

Dr. KADIRI Mohamed
Biologiste

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique
Diagnostic Biologique et Parasitaire
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris V
Ex. Attaché des Hôpitaux de France

Dossier ouvert le : 02/11/20.
Prélèvement effectué à 09:17

Mme KANDIL MINA
Docteur HASSAN CHAHID
Dossier N° :20K48

BIOCHIMIE

EXPLORATION D'UNE ANOMALIE LIPIDIQUE(EAL)

* CHOLESTEROL TOTAL	: 2,99 g/l	< 2,2
Soit :	7,71 mmol/l	< 5,676
* TRIGLYCERIDES	: 1,91 g/l	0,4 - 1,65
Soit :	2,18 mmol/l	0,46 - 1,88
CHOLESTEROL HDL	: 0,46 g/l	0,35 - 0,6
Soit :	1,19 mmol/l	0,903 - 1,548
* CHOLESTEROL LDL	: 2,15 g/l	< 1,6
calculé selon la formule deFriedewald	Soit : 5,55 mmol/l	< 4,128
valable que si les TG <4gl		

Valeurs souhaitables du LDL(eng/l) en fonction du nombre de facteurs de risque cardiovasculaire selon l'AFSSAPS

Absence de facteurs de risque:LDL<2,2

Présence de facteurs de risque:LDL<1,9

Présence de2 facteurs de risque:LDL<1,6

Présence de plus de 2 facteurs de risque:LDL<1,3

Présence d'antécédants de maladie cardiovasculaire:LDL<1

Selon l'AFSSAPS les facteurs de risque sont: l'age;antécédants familiaux de maladie coronaire précoce

HORMONOLOGIE

THYREOSTIMULINE (TSH us) : 2,71 μ UI/ml 0,25 - 5,01
(Abbott Architect)

LABORATOIRE PANORAMIQUE
ANALYSES MEDICALES
Dr. KADIRI Mohamed
Bd Panoramique - Casablanca
Tel.: 0522 52 29 61



المركز (الغفوري) محمدر
أخصائي في التحليلات الطبية

مختبر التحليلات الطبية بانوراميك

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

Dr. KADIRI Mohamed
Biologiste

Diplomé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique
Diagnostic Biologique et Parasitaire
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris 7
Ex. Attaché des Hopitaux de France

Facture N° : 14054
Casablanca le 2 novembre 2020
A l'attention de : **Mme KANDIL MINA**

Analyses :

Cholestérol total -----	B	30
Triglycérides -----	B	60
Cholestérol HDL -----	B	50
Cholestérol LDL -----	B	50
Thyreostimuline (TSH us) -----	B	250

Prélèvements :

Sang----- Pc 1,5

Total dossier : 600,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :
Six Cents Dirhams

LABORATOIRE PANORAMIQUE
ANALYSES MEDICALES
Dr. KADIRI Mohamed
Bd Panoramique - Casablanca
Tel.: 0522 52 29 61