

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie. La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèses :

En cas de prothèses ou de dispositifs médicaux, une facture est obligatoire avec :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné sur la feuille de soins est

Le cadre réservé au praticien doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au praticien doit être dûment renseigné.

La facture doit être jointe à la feuille de soins et renouvelée tous les 6 mois.

Visa et cachet du praticien attestant de l'exécution de l'ordonnance.

Visa et cachet du praticien attestant de l'exécution de l'ordonnance.

Visa et cachet du praticien attestant de l'exécution de l'ordonnance.



Déclaration de Maladie

N° P19- 052872

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6624 Société : 48503

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HAZIAN C R HAFSIA

Date de naissance : 10/03/1965

Adresse : Vali (h) C (c) N. 11 27020 Casablanca

Tél. : 0661 99 33 61

Total des frais engagés : 110 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 23/11/2020

Nom et prénom du malade : MN. MARZOUK

Lien de parenté : Lui-même

Nature de la maladie : APLA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : / /

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25/01/2020	C	1	15001	<i>Signature et cachet du Médecin</i>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE KATI	29-31-1831	10000

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan.

Docteur Naïma OUDRHIRI
MEDECINE GENERALE
Médecin Assermenté
Expert près les Tribunaux

الدكتورة نعيمة وعييري
الطب العام
طبيبة محلفة
خبيرة لدى المحاكم

Casablanca. le 23 OCT. 2020 الدار البيضاء في:

MA 25200 Chouïaga

~~11 Cerdan 500 S.V.~~
~~21 Antes 15.21 S.V.~~
~~4000~~
~~31 Tribuna 15.21 S.V.~~
~~15.50~~
~~9900 del 20 S.V.~~
~~2900 Meddel 15 S.V.~~
~~15.20 S.V.~~
~~15.20 S.V.~~
~~15.20 S.V.~~

PHARMACIE IBN EL KATI
222 BELKAÏD DOCTEUR EN PHARMACIE
HAY EL Baraka 2 Rue 12 N° 20-31
Sidi Moumen Casablanca

Dr. OUDHIRI Naïma
Assermentée
Tribunaux
Hay El Baraka N° 29
Rue 12 N° 20-31
Derb Inani - Rue 29 N°3 - Hay Mohammadi - CASA - 05.22.62.02.35 - الهاتف:

ANTI-SPA® 200 mg, comprimés pelliculés Boîte de 30

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car :
- Gardez cette notice pour toute question.
- Si vous avez tout d'abord consulté votre pharmacien ou votre pharmacienne.
- Ce médicament n'est pas destiné à tout autre, même en cas d'urgence.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés dans ce document

LOT 191009 1
EXP 11/2021
PPV 40.00

40,00

Dans cette notice

1. QU'EST-CE QU'ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?
3. COMMENT PRENDRE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES



1. QU'EST-CE QUE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

(A: appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est un anti-spasmodique musculotrope.

Il est indiqué dans les douleurs spasmodiques du tube digestif et des voies biliaires et l'inconfort intestinal.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés :

Allergie à l'un des constituants et chez l'enfant de moins de 6 ans en raison du risque de fausse route (avaler de travers).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin.

Tibéral®

Ornidazole

Ornidazole

Anti-infectieux pour traiter la trichomonase, l'amibiase, la

Composition

Comprimés : ornidazole 500 mg; excipients par comprimé.

Ampoules (3 ml) : ornidazole 500 mg; éthanol 0,9 g; prop

Forme et présentation pharmaceutique

Comprimés à 500 mg : boîte de 10

Ampoule de 3 ml à 500 mg pour perfusion : boîte de 1.

Propriétés, effets

L'absorption de l'ornidazole dans la cellule bactérienne 5 imidazoles.

La réduction de l'ornidazole par la cellule bactérienne par une augmentation de la concentration intracellulaire toxique pour la cellule concernée qui se lie à l'AD

En ce qui concerne les protozoaires, le mécanisme

Bactéries

Le spectre d'action de l'ornidazole englobe les bactéries anaérobies strictes suivantes :

A : sont sensibles : CMI 90 ≤ 8 mg/l: *Peptostreptococcus spp.*, *Clostridium difficile*, *Clostridium spp.*, *Bacteroides fragilis* ainsi que d'autres *Bacteroides spp.*, insensibles à la bile, *Prevotella spp.*, *Porphyromonas spp.* et *Fusobacterium spp.*

B : sont résistantes : CMI ≥ 16 mg/l : toutes les bactéries aérobies et microaérophiles, les actinomycètes, *Propionibacterium spp.* et *Eubacterium spp.* ainsi que les champignons levuriformes.

La sensibilité des bactéries anaérobies peut être déterminée par la méthode de dilution en milieu gélosé ou par microdilution. Pour la réalisation des tests de dilution en série en ce qui concerne les bactéries anaérobies strictes; il est renvoyé au procédé du NCCLS (M100-S3 performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing). Tous les germes à l'égard desquels la CMI est ≤ 8 mg/l peuvent être classés parmi les germes sensibles (d'après Wüst).

Classification Valeur limite (CMI en mg/l)

Sensible (S) ≤ 8

Résistant (R) ≥ 16

Il n'est pas judicieux de déterminer la sensibilité des anaérobies à l'aide de la méthode de diffusion sur gélose.

Protozoaires

Le spectre d'action de l'ornidazole englobe les protozoaires suivants :

Sont sensibles : CMI ≤ 8 mg/l: *Trichomonas vaginalis*, *Entamoeba histolytica*, *Giardia intestinalis*.

Les autres protozoaires sont tous résistants à l'ornidazole.

La détermination de la sensibilité des protozoaires n'est normalement pas effectuée en routine, la technique étant exigeante. L'efficacité in vivo de l'ornidazole à l'égard des protozoaires cités ci-dessus a fait l'objet d'une documentation détaillée.

Il existe une résistance croisée entre l'ornidazole et d'autres nitro-5 imidazoles; on ne connaît pas de résistance croisée avec d'autres substances chimiquement non apparentées.

Il est rare que des bactéries anaérobies soient résistantes à l'ornidazole : une telle résistance n'a été décrite que dans des cas isolés.

Plus de 99% des bactéries anaérobies normalement sensibles peuvent toujours être considérées comme sensibles à l'ornidazole.

Indications

Elles procèdent de l'activité antibactérienne et antiparasitaire de l'ornidazole et de ses caractéristiques pharmacocinétiques. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles à donner lieu ce médicament, et de sa place dans l'éventail des produits anti-infectifs actuellement disponibles.

Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles en pharmacodynamie.

Indications générales :

- Traitement curatif des infections médicochirurgicales à germes anaérobies sensibles.
- Traitement préventif des infections à germes anaérobies sensibles lors des interventions chirurgicales comportant un haut risque de survenue de ce type d'infection.
- Amibiases sévères de localisation intestinale ou hépatique (solution injectable 500mg)

Spécifique à la forme comprimé :

- amibiase, qu'elle soit l'expression clinique (amibiases intestinales et extra-intestinales).
- Trichomonases urogénitales.
- Lambiases

- Relais des traitements par voie injectable des infections à germes anaérobies sensibles, à titre curatif ou préventif.

Posologie, mode d'emploi

Les comprimés doivent toujours être pris après les repas. La solution contenue dans les ampoules doit être administrée en perfusion brève, elle doit toujours être diluée avant l'injection. En ce qui concerne la préparation de la solution à perfuser, voir paragraphe 5.

Posologie usuelle

1. Trichomonases

deux schémas thérapeutiques peuvent être recommandés :

Nature du traitement	Dose journalière	
	Adultes et enfants de plus de 35 kg	Enfants jusqu'à 35 kg
a. Traitement par dose unique	3 comprimés le soir	25 mg par kg de poids corporel
b. Traitement de 5 jours	2 comprimés (1 le matin, 1 le soir)	non recommandé

Pour éviter une réinfestation, le partenaire doit toujours être également traité par la même dose orale.

Chez l'enfant, le traitement consiste en l'administration d'une dose unique de 25 mg par Kg de poids corporel et par jour.

2. Amibiase

a. Traitement de 3 jours lors de dysenterie amibiennne.

b. Traitement de 5-10 jours pour toutes les formes d'amibiase.

Durée du Traitement	Dose journalière	
	Adultes et enfants de plus de 35 kg	Enfants jusqu'à 35 kg
a. 3 jours	3 comprimés le soir à prendre en une fois. Au-dessus de 60 kg de poids corporel : 4 comprimés (2 le matin, 2 le soir)	40 mg/kg à prendre en une fois
b. 5-10 jours	2 comprimés (1 le matin, 1 le soir)	25 mg/kg à prendre en une fois

c. Traitement de l'abcès amibienn du foie et de dysenterie amibiennne grave

Adultes: perfuser par voie intraveineuse 500-1000 mg en tant que dose initiale, puis 500 mg toutes les 12 heures pendant 3-6 jours en moyenne.

La posologie pour enfants est de 20-30 mg/kg/jour.

LOT : 19101 PER : 07/2024
PPV : 48,50 DH

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
 - Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés?
3. COMMENT PRENDRE CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

Antibiotiques antibactériens de la famille des bétalactamines, du groupe des céphalosporines de 2^{ème} génération (Code ATC: J01DC02).

CEROXIM® est indiqué dans les :

- Infections de la sphère ORL :
- Adulte et enfant : Angines et pharyngites, otites moyennes aiguës.
- Adulte : Sinusites.
- Infections respiratoires basses :
- Adulte : Bronchites aiguës et chroniques, pneumopathies bactériennes.
- Enfant : Infections respiratoires basses.
- Infections génito-urinaires :
- Pyélonéphrite, cystite et urétrite.
- Infection gonococcique aiguë non compliquée.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Traitement précoce de la maladie de Lyme chez l'adulte et l'adolescent.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés?

Ne prenez jamais, CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés si :

Vous êtes allergique aux antibiotiques du groupe des céphalosporines.

Prenez attention avec CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés :

en garde spéciales :

• réaction allergique (éruptions cutanées, démangeaisons ...) en doit être signalée immédiatement à votre médecin.

• des symptômes suivants : respiration sifflante, gonflement des paupières, du visage ou des contact avec votre médecin, il pourra

• votre médecin si à l'occasion d'un présenté une réaction allergique : es, démangeaisons, œdème et du cou d'origine allergique). essaite un interrogatoire préalable. J'un traitement antibiotique ne doit pas

• indiquée chez l'enfant avant 6 ans car elle saccharose. Son utilisation est déconseillée

chez les patients présentant une intolérance au saccharose (maladie héréditaire rare).

Précautions d'emploi

- En cas d'insuffisance rénale, adapter la posologie en fonction de la clairance de la créatinine ou de la créatininémie.
- La fonction rénale préexistante, les associations d'antibiotiques et des diurétiques peuvent modifier l'efficacité de ces associations.
- Comme avec les autres céphalosporines, CEROXIM® peut causer une entérocoque, l'interne ou l'extérieure.
- La survenue d'angines et d'otites aiguës après l'emploi de CEROXIM® peut être due à une pseudomembrane ou à une infection bactérienne après coloscopie.
- Tenir compte de l'absence de symptômes de l'entérocoque.
- Tenir compte de la teneur en saccharose dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.
- Ce médicament peut occasionner une fausse réaction positive de certains examens de laboratoires, notamment la glycémie (taux de sucre dans les urines).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

De nombreux cas d'augmentation de l'activité des anticoagulants oraux ont été rapportés chez des patients recevant des antibiotiques. Le contexte infectieux ou inflammatoire marqué, l'âge et l'état général du patient apparaissent comme des facteurs de risque. Dans ces circonstances, il apparaît difficile de faire la part entre la pathologie infectieuse et son traitement dans la survenue du déséquilibre de l'INR. Cependant, certaines classes d'antibiotiques sont davantage impliquées : il s'agit notamment des fluoroquinolones, des macrolides, des cyclines, du cotrimoxazole et de certaines céphalosporines.

SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS RECENTEMENT UN AUTRE MEDICAMENT, Y COMPRIS UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE, PARLEZ-EN A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement

Grossesse :

L'utilisation de la céfuroxime ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

Allaitement :

L'allaitement est possible avec la prise de ce médicament. Si le nouveau-né présente des troubles tels que diarrhée, éruption sur la peau, candidose (infection due à certains champignons microscopiques), avisez immédiatement votre médecin qui vous conseillera sur la conduite à tenir, car ces effets sont peut-être dus à ce médicament.

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

Informations importantes concernant certains composants de CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés:

Liste des excipients à effet notable: Saccharose et Sodium.

3. COMMENT PRENDRE CEROXIM®

Posologie

Adulte :

Infections de la sphère ORL :

141DH20

203870/2

02/2022

PPV:

Lot n°:

EXP:

Infections de la sphère ORL :

Enfant à partir de 6 ans avec un p

Angines : 30 mg/kg/jour en deux prises

otites : 30 mg/kg/jour en 2 prises.

Infections respiratoires basses avec 30 mg/kg/jour en 2 prises.

Enfant à partir de 6 ans avec un p

Angines : 500 mg/jour en deux prises

otites : 500 mg/jour en 2 prises.

Infections respiratoires basses avec 500 mg/jour en 2 prises.

Pneumopathies bactériennes :

Enfant à partir de 6 ans avec un p

Angines : 500 mg/jour en deux prises

otites : 500 mg/jour en 2 prises.

Infections respiratoires basses avec 500 mg/jour en 2 prises.

Pneumopathies bactériennes :

Enfant à partir de 6 ans avec un p

Angines : 1000 mg/jour en 2 prises.

Infections urinaires non compliquées :

Adulte : 1000 mg/jour en 2 prises.

Gonorrhée non compliquée :

Adulte : 1000 mg/jour en 2 prises.

Traitement de la maladie de Lyme :

jours.

En cas d'insuffisance rénale :

Lorsque la clairance de la créatinine recommandé de diminuer la dose à

Ajouter une dose supplémentaire à

diurétiques chroniques.

Voie et mode d'administration :

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés, verre d'eau.

Si vous avez l'impression que l'effet du comprimé est trop fort ou trop faible, consultez votre pharmacien.

Fréquence d'administration :

La posologie recommandée est à pre

OEDES® 20 mg

Microgranules gastro-résistants en gélules

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

DÉNOMINATION DU MEDICAMENT :

OEDES® 20 mg

COMPOSITION :

Chaque gélule contient 20mg de substance active : oméprazole.

Excipients : qsp 1 gélule.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATIONS :

Microgranules gastro-résistants en gélules. Disponibles en boîtes de 7, 14, 28 et 56

CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THÉRAPEUTIQUE :

Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule contient une substance appelée oméprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications :

Adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de *Helicobacter pylori* en cas de maladie ulcéruse gastro-duodénale.
- Ulcère duodénal évolutif.
- Ulcère gastrique évolutif.
- Œsophagite érosive ou ulcéратive

stro-œsophagien.
u non à une œsophagite,
our.

infectés par *Helicobacter*
agien.

matoires non stéroïdiens

anti-inflammatoires non
65 ans, antécédents
aire est indispensable.

œsophagien.

LOT 190819
EXP 02/2022
PPV 99.00DH

INFORMATIONS SUR LE MEDICAMENT

Informations :

Ne prenez jamais Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule:

- En cas d'allergie connue à l'un des composants de ce médicament.
- En association avec l'atazanavir associé au ritonavir (médicament anti-infectieux).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE
MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

OFIKEN®

Céfixime

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.



DENOMINATION :

OFIKEN® 200 mg, comprimés pelliculés.

OFIKEN® 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

OFIKEN® 200 mg, comprimés pelliculés

Céfixime trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre..... 200 mg
Excipients.....

OFIKEN® 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable

Céfixime trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre..... 100 mg
Excipients..... q.s.p 5 ml de suspension reconstituée.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :

OFIKEN® 200 mg, comprimé pelliculé, boîtes de 8 et 16.

OFIKEN® 100 mg/5 ml :

Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml soit 15 doses/kg

Poudre pour suspension buvable en flacon de 60 ml soit 300 doses/kg

Poudre pour suspension buvable en flacon de 100 ml soit 500 doses/kg

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antibiotiques de la famille des bêta-lactamines du groupe des céphalosporines de 3^{ème} génération.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Comprimé pelliculé :

Ce médicament est indiqué dans le traitement des :

- Otites et sinusites aiguës,
- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Certaines infections urogénitales.

Poudre pour suspension buvable :

Ce médicament est indiqué chez l'enfant de plus de 6 mois, dans le traitement des :

- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Otites moyennes aiguës,
- Certaines infections urinaires.

ATTENTION !

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?

Poudre pour suspension buvable et comprimé pelliculé :

- Allergie connue aux antibiotiques du groupe des céphalosporines, ou à l'un des excipients de ces médicaments.

Comprimé pelliculé :