

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## entaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° P19- 052522

48827

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 1748 Société : R.A.M.

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

ABDIOU BAN OTMAN

Date de naissance :

19-12-1947

Adresse :

78, Rue HAJ OMAR RIFFI 2<sup>e</sup> étage n° 4  
CASABLANCA

Tél. 0661950611

Total des frais engagés : 2011,6 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 31/08/2022

Nom et prénom du malade : OLMAN Abdellah Age : 73

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Arthrite type 2

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Tetouan

Le : 17/11/2020

Signature de l'adhérent(e) :

D. ABDI OU BAN  
P

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
31-08-20			200 Dh	<i>[Signature]</i>

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>[Signature]</i> Pharmacie Dr. Mehdi RAHALI Chemtou N°30 Tétouan 80000 Tél: 0522 07 48 44 INPE 1630655411	31-08-20	501,60 DH

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>[Signature]</i> Dr. Mehdi RAHALI Laboratoire d'Analyses Médicales Al-Razi Tél: 0662 077 554 INPE: 163061948	81-08-20	6860	1310 dh

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

### O.D.F PROTHESES DENTAIRES

#### DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	00000000
G	35533411	11433553



#### [Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Tétouan Le: 31.08.20

## Ordonnance

Oman. Adi bc

1) Annelie Zoj I-0-1  
 $60 \times 60 = 3600$

2). Length x song typ. h.t.  
 $3 \times 1340 = 40,20$  -je.

Truit de 03-متحف  
عيلان  
شلر العفن والقطن اصل الفند مروحة  
البلديه اصل الفند والمسك  
البلديه اصل الفند والمسك

# Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimépiride

Comprimé

SANOFI

## 1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral appartenant à la famille des sulfonylurées.

AMAREL, comprimé agit sur le pancréas. L'ir

Dans quel cas

AMAREL, comprimé est utilisé lorsque le régime suffisants po

## 2. QUELLES SONT LES CONSEILS POUR LA PRÉPARATION ET LA CONSOMMATION ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre pharmacien.

- si vous êtes allergique (hypersensible) : au glimépiride, aux autres sulfonylurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulinodépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

### Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien.

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin ou votre pharmacien. Un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

### Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

# Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimépiride

Comprimé

SANOFI

## 1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral appartenant à la famille des sulfonylurées.

AMAREL, comprimé agit sur le pancréas. L'ir

Dans quel cas

AMAREL, comprimé est utilisé lorsque le régime suffisants po

## 2. QUELLES SONT LES CONSEILS POUR LA PRÉPARATION ET LA CONSOMMATION ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre pharmacien.

- si vous êtes allergique (hypersensible) : au glimépiride, aux autres sulfonylurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulinodépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

### Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien.

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin ou votre pharmacien. Un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

### Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

# Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimépiride

Comprimé

SANOFI

## 1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral appartenant à la famille des sulfonylurées.

AMAREL, comprimé agit sur le pancréas. L'insuline est libérée lorsque le niveau de sucre dans le sang est suffisamment élevé.

Dans quel cas prendre AMAREL, comprimé ?

AMAREL, comprimé est utilisé lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique sont insuffisants pour maintenir le taux de sucre dans le sang à un niveau normal.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS SUR LE COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre pharmacien.

- si vous êtes allergique (hypersensible) : au glimépiride, aux autres sulfonylurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulinodépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

### Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien.

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin ou votre pharmacien. Un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

### Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

LOT : 20E003  
PER.: 01/2023

AMAREL 2MG  
CP B30

P.P.V : 60DH40



6 118000 060031

# Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimépiride

Comprimé

SANOFI

## 1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral appartenant à la famille des sulfonylurées.

AMAREL, comprimé agit sur le pancréas. L'ir

Dans quel cas

AMAREL, comprimé est utilisé lorsque le régime suffisants po

## 2. QUELLES SONT LES CONSEILS POUR LA PRÉPARATION ET LA CONSOMMATION ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre pharmacien.

- si vous êtes allergique (hypersensible) : au glimépiride, aux autres sulfonylurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulinodépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

### Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien.

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin ou votre pharmacien. Un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

### Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

# Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimépiride

Comprimé

SANOFI

## 1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral appartenant à la famille des sulfonylurées.

AMAREL, comprimé agit sur le pancréas. L'ir

Dans quel cas

AMAREL, comprimé est utilisé lorsque le régime suffisants po

## 2. QUELLES SONT LES CONSEILS POUR LA PRÉPARATION ET LA CONSOMMATION ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre pharmacien.

- si vous êtes allergique (hypersensible) : au glimépiride, aux autres sulfonylurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulinodépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

### Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien.

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin ou votre pharmacien. Un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

### Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

# Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimépiride

Comprimé

SANOFI

## 1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral appartenant à la famille des sulfonylurées.

AMAREL, comprimé agit sur le pancréas. L'insuline est libérée lorsque le niveau de sucre dans le sang est suffisamment élevé.

Dans quel cas prendre AMAREL, comprimé ?

AMAREL, comprimé est utilisé lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique sont insuffisants pour maintenir le taux de sucre dans le sang à un niveau normal.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS SUR LE COMPRISE ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre pharmacien.

- si vous êtes allergique (hypersensible) : au glimépiride, aux autres sulfonylurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulinodépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

### Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien.

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin ou votre pharmacien. Un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

### Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

# FORTIFER®

ACTIFS VÉGÉTAUX

## PRÉSENTATION

Boîte de 30 gélules.

## PROPRIÉTÉS

Le Fer contribue :

- À la réduction de la fatigue de l'organisme,
- Au fonctionnement normal des cellules
- À la protection des cellules contre les radicaux libres et au maintien normale de collagène pour assurer la santé des gencives, des dents et des os.

**FORTIFER®**  
ACTIFS VÉGÉTAUX & OLIGOÉLÉMENTS

L 1800  
P : 12/20  
99.00DH

**DR. MAROUA HAYOUK**

CABINET D'ENDOCRINOLOGIE DIABETOLOGIE  
NUTRITION ET MALADIES METABOLIQUES




**دكتورة حيوك مروة**

عيادة أمراض الغدد والسكري  
وال營養ية وأمراض الأيض

31.08.22 Tétouan le : Omar Adnane

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> TSH US                                  | <input type="checkbox"/> GLYCEMIE A JEUN                     |
| <input type="checkbox"/> T4 LIBRE                                | <input type="checkbox"/> HBA1C                               |
| <input type="checkbox"/> T3 LIBRE                                | <input type="checkbox"/> HGPO                                |
| <input type="checkbox"/> THYROGLOBULINE                          | <input type="checkbox"/> CREATINNE - UREE                    |
| <input type="checkbox"/> CALCITONINE BASALE                      | <input type="checkbox"/> CHOLESTEROL LDL - CHOLESTEROL TOTAL |
| <input type="checkbox"/> AC. ANTITHYROGLOBULINE                  | <input type="checkbox"/> CHOLESTEROL HDL                     |
| <input type="checkbox"/> A.C ANTI TPO                            | <input type="checkbox"/> TRIGLYCERIDES                       |
| <input type="checkbox"/> A.C ANTI RECEPTEUR TSH                  | <input type="checkbox"/> MICROALBUMINURIE DES 24 H           |
| <input type="checkbox"/> CORTISOL SALIVAIRES                     | <input type="checkbox"/> PROTEINURIE DES 24 H                |
| <input type="checkbox"/> CORTISOL A 8 H                          | <input type="checkbox"/> ECBU + ANTBIOGRAMME                 |
| <input type="checkbox"/> CORTISOL A 16 H                         | <input type="checkbox"/> NFS-VS-CRP-NATERMIE-KALIEMIE        |
| <input type="checkbox"/> CORTISOL LIBRE URINAIRE (CLU)           | <input type="checkbox"/> CALCEMIE A JEUN                     |
| <input type="checkbox"/> ACTH                                    | <input type="checkbox"/> CALCUIRIE DES 24 H                  |
| <input type="checkbox"/> FSH-LH                                  | <input type="checkbox"/> ACIDE URIQUE                        |
| <input type="checkbox"/> OESTRADIOL                              | <input type="checkbox"/> 25 HYDROXY VIT D2 ET D3             |
| <input type="checkbox"/> PROLACTINEMIE                           | <input type="checkbox"/> SGOT-SGPT                           |
| <input type="checkbox"/> TESTOSTERONE TOTALE                     | <input type="checkbox"/> CA <sub>19.9</sub> , ACE            |
| <input type="checkbox"/> DELTA 4 ANDROSTENEDIONE                 | <input type="checkbox"/> FERRETINE                           |
| <input type="checkbox"/> 17 HYDROXY PROGESTERONE                 | <input type="checkbox"/> VITAMINE B12                        |
| <input type="checkbox"/> SULFATE DE DHA                          | <input type="checkbox"/> Peptide C / Ac. Anti GAD            |
| <input type="checkbox"/> 17 BETA ESTRADIOL                       |  |
| <input type="checkbox"/> PROGESTRONE                             |  |
| <input type="checkbox"/> SHBG                                    |  |
| <input type="checkbox"/> IG F1                                   |  |
| <input type="checkbox"/> PARATHORMONE INTACTE                    |  |
| <input type="checkbox"/> META ET NORMENTANEPEHRINES URINAIRES    |  |
| <input type="checkbox"/> META ET NORMENTANEPEHRINES PLASMATIQUES |  |
| <input type="checkbox"/> PSA                                     |  |





6 118001 102013

Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160336



6 118001 102013

Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160336



6 118001 102013

Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160336



د. الرازي مهدي  
Dr. Mehdi RAHALI

صيدلاني اصطناعي في التعاليل الطبية  
مقيم سابقاً بمستشفي البايس بمدريد - إسبانيا

Pharmacien Biologiste  
Ex-Interne C.H.U La Paz de Madrid - Espagne

# مختبر للتحليلات الطبية الرازي

## Laboratoire d'Analyses Médicales AL-RAZI

(Hematologie, Biochimie, Immunologie, Bacteriologie, Virologie, Mycologie)

Tétouan le 31 août 2020

Monsieur ADIOUBAN OTMAN

FACTURE N°	2394
------------	------

### Analyses :

Numération formule sanguine -----	B	60	
Glycémie (à jeûn) -----	B	20	
Hémoglobine glycosylée -----	B	80	
Créatinine -----	B	20	
Cholestérol total -----	B	20	
Cholestérol LDL -----	B	40	
Triglycérides -----	B	40	
Fer sérique -----	B	40	
T4 libre -----	B	160	
Thyrostimuline (TSH us) -----	B	180	
PSA totale -----	B	200	Total : B 860

### Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5	
			TOTAL DOSSIER 1 310,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Mille Trois Cent Dix Dirhams



41، شارع شبيب أرسلان، الطابق الأرضي - تطوان

Tél./Fax: 0539 968 847 - GSM: 0662 077 554 - Email: alrazilaboratoire@gmail.com

IF: 20741745 - Patente: 51102804 - CNSS: 5179008 - ICE N°: 001890133000049