

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° P19-

057331

49996

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1856

Société :

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : Slaoui KHTATA

Date de naissance : 1956


Adresse : 50 Lot KHALFAOUI OUJDALIL

Tél. : 06 67 12 82 86

Total des frais engagés : 156,30 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 30/09/2020

Nom et prénom du malade : Slaoui KHTATA

Age : 64

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Céphalgie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA

Le : 30/09/2020

Signature de l'adhérent(e) :

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
30/09/2015	vers C		R	Hôpital Crédit Khalil Hamidou Dr. Oussama

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
ARMACIE BOULEVARD QODS LAOUI HAMDA ZAHRA 54, Boulevard El Qods tél.: 05 22 52 39 39 mblanca	30/09/2020	456,30

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000		COEFFICIENT DES TRAVAUX
D 00000000 35533411	B 00000000 11433553			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

## وصفة طبية Ordonnance

Casablanca, le : 30/09/2020

~~116,00 x 2~~

~~252,00~~

~~(AS) 155 wfx 107~~

~~22,60 x 8~~

~~180,80~~

~~AS 100ml 250~~

~~23,50~~

~~37 vahg 107~~

~~AS~~

~~456,30~~

~~7 = seauvi H1017A~~

~~7 = seauvi~~

~~9627 -~~

~~PHARMACE MANDAZAH~~  
~~SLAOUI 54, Boulevard Zaid~~  
~~Tel.: 05 22 39 39~~  
~~casablanca~~

~~18310~~

~~18158~~

~~7 = seauvi~~

*Hôpital Cheikh Khalifa Prof. OUHABI Hamid  
Nouakchott*







## NOTICE

### Dénomination du médicament

**TOPIRAMATE GT 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg**

Comprimés pelliculés

Boîte de 10 (TOPIRAMATE GT 25 mg)

Boîte de 30 (TOPIRAMATE GT 50 mg, 100 mg et 200 mg)

DCI : Topiramate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière/er.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  3. Comment prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  6. Informations supplémentaires.
1. QU'EST-CE QUE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique :

TOPIRAMATE GT appartient à un groupe de médicaments appelés « médicaments antiépileptiques ».

### Indications thérapeutiques :

Il est utilisé :

- seul pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants à partir de 6 ans;
- avec d'autres médicaments pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus,
- pour prévenir les migraines chez l'adulte.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ?

#### Ne prenez jamais TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE:

- si vous êtes allergique au topiramate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- pour la prévention de la migraine si vous êtes enceinte ou si vous êtes susceptible de devenir enceinte et que vous n'utilisez pas de contraception

si vous présentez ces symptômes, consultez un service médical immédiatement si

Lot: PL1335A

Per: 12/2022

PPV: 22DH60

onne sur 10)

ie sur 10)

nfusion, désorientation  
la pensée, perte de mémoire,  
tation, changement soudain ou

jouleuseuse

personne sur 100)

- 
- respiroires, y compris un essoufflement, perte d'appétit, nausées, vomissements, fatigue excessive, et battements cardiaques rapides ou irréguliers)
  - diminution ou perte de la transpiration (en particulier chez les jeunes enfants exposés à de fortes températures)
  - avoir des pensées d'automutilation grave, essayer de se provoquer de graves automutilations
  - perte d'une partie du champ visuel

#### Rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1 000)

- glaucome – blocage du fluide au niveau de l'œil entraînant une augmentation de la pression dans l'œil, une douleur, ou une vision diminuée
- D'autres effets indésirables incluent les suivants, s'ils deviennent graves, parlez-en à votre médecin ou pharmacien :

#### Très fréquents (pouvant affecter plus d'une personne sur 10)

- nez bouché, nez qui coule ou mal de gorge
- picotements, douleurs et/ou engourdissements de différentes parties du corps
- somnolence, fatigue
- sensations vertigineuses
- nausées, diarrhée
- perte de poids

#### Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- anémie (faible numération des globules rouges)
- réaction allergique (comme une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons, gonflement du visage, urticaire)
- perte d'appétit, diminution de l'appétit
- agression, agitation, colère, comportement abnormal
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- problèmes ou troubles du langage, troubles de l'élocution
- maladresse ou manque de coordination, sensation d'instabilité lors de la marche
- diminution de la capacité à effectuer des tâches de routine
- diminution, perte, ou pas de goût
- tremblements ou secousses musculaires involontaires ; mouvements rapides et incontrôlables des yeux
- perturbation visuelle, comme une vision double, une vision floue, une diminution de la vision, troubles de l'accommodation
- sensation de tourbillon (vertiges), bourdonnements dans les oreilles, douleur à l'oreille
- essoufflement

## NOTICE

### Dénomination du médicament

**TOPIRAMATE GT 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg**

Comprimés pelliculés

Boîte de 10 (TOPIRAMATE GT 25 mg)

Boîte de 30 (TOPIRAMATE GT 50 mg, 100 mg et 200 mg)

DCI : Topiramate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière/er.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  3. Comment prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  6. Informations supplémentaires.
1. QU'EST-CE QUE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique :

TOPIRAMATE GT appartient à un groupe de médicaments appelés « médicaments antiépileptiques ».

### Indications thérapeutiques :

Il est utilisé :

- seul pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants à partir de 6 ans;
- avec d'autres médicaments pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus,
- pour prévenir les migraines chez l'adulte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ?

### Ne prenez jamais TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE :

- si vous êtes allergique au topiramate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- pour la prévention de la migraine si vous êtes enceinte ou si vous êtes susceptible de devenir enceinte et que vous n'utilisez pas de contraception

si vous présentez ces symptômes, consultez un service médical immédiatement si

Lot: PL1335A

Per: 12/2022

PPV: 22DH60

onne sur 10)

ie sur 10)

nfusion, désorientation  
la pensée, perte de mémoire,  
tation, changement soudain ou

jouleuseuse

personne sur 100)

- 
- respiroires, y compris un essoufflement, perte d'appétit, nausées, vomissements, fatigue excessive, et battements cardiaques rapides ou irréguliers)
  - diminution ou perte de la transpiration (en particulier chez les jeunes enfants exposés à de fortes températures)
  - avoir des pensées d'automutilation grave, essayer de se provoquer de graves automutilations
  - perte d'une partie du champ visuel

### Rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1 000)

- glaucome – blocage du fluide au niveau de l'œil entraînant une augmentation de la pression dans l'œil, une douleur, ou une vision diminuée
- D'autres effets indésirables incluent les suivants, s'ils deviennent graves, parlez-en à votre médecin ou pharmacien :

### Très fréquents (pouvant affecter plus d'une personne sur 10)

- nez bouché, nez qui coule ou mal de gorge
- picotements, douleurs et/ou engourdissements de différentes parties du corps
- somnolence, fatigue
- sensations vertigineuses
- nausées, diarrhée
- perte de poids

### Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- anémie (faible numération des globules rouges)
- réaction allergique (comme une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons, gonflement du visage, urticaire)
- perte d'appétit, diminution de l'appétit
- agression, agitation, colère, comportement abnormal
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- problèmes ou troubles du langage, troubles de l'élocution
- maladresse ou manque de coordination, sensation d'instabilité lors de la marche
- diminution de la capacité à effectuer des tâches de routine
- diminution, perte, ou pas de goût
- tremblements ou secousses musculaires involontaires ; mouvements rapides et incontrôlables des yeux
- perturbation visuelle, comme une vision double, une vision floue, une diminution de la vision, troubles de l'accommodation
- sensation de tourbillon (vertiges), bourdonnements dans les oreilles, douleur à l'oreille
- essoufflement

## NOTICE

### Dénomination du médicament

**TOPIRAMATE GT 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg**

Comprimés pelliculés

Boîte de 10 (TOPIRAMATE GT 25 mg)

Boîte de 30 (TOPIRAMATE GT 50 mg, 100 mg et 200 mg)

DCI : Topiramate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière/er.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  3. Comment prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  6. Informations supplémentaires.
1. QU'EST-CE QUE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique :

TOPIRAMATE GT appartient à un groupe de médicaments appelés « médicaments antiépileptiques ».

### Indications thérapeutiques :

Il est utilisé :

- seul pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants à partir de 6 ans;
- avec d'autres médicaments pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus,
- pour prévenir les migraines chez l'adulte.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ?

#### Ne prenez jamais TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE :

- si vous êtes allergique au topiramate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- pour la prévention de la migraine si vous êtes enceinte ou si vous êtes susceptible de devenir enceinte et que vous n'utilisez pas de contraception

si vous présentez ces symptômes, consultez un service médical immédiatement si

Lot: PL1335A

Per: 12/2022

PPV: 22DH60

onne sur 10)

ie sur 10)

nfusion, désorientation  
la pensée, perte de mémoire,  
tation, changement soudain ou

jouleuseuse

personne sur 100)



- respiroires, y compris un essoufflement, perte d'appétit, nausées, vomissements, fatigue excessive, et battements cardiaques rapides ou irréguliers)
- diminution ou perte de la transpiration (en particulier chez les jeunes enfants exposés à de fortes températures)
- avoir des pensées d'automutilation grave, essayer de se provoquer de graves automutilations
- perte d'une partie du champ visuel

#### Rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1 000)

- glaucome – blocage du fluide au niveau de l'œil entraînant une augmentation de la pression dans l'œil, une douleur, ou une vision diminuée
- D'autres effets indésirables incluent les suivants, s'ils deviennent graves, parlez-en à votre médecin ou pharmacien :

#### Très fréquents (pouvant affecter plus d'une personne sur 10)

- nez bouché, nez qui coule ou mal de gorge
- picotements, douleurs et/ou engourdissements de différentes parties du corps
- somnolence, fatigue
- sensations vertigineuses
- nausées, diarrhée
- perte de poids

#### Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- anémie (faible numération des globules rouges)
- réaction allergique (comme une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons, gonflement du visage, urticaire)
- perte d'appétit, diminution de l'appétit
- agression, agitation, colère, comportement abnormal
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- problèmes ou troubles du langage, troubles de l'élocution
- maladresse ou manque de coordination, sensation d'instabilité lors de la marche
- diminution de la capacité à effectuer des tâches de routine
- diminution, perte, ou pas de goût
- tremblements ou secousses musculaires involontaires ; mouvements rapides et incontrôlables des yeux
- perturbation visuelle, comme une vision double, une vision floue, une diminution de la vision, troubles de l'accommodation
- sensation de tourbillon (vertiges), bourdonnements dans les oreilles, douleur à l'oreille
- essoufflement

## NOTICE

### Dénomination du médicament

**TOPIRAMATE GT 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg**

Comprimés pelliculés

Boîte de 10 (TOPIRAMATE GT 25 mg)

Boîte de 30 (TOPIRAMATE GT 50 mg, 100 mg et 200 mg)

DCI : Topiramate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière/er.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  3. Comment prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  6. Informations supplémentaires.
1. QU'EST-CE QUE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique :

TOPIRAMATE GT appartient à un groupe de médicaments appelés « médicaments antiépileptiques ».

### Indications thérapeutiques :

Il est utilisé :

- seul pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants à partir de 6 ans;
- avec d'autres médicaments pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus,
- pour prévenir les migraines chez l'adulte.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ?

#### Ne prenez jamais TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE :

- si vous êtes allergique au topiramate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- pour la prévention de la migraine si vous êtes enceinte ou si vous êtes susceptible de devenir enceinte et que vous n'utilisez pas de contraception

si vous présentez ces symptômes, consultez un service médical immédiatement si

Lot: PL1335A

Per: 12/2022

PPV: 22DH60

onne sur 10)

ie sur 10)

nfusion, désorientation  
la pensée, perte de mémoire,  
tation, changement soudain ou

jouleuseuse

personne sur 100)



- respiroires, y compris un essoufflement, perte d'appétit, nausées, vomissements, fatigue excessive, et battements cardiaques rapides ou irréguliers)
- diminution ou perte de la transpiration (en particulier chez les jeunes enfants exposés à de fortes températures)
- avoir des pensées d'automutilation grave, essayer de se provoquer de graves automutilations
- perte d'une partie du champ visuel

#### Rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1 000)

- glaucome – blocage du fluide au niveau de l'œil entraînant une augmentation de la pression dans l'œil, une douleur, ou une vision diminuée
- D'autres effets indésirables incluent les suivants, s'ils deviennent graves, parlez-en à votre médecin ou pharmacien :

#### Très fréquents (pouvant affecter plus d'une personne sur 10)

- nez bouché, nez qui coule ou mal de gorge
- picotements, douleurs et/ou engourdissements de différentes parties du corps
- somnolence, fatigue
- sensations vertigineuses
- nausées, diarrhée
- perte de poids

#### Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- anémie (faible numération des globules rouges)
- réaction allergique (comme une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons, gonflement du visage, urticaire)
- perte d'appétit, diminution de l'appétit
- agression, agitation, colère, comportement abnormal
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- problèmes ou troubles du langage, troubles de l'élocution
- maladresse ou manque de coordination, sensation d'instabilité lors de la marche
- diminution de la capacité à effectuer des tâches de routine
- diminution, perte, ou pas de goût
- tremblements ou secousses musculaires involontaires ; mouvements rapides et incontrôlables des yeux
- perturbation visuelle, comme une vision double, une vision floue, une diminution de la vision, troubles de l'accommodation
- sensation de tourbillon (vertiges), bourdonnements dans les oreilles, douleur à l'oreille
- essoufflement

## NOTICE

### Dénomination du médicament

**TOPIRAMATE GT 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg**

Comprimés pelliculés

Boîte de 10 (TOPIRAMATE GT 25 mg)

Boîte de 30 (TOPIRAMATE GT 50 mg, 100 mg et 200 mg)

DCI : Topiramate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière/er.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  3. Comment prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  6. Informations supplémentaires.
1. QU'EST-CE QUE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique :

TOPIRAMATE GT appartient à un groupe de médicaments appelés « médicaments antiépileptiques ».

### Indications thérapeutiques :

Il est utilisé :

- seul pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants à partir de 6 ans;
- avec d'autres médicaments pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus,
- pour prévenir les migraines chez l'adulte.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ?

#### Ne prenez jamais TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE :

- si vous êtes allergique au topiramate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- pour la prévention de la migraine si vous êtes enceinte ou si vous êtes susceptible de devenir enceinte et que vous n'utilisez pas de contraception

Lot: PL1335A

Per: 12/2022

PPV: 22DH60

onne sur 10)

ie sur 10)

nfusion, désorientation  
la pensée, perte de mémoire,  
tion, changement soudain ou

jouleuseuse

personne sur 100)

- 
- respiroires, y compris un essoufflement, perte d'appétit, nausées, vomissements, fatigue excessive, et battements cardiaques rapides ou irréguliers)
  - diminution ou perte de la transpiration (en particulier chez les jeunes enfants exposés à de fortes températures)
  - avoir des pensées d'automutilation grave, essayer de se provoquer de graves automutilations
  - perte d'une partie du champ visuel

#### Rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1 000)

- glaucome – blocage du fluide au niveau de l'œil entraînant une augmentation de la pression dans l'œil, une douleur, ou une vision diminuée
- D'autres effets indésirables incluent les suivants, s'ils deviennent graves, parlez-en à votre médecin ou pharmacien :

#### Très fréquents (pouvant affecter plus d'une personne sur 10)

- nez bouché, nez qui coule ou mal de gorge
- picotements, douleurs et/ou engourdissements de différentes parties du corps
- somnolence, fatigue
- sensations vertigineuses
- nausées, diarrhée
- perte de poids

#### Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- anémie (faible numération des globules rouges)
- réaction allergique (comme une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons, gonflement du visage, urticaire)
- perte d'appétit, diminution de l'appétit
- agression, agitation, colère, comportement abnormal
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- problèmes ou troubles du langage, troubles de l'élocution
- maladresse ou manque de coordination, sensation d'instabilité lors de la marche
- diminution de la capacité à effectuer des tâches de routine
- diminution, perte, ou pas de goût
- tremblements ou secousses musculaires involontaires ; mouvements rapides et incontrôlables des yeux
- perturbation visuelle, comme une vision double, une vision floue, une diminution de la vision, troubles de l'accommodation
- sensation de tourbillon (vertiges), bourdonnements dans les oreilles, douleur à l'oreille
- essoufflement

## NOTICE

### Dénomination du médicament

**TOPIRAMATE GT 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg**

Comprimés pelliculés

Boîte de 10 (TOPIRAMATE GT 25 mg)

Boîte de 30 (TOPIRAMATE GT 50 mg, 100 mg et 200 mg)

DCI : Topiramate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière/er.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  3. Comment prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  6. Informations supplémentaires.
1. QU'EST-CE QUE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique :

TOPIRAMATE GT appartient à un groupe de médicaments appelés « médicaments antiépileptiques ».

### Indications thérapeutiques :

Il est utilisé :

- seul pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants à partir de 6 ans;
- avec d'autres médicaments pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus,
- pour prévenir les migraines chez l'adulte.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ?

#### Ne prenez jamais TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE :

- si vous êtes allergique au topiramate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- pour la prévention de la migraine si vous êtes enceinte ou si vous êtes susceptible de devenir enceinte et que vous n'utilisez pas de contraception

Lot: PL1335A

Per: 12/2022

PPV: 22DH60

onne sur 10)

ie sur 10)

nfusion, désorientation  
la pensée, perte de mémoire,  
tion, changement soudain ou

jouleuseuse

personne sur 100)

- 
- respiroires, y compris un essoufflement, perte d'appétit, nausées, vomissements, fatigue excessive, et battements cardiaques rapides ou irréguliers)
  - diminution ou perte de la transpiration (en particulier chez les jeunes enfants exposés à de fortes températures)
  - avoir des pensées d'automutilation grave, essayer de se provoquer de graves automutilations
  - perte d'une partie du champ visuel

#### Rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1 000)

- glaucome – blocage du fluide au niveau de l'œil entraînant une augmentation de la pression dans l'œil, une douleur, ou une vision diminuée
- D'autres effets indésirables incluent les suivants, s'ils deviennent graves, parlez-en à votre médecin ou pharmacien :

#### Très fréquents (pouvant affecter plus d'une personne sur 10)

- nez bouché, nez qui coule ou mal de gorge
- picotements, douleurs et/ou engourdissements de différentes parties du corps
- somnolence, fatigue
- sensations vertigineuses
- nausées, diarrhée
- perte de poids

#### Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- anémie (faible numération des globules rouges)
- réaction allergique (comme une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons, gonflement du visage, urticaire)
- perte d'appétit, diminution de l'appétit
- agression, agitation, colère, comportement abnormal
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- problèmes ou troubles du langage, troubles de l'élocution
- maladresse ou manque de coordination, sensation d'instabilité lors de la marche
- diminution de la capacité à effectuer des tâches de routine
- diminution, perte, ou pas de goût
- tremblements ou secousses musculaires involontaires ; mouvements rapides et incontrôlables des yeux
- perturbation visuelle, comme une vision double, une vision floue, une diminution de la vision, troubles de l'accommodation
- sensation de tourbillon (vertiges), bourdonnements dans les oreilles, douleur à l'oreille
- essoufflement

## NOTICE

### Dénomination du médicament

**TOPIRAMATE GT 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg**

Comprimés pelliculés

Boîte de 10 (TOPIRAMATE GT 25 mg)

Boîte de 30 (TOPIRAMATE GT 50 mg, 100 mg et 200 mg)

DCI : Topiramate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière/er.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  3. Comment prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  6. Informations supplémentaires.
1. QU'EST-CE QUE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique :

TOPIRAMATE GT appartient à un groupe de médicaments appelés « médicaments antiépileptiques ».

### Indications thérapeutiques :

Il est utilisé :

- seul pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants à partir de 6 ans;
- avec d'autres médicaments pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus,
- pour prévenir les migraines chez l'adulte.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ?

#### Ne prenez jamais TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE :

- si vous êtes allergique au topiramate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- pour la prévention de la migraine si vous êtes enceinte ou si vous êtes susceptible de devenir enceinte et que vous n'utilisez pas de contraception

Lot: PL1335A

Per: 12/2022

PPV: 22DH60

onne sur 10)

ie sur 10)

nfusion, désorientation  
la pensée, perte de mémoire,  
tion, changement soudain ou

jouleuseuse

personne sur 100)

- 
- respiroires, y compris un essoufflement, perte d'appétit, nausées, vomissements, fatigue excessive, et battements cardiaques rapides ou irréguliers)
  - diminution ou perte de la transpiration (en particulier chez les jeunes enfants exposés à de fortes températures)
  - avoir des pensées d'automutilation grave, essayer de se provoquer de graves automutilations
  - perte d'une partie du champ visuel

#### Rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1 000)

- glaucome – blocage du fluide au niveau de l'œil entraînant une augmentation de la pression dans l'œil, une douleur, ou une vision diminuée
- D'autres effets indésirables incluent les suivants, s'ils deviennent graves, parlez-en à votre médecin ou pharmacien :

#### Très fréquents (pouvant affecter plus d'une personne sur 10)

- nez bouché, nez qui coule ou mal de gorge
- picotements, douleurs et/ou engourdissements de différentes parties du corps
- somnolence, fatigue
- sensations vertigineuses
- nausées, diarrhée
- perte de poids

#### Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- anémie (faible numération des globules rouges)
- réaction allergique (comme une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons, gonflement du visage, urticaire)
- perte d'appétit, diminution de l'appétit
- agression, agitation, colère, comportement abnormal
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- problèmes ou troubles du langage, troubles de l'élocution
- maladresse ou manque de coordination, sensation d'instabilité lors de la marche
- diminution de la capacité à effectuer des tâches de routine
- diminution, perte, ou pas de goût
- tremblements ou secousses musculaires involontaires ; mouvements rapides et incontrôlables des yeux
- perturbation visuelle, comme une vision double, une vision floue, une diminution de la vision, troubles de l'accommodation
- sensation de tourbillon (vertiges), bourdonnements dans les oreilles, douleur à l'oreille
- essoufflement

## NOTICE

### Dénomination du médicament

**TOPIRAMATE GT 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg**

Comprimés pelliculés

Boîte de 10 (TOPIRAMATE GT 25 mg)

Boîte de 30 (TOPIRAMATE GT 50 mg, 100 mg et 200 mg)

DCI : Topiramate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière/er.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  3. Comment prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
  6. Informations supplémentaires.
1. QU'EST-CE QUE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique :

TOPIRAMATE GT appartient à un groupe de médicaments appelés « médicaments antiépileptiques ».

### Indications thérapeutiques :

Il est utilisé :

- seul pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants à partir de 6 ans;
- avec d'autres médicaments pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus,
- pour prévenir les migraines chez l'adulte.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ?

#### Ne prenez jamais TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE :

- si vous êtes allergique au topiramate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- pour la prévention de la migraine si vous êtes enceinte ou si vous êtes susceptible de devenir enceinte et que vous n'utilisez pas de contraception

Lot: PL1335A

Per: 12/2022

PPV: 22DH60

onne sur 10)

ie sur 10)

nfusion, désorientation  
la pensée, perte de mémoire,  
tion, changement soudain ou

jouleuseuse

personne sur 100)

- 
- respiroires, y compris un essoufflement, perte d'appétit, nausées, vomissements, fatigue excessive, et battements cardiaques rapides ou irréguliers)
  - diminution ou perte de la transpiration (en particulier chez les jeunes enfants exposés à de fortes températures)
  - avoir des pensées d'automutilation grave, essayer de se provoquer de graves automutilations
  - perte d'une partie du champ visuel

#### Rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1 000)

- glaucome – blocage du fluide au niveau de l'œil entraînant une augmentation de la pression dans l'œil, une douleur, ou une vision diminuée
- D'autres effets indésirables incluent les suivants, s'ils deviennent graves, parlez-en à votre médecin ou pharmacien :

#### Très fréquents (pouvant affecter plus d'une personne sur 10)

- nez bouché, nez qui coule ou mal de gorge
- picotements, douleurs et/ou engourdissements de différentes parties du corps
- somnolence, fatigue
- sensations vertigineuses
- nausées, diarrhée
- perte de poids

#### Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- anémie (faible numération des globules rouges)
- réaction allergique (comme une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons, gonflement du visage, urticaire)
- perte d'appétit, diminution de l'appétit
- agression, agitation, colère, comportement abnormal
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- problèmes ou troubles du langage, troubles de l'élocution
- maladresse ou manque de coordination, sensation d'instabilité lors de la marche
- diminution de la capacité à effectuer des tâches de routine
- diminution, perte, ou pas de goût
- tremblements ou secousses musculaires involontaires ; mouvements rapides et incontrôlables des yeux
- perturbation visuelle, comme une vision double, une vision floue, une diminution de la vision, troubles de l'accommodation
- sensation de tourbillon (vertiges), bourdonnements dans les oreilles, douleur à l'oreille
- essoufflement