

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

tions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

ND: 49309

Optique

EL HADDAO M

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 83.1

Société : Rehailis

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom : EL HADDAO M

Date de naissance : 1935

Adresse : Lot Jarni N° 9 Toubasque Scelé

Tél. : 0666.00.04.93 Total des frais engagés

685,60 DH Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age: 1935

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Cataracte

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16.11.2010				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. MEDARHRI Soumia Rue El Mahdi Ben Teumart Hay Inouhidine, Tiziout - Ss16 T: 05 37 919 85	16/11/2020	340.60
SL MOUAHAD Soumia Teumart Hay Tiziout	10/11/2020	345.00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires



AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	D 00000000 35533411	B 00000000 11433553		MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



PT201116123358.

16 novembre 2020

Mr. EL HADDAD MOHAMED

29.40

CHIBROCADRON COLLYRE

1 goutte 2 fois pdt 7 j

1 goutte 1 fois pdt 7 j,, dans l'œil gauche

147.00

THÉALOSE

1 goutte 5 fois par jour et à la demande ,
dans les deux yeux, pendant 3 Mois

164.20

COSOPT 20 / 5 MG / MG COLLYRE

1 goutte 2 fois par jours 8het 20 h,
dans les deux yeux, pendant 3 Mois

$T = 340.60$

MARCHE AL MOUAHA
صيدلية المعاها
Dr. MEDARHRI Soumia
9, Rue El Mahdi Ben Toumart Hay
Al moushidine, Tétouan - Salé -
Tél. : 05 37 68 09 68

Pr Mouhcine EL BAKKALI

Ophtalmologiste
Chirurgie de la Cataracte
Chirurgie Réfractive - Laser
GSM/SMS : 06 61 22 93 99
TEL : 05 37 67 66 66

anaphylactique) (voir rubrique 7), baisse du sucre dans le sang (pancréas) pouvant être fatale, crises d'asthme (aspieze médullaire) pouvant également entraîner une mort subite (voir rubrique 7).

• Pour conduire à des pensées suicidaires, à des

troubles de la marche), troubles de l'odontologie, hypertension intracrânienne et pseudotumeur

(voir rubrique 7).

• Trouboussant très rarement à une insuffisance cardiaque, une crise d'angine de poitrine, une crise d'ictus, éruptions cutanées diverses (voir rubrique 7).

• Estimez à la base des données

• L'efficacité avec hyperactivité (hyponmie)

• L'efficacité mettant votre vie en danger, rythme cardiaque irrégulier, arrêt cardiaque, observé sur un ECG, enregistrement du tracé

• Maladie cardiaque, maladie pulmonaire entraînée par des environs de la maladie

• L'efficacité avec hypertension artérielle ou

un accident vasculaire cérébral, des effets indésirables neurologiques (crises convulsives) pourraient se produire. Si des crises convulsives surviennent, arrêtez SPECTRUM, et contactez immédiatement votre médecin.

• Vous pourrez présenter des symptômes évocateurs d'une neuropathie, tels que des douleurs, des brûlures, des picotements, un engourdissement et/ou une faiblesse musculaire. Si de tels symptômes surviennent, arrêtez SPECTRUM, et contactez immédiatement votre médecin.

• Des réactions psychiatriques peuvent survenir pendant la première prise de SPECTRUM. Si vous souffrez de dépression ou de psychose, vos symptômes pourraient s'aggraver lors du traitement par SPECTRUM. Dans de rares cas, une dépression ou une psychose peut évoluer vers des pensées suicidaires, des tentatives de suicide ou un suicide. Si de telles réactions surviennent, contactez immédiatement votre médecin.

• Ces cas d'hypoglycémie ont été rapportés le plus souvent chez des patients diabétiques, principalement dans la population âgée. Si cet effet indésirable survient, contactez immédiatement votre médecin.

• Une diarrhée peut se produire pendant la prise d'antidiabétiques, y compris avec SPECTRUM, et même plusieurs semaines après la fin du traitement. Si la diarrhée devient sévère ou persistante, et si vous remarquez la présence de sang ou de muqueux dans vos selles, arrêtez immédiatement de prendre SPECTRUM, et contactez immédiatement votre médecin, car votre vie pourrait être mise en danger. Ne prenez pas de médicaments destinés à bloquer ou ralentir le transit intestinal.

• Si votre voix se dégrade ou si vous ressentez un quelconque effet au niveau des yeux, consultez immédiatement un ophtalmologue.

• Votre peau devient plus sensible au soleil et aux rayons ultraviolets (UV) lorsque vous prenez SPECTRUM. Évitez toute exposition prolongée au soleil ou aux rayons UV artificiels comme ceux des cabines de bronze.

• Prévenez le médecin ou le pharmacien du laboratoire d'analyses que vous prenez SPECTRUM, si vous devez subir un prélèvement de sang ou d'urine.

• Si vous avez des problèmes rénaux, prévenez votre médecin car la dose de SPECTRUM doit éventuellement être adaptée.

• SPECTRUM, peut provoquer des troubles hématoïques. Si vous remarquez le moins symptôme tel qu'une perte d'appétit, un écoulement de la peau, des urines foncées, des dérangements ou une sensibilité de l'estomac, à la palpation, contactez immédiatement votre médecin.

• SPECTRUM, peut entraîner un diminution du taux de globules blancs dans votre sang et réduire votre résistance aux infections. Si vous présentez une infection accompagnée de symptômes tels qu'un état de fatigue et/ou une altération importante de votre état général ou une fièvre accompagnée d'effusions d'infection locale tels que des douleurs dans la gorge, la pharynx, la bouche ou des problèmes urinaires, vous devez consulter immédiatement votre médecin. Une analyse de sang sera effectuée afin de rechercher une éventuelle diminution du taux de certains globules blancs (agranulocytose). Il est important d'informer à votre médecin que vous prenez ce médicament.

8. INTERACTION AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS ET D'AUTRES FORMES D'INTERACTION

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

• Ne prenez pas de SPECTRUM, en même temps que la tizanidine car cela pourra provoquer des effets indésirables tels qu'une baisse de la tension artérielle et des somnolences (voir rubrique 5).

Les médicaments suivants sont connus pour interagir avec SPECTRUM Prendre SPECTRUM, en même temps que ces médicaments pourraient avoir une incidence sur les effets thérapeutiques de ces produits, et augmenter la probabilité de survenue des effets indésirables.

Prévenez votre médecin si vous prenez :

• Antivitamine K (par exemple, la warfarine, l'acénocumarol, la phenprocoumon ou le fluindione) ou autres anticoagulants oraux (destinés à fluidifier le sang)

• Probenécide (utilisé pour traiter la goutte)

• Méthotrexate (utilisé dans certains types de cancer, le gynécologie, la polyarthrite rhumatoïde)

• Thiotéophylle (utilisée dans des problèmes respiratoires)

• Tizanidine (utilisée dans les problèmes de spasticité musculaire liés à la sclérose en plaques)

• Clorazepate (utilisée contre l'anxiété)

• Clorazepate (utilisée dans certaines maladies psychiatriques)

• Ropinirole (utilisée dans la maladie de Parkinson)

• Phénytoïne (utilisée dans l'épilepsie)

• Mécopropamide (utilisée dans les nausées et les vomissements)

• Colisopnone (utilisée dans les malades de peau, la polyarthrite rhumatoïde, et les transplantations au groupe de la famille des macrolides), certaines

• Zopiclone (utilisé dans les troubles du sommeil)

• SPECTRUM, peut augmenter

• Pentoxifyline (utilisée dans la circulation)

• Dextrofentanyl (utilisée dans la douleur)

• Lidocaïne (utilisée dans les anesthésies)

• Stétronaf (par exemple, Agoméline)

• Certains médicaments à emmagasement de prendre.

• Des anti-acides

• L'ombromazole

• Des compléments

• Du sacrafate

• Un chelateur polymérique du phosphate (par ex. le sévelamer ou le carbonate de lanthane). Des médicaments ou compléments contenant du calcium, du magnésium, de l'aluminium ou du fer. S'il est essentiel pour vous de prendre ces médicaments, prenez SPECTRUM, au moins deux heures avant ou quatre heures après ces médicaments.

Spectrum avec des aliments et boissons :

Si vous prenez SPECTRUM en dehors des repas, ne consommez pas de produits laitiers (par ex. lait ou yaourt) ou de boissons enrichies en calcium quand vous prenez les comprimés de ciprofloxacine car les produits laitiers peuvent diminuer l'effet du médicament.

9. UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Il est préférable d'éviter d'utiliser SPECTRUM pendant la grossesse.

Ne prenez pas de SPECTRUM, pendant l'allaitement car la ciprofloxacine passe dans le lait maternel et pourra nuire à la santé de votre enfant.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

10. LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES DU TRAITEMENT SUR LA CAPACITÉ A CONDUIRE A UN VEHICULE OU A UTILISER CERTAINES MACHINES

SPECTRUM peut abaisser votre niveau de vigilance. Des effets indésirables neurologiques peuvent se produire. Par conséquent, assurez-vous de savoir comment vous réagissez à SPECTRUM avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines. En cas de doute, parlez-en avec votre médecin.

11. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSE

Si vous avez pris plus de ce médicament que vous n'en aviez dû.

Si vous avez dépassé la dose prescrite, consultez immédiatement votre médecin. Si possible, emportez les comprimés restants ou la boîte avec vous pour les montrer au médecin.

12. CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES

Si vous oubliez de prendre ce médicament:

Preniez la dose oubliée dès que possible, puis continuez le traitement normalement. Toutefois, si l'est presque l'heure de prendre la suivante, ne prenez pas la dose oubliée et continuez le traitement normalement. Ne prenez pas de doses doubles pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Veillez à suivre votre traitement jusqu'à la fin.

13. MENTION, SI NÉCESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAZ

Si vous arrêtez de prendre ce médicament:

Il est important que vous suiviez le traitement jusqu'à la fin même si vous commencez à vous sentir mieux après quelques jours. Si vous arrêtez de prendre ce médicament trop tôt, votre infection pourra ne pas être complètement guérie et les symptômes de l'infection pourront réapparaître ou s'aggraver. Vous pourrez également développer une résistance bactérienne à cet antibiotique.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

14. CONSEILS ET EDUCATION SANITAIRE :

Que savoir sur les antibiotiques ?

Les antibiotiques sont utilisés pour combattre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance. Il rend certains traitements antibiotiques inefficaces.

La résistance s'acquiert par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de faciliter l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison si même de rendre inefficace ce médicament, si vous ne respectez pas:

- La dose à prendre

- Les moments de prise

- La durée de traitement

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

1) Utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.

2) Respectez strictement votre ordonnance.

3) Ne réalisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.

4) Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.

5) Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

Conditions de prescription et de délivrance

Tableau A (Liste I).

surveillance

ra intérieure à 30°C.

à la vue des enfants.

Chibro-Codexin 5 ml

مchor-كلارون ٥ مل

Lot / Fab / EXP

1N79

03 2020

03 2023

LOT 200546

EXP 04/2023

PPV 83.20 DH

شيبرووكادرون

محلول قطرات العين في قارورة

ديكسا ميتازون / نيوميسين

إقرأ بتمعن هذه النشرة بأكملها قبل استعمال هذا الدواء.

* احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقرائتها مجدداً.

* إذا كانت لديك أستلة أخرى، إذا كان لديك شيك، طلب

معلومات أكثر من طبيبك أو من الصيدلي.

* لقد وصف لك هذا الدواء شخصياً، لا تعطيه لآدا شخص آخر

حتى وإن كان يبدي نفس الأعراض لأن ذلك يمكن أن يكون

ضراراً له.

* في حالة تفاقم أحد الآثار الغير مرغوب فيها أو ملاحظة أثر

غير مرغوب فيه غير وارد في هذه النشرة، أعلم طبيبك أو

صيدليك.

في هذه النشرة:

1. ما هو شيبرووكادرون محلول قطرات للعين في قارورة و

في أي حالة يستعمل ؟

2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استعمال

شيبرووكادرون محلول قطرات للعين في قارورة ؟

3. كيف يستعمل شيبرووكادرون محلول قطرات للعين في

قارورة ؟

4. ما هي الآثار الغير مرغوب فيها المحتملة ؟

5. كيف يتم حفظ شيبرووكادرون محلول قطرات للعين في

قارورة ؟

6. معلومات إضافية.

1. ما هو شيبرووكادرون محلول قطرات للعين في قارورة في أي حالة يستعمل ؟

كورتيكويド مفرونة بمضادات العدوى

هذا الدواء هو محلول قطرات للعين تحتوي على:

مضاد حيوي من فصيلة الأمينوسيد: النيوميسين

و كورتيكويد: الديكساميتازون.

يوصى هذا الدواء في العلاج الموضعي لبعض التهابات العين وعدهاها :

بعد جراحة العين

في حالات العدوى المصحوبة بالالتهابات التي تسببها بكتيريا يمكن محاربتها بواسطة المضاد الحيوي الموجود في هذا الدواء.

2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استعمال

شيبرووكادرون محلول قطرات للعين في قارورة ؟

لا ينفي أحداً استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:

حساسية لأحد مكونات هذا الدواء

بعض التهابات القرنية (هرس القرنية ظهاري تعصبي،

التهاب قرنى فطاري).

عدوات فطرية وسلية للعين.

إصابات سابقة بزرق العين شخصية كانت أم عائلية.

التهابات القرنية والملتحمة الفيروسية في مرحلة مبكرة.

عدوات متقدمة فرعية للجفون و العين بجرائم مقاومة

للنيوميسين.

في حالة وجود شيك، من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي

يرجى توخي الحرر عند استعمال شيبرووكادرون محلول قطرات

للعين في قارورة:

تحذيرات خاصة

لا يلعن ولا يحقن لا في الجيز المحيط بالعين و لا في باطنها.

في حالة العلاج بنوع آخر من قطرات العين في نفس الوقت يجب

فصل عملية تقطير الدوائين بهامش زمني يقدر بـ 15-20 ثانية.

كـ 1-2 ثانية.

مدة العلاج

في المتوسط 7 أيام.

يمكن وصف علاج أطول وع

لرaqueة صارمة من طرف طب

في كل الأحوال ينبغي التقييد و

ما يجب فعله في حالةأخذ جر

محلول قطرات للعين في قارو

Lot / Fab / EXP

Chihiro-Cardon 5 ml

يمكن أن ينتج عن التقطير المتكرر محلول قطرات العين لمدة

طويلة مرور مجموعى لا يستهان به للمواد الفعالة ، فرت ضغط

العين ، تكثف الخلط البوليوري ، التهاب القرنية السطحية ، تاخر في

الالتفات.

إذا تناولت جرعة مفرطة من شيبرووكادرون محلول قطرات للعين

في قارورة و لا حظت آثار غير مرغوب فيها غير وارد في هذه

النشرة، أخبر طبيبك .

إذا نسيت أخذ شيبرووكادرون محلول قطرات للعين في قارورة:

إذا نسيت وضع جرعة، قم بوضعها في أقرب وقت ممكن إلا إذا

كان وقت الجرعة المطلوبة قد أصبح وشكراً.

في هذه الحالة، استمر في علاجك مثل ما وصفه لك طبيبك

4. ما هي الآثار الغير مرغوب فيها المحتملة ؟

متى كل الأدوية ، يمكن أن تترتب عن شيبرووكادرون محلول

قطرات للعين في قارورة آثار غير مرغوب فيها ولكن ليس كل

الأشخاص معرضون لها

• إحساس بالحرقة ، تدمع ، رطوبة عينية واحمرار.

• خطر حدوث ردود فعل حساسية

• في حالة الاستعمال المطول: ارتفاع ضغط العين، تكثف الخلط

البوليوري، التهاب سطحي في القرنية.

أعلم فوراً الطبيب أو الصيدلي في حالة ظهور أي أعراض غير

اعتيادية هماها.

إذا لاحظت أي آثار غير مرغوب فيه و مزاج غير وارد في هذه

النشرة أو في حالة تفاقم بعض الآثار الغير مرغوب فيها أخبر

طبيبك أو صيدليك بذلك.

5. كيف يتم حفظ شيبرووكادرون محلول قطرات للعين في

قارورة ؟

لا يترك لا في متناول الأطفال و لا على مرأى منهم.

لا ينبغي تجاوز التاريخ الأقصى للإستعمال الوارد على الغلاف

الخارجي لشيبرووكادرون محلول قطرات العين في قارورة.

لا يجب حفظ هذا الدواء أكثر من 15 يوماً على أول استعمال.

سجل يومياً تاريخ فتحottle العلبة على الغلاف.

لا يجب رمي الأدوية في المجاري أو ضمن القمامات المنزلية.

اسأل صيدليك عما يجب فعله بالأدوية الغير مستعملة. ستحصل

هذه التدابير بالمحافظة على البيئة.

6. معلومات إضافية.

ماذا يحتوي شيبرووكادرون محلول قطرات للعين في قارورة ؟

المواد الفعالة هي:

فوسفات الصوديوم ثانوي الإيهامة، برومور البنزوديسيتونيوم..... 109,3.....

كمية مناسبة من فوسفات الديكساميتازون..... 100,0.....

سولفات النيوميسين..... 350000.....

كل 100 مل محلول قطرات العين

1 مل من محلول قطرات العين يحتوي على 30 قطرة، تحتوى

كل قطرة على:

0,036 مل من فوسفات الصوديوم الديكساميتازون ما يناسب

0,033 مل من فوسفات الديكساميتازون

117 و د من سولفات النيوميسين

المكونات الأخرى هي:

سيترات الصوديوم ثانوي الإيهامة، برومور البنزوديسيتونيوم،

TOBRADEX®
POMMADÉ OPHTALMIQUE
3,5 G PPV : 54,40 DHS
Boîte de 1 tube Laboratoires Sothema, Bouskoura
AMM N° 455/18 DMP/ 21/ NRQ



69020-4

6 118 001 070602

NOVARTIS

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :

TOBRADEX®

Pommade ophtalmique

Tobramycine/Dexaméthasone

Tube de 3,5 g

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que **Tobradex Pommade ophtalmique** et dans quel cas est-elle utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **Tobradex Pommade ophtalmique** ?
- Comment utiliser **Tobradex Pommade ophtalmique** ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver **Tobradex Pommade ophtalmique** ?
- Informations supplémentaires.

1- QU'EST-CE QUE TOBRADEX POMMADÉ OPHTALMIQUE ET DANS QUELS CAS EST-ELLE UTILISÉE ?

- La pommade ophtalmique TobraDex contient les principes actifs tobramycine (antibiotique) et dexaméthasone (glucocorticoïde à action anti-inflammatoire) et est utilisée pour le traitement de certaines inflammations oculaires avec infection oculaire bactérienne concomitante.
- TobraDex pommade ophtalmique est strictement soumis à prescription médicale et ne peut être utilisé qu'avec une ordonnance par le médecin.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER TOBRADEX POMMADÉ OPHTALMIQUE ?

Contre-indications :

N'utilisez jamais Tobradex Pommade ophtalmique dans les cas suivants :

- d'une hypersensibilité (allergie) connue ou suspectée à l'une

utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

L'utilisation de la pommade ophtalmique TobraDex est déconseillée pendant la grossesse.

Si vous êtes enceinte ou envisagez une grossesse, n'utilisez ce médicament que sur autorisation de votre médecin.

L'utilisation de la pommade ophtalmique TobraDex est déconseillée pendant l'allaitement. Vous devez donc soit cesser d'allaiter, soit arrêter le traitement.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :

La vue pouvant être provisoirement troublée juste après l'application de la pommade ophtalmique, il est recommandé d'attendre que le symptôme disparaisse avant de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine.

3- COMMENT UTILISER TOBRADEX POMMADÉ OPHTALMIQUE ?

Posologie/Mode d'emploi

Adulte :

La posologie du médicament doit être déterminée par le médecin individuellement pour chaque patient. Respectez dans tous les cas la dose fixée par votre médecin. Ni la dose journalière, ni la durée du traitement ne doivent être modifiées sans en parler à votre médecin. De plus, le traitement ne doit pas être interrompu sans instruction de la part de votre médecin. En cas de gonflement du tronc et du visage (syndrome de Cushing) et/ou de suppression surrénalienne, vous ne devez pas interrompre le traitement brutalement, mais le réduire progressivement, selon les instructions de votre médecin, jusqu'à l'arrêter complètement.

Normalement on applique dans le sac conjonctival de l'œil atteint 3 à 4x par jour un bout de pommade d'environ 1 cm.

Consultez votre médecin ou pharmacien lorsque vous pensez que l'efficacité du médicament est trop faible ou trop forte.

Votre médecin peut prescrire la pommade ophtalmique TobraDex pour suppléer le traitement avec le collyre TobraDex (il est recommandé d'appliquer la pommade ophtalmique TobraDex le soir avant le coucher).

Enfants et adolescents :

L'utilisation et la sécurité de la pommade ophtalmique TobraDex n'ont pas été testées chez les enfants et les adolescents.

4- QUELS SONT LES EFFETS IDESIRABLES EVENTUELS ?

Occasionnels (peuvent concerner jusqu'à 1 patient traité sur 100) :

Augmentation de la pression intraoculaire, douleurs oculaires, irritations oculaires, démangeaisons à l'œil, gêne oculaire.

Rares (peuvent concerner jusqu'à 1 patient traité sur 1000) :

- قم بتنقير قطرة في أسفل الرتج الملتحمي (المسافة بين العين والجفن) بسحب الجفن السفلي بلطف ونظر إلى الأعلى.
 - إعادة غلق القارورة بعد الاستعمال.

الدراة:

قطرة واحدة (1) في العين، 4 إلى 6 مرات في اليوم.
يمكن لحامل العدسات اللاصقة استعمال تيالوز.

٢٦

تهيج العين المعتدل يحتمل في حالات نادرة.

Digitized by srujanika@gmail.com

لا تحفظ القارورة المفتوحة لمدة تفوق 3 أشهر.

يحفظ في درجة حرارة تقل عن 25°C.

لا تتعدي تاريخ نهاية الصلاحية المدون على التغليف الخارجي . يشير تاريخ نهاية الصلاحية إلى المنتوج في تغليفه السليم والمحفظ بطريقة صحيحة . لا تستعمل ، قارئة تالفة .

تاریخ مراجعة النشرة : 05/2015

رقم الترخيص بالجزائر : DMClassellb/CE0459/121/17

رقم الترخيص بالمغرب : 1573/2016/DMP/20/DM

N2762C10MAG/0919



معامل

بذرورة القارورة خاصة إذا ظننت أنك مصاب

Digitized by Google

d'utilisation

cation unique de tréhalose et de hyaluronate de sodium, protection, l'hydratation et la lubrification de la surface œil, avec un maximum de confort

solution sans conservateur conditionnée en flacon multidose

et breveté permet de délivrer des gouttes sans une membrane filtrante de porosité 0,2 µm, qui évite toute contamination de la solution pendant son utilisation.

Elle peut être utilisée pendant 3 mois après ouverture du

- Ne pas toucher l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon, en particulier si vous pensez souffrir d'une infection oculaire,
- Instiller une goutte dans le cul-de-sac conjonctival inférieur (espace entre l'œil et la paupière), en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas et en regardant vers le haut.
- Reboucher le flacon après utilisation.

DOSAGE :

1 goutte dans chaque œil, 4 à 6 fois par jour.

THEALOSE peut être utilisé par les porteurs de lentilles de contact.

RÈLES ET PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

Antécédents d'allergie à l'un des constituants de l'œil avec l'embout du flacon.

de la bague d'inviolabilité, ne pas utiliser le flacon.

NE LA PORTER DES ENFANTS.

ns 10 minutes l'administration de deux produits

SE :
RATION :

nains avant utilisation,

CE 0459



Distribué au Maroc par :
Laboratoires SOTHEMA
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc.
N° Homologation Maroc :
1573/2016/DMP/20/DM
PPC : 147,00 DH

VRZ75210MARA/

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITÉE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

La date de péremption fait référence au produit dans son emballage intact, stocké convenablement.

Ne pas utiliser de flacon endommagé.

DATE DE RÉVISION DES INSTRUCTIONS : 05/2015

N°Homologation Algérie : DMClassellb/CE0459/121/17

N° Homologation Maroc : 1573/2016/DMP/20/DM



N14219C00


5. COMMENT ON NORME REQUISE COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml	Cosmeto est un concentré dans un édulcorant sucré qui peut être dilué dans l'eau pour faire une lotion tonique. Il convient à la peau sensible ou à la peau atopique. Il convient également aux personnes qui ont des peaux très sensibles ou qui ont des peaux très sèches.
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES	Cosmeto est un concentré dans un édulcorant sucré qui peut être dilué dans l'eau pour faire une lotion tonique. Il convient à la peau sensible ou à la peau atopique. Il convient également aux personnes qui ont des peaux très sensibles ou qui ont des peaux très sèches.
7. CONSERVATION DES PRODUITS	Cosmeto est un concentré dans un édulcorant sucré qui peut être dilué dans l'eau pour faire une lotion tonique. Il convient à la peau sensible ou à la peau atopique. Il convient également aux personnes qui ont des peaux très sensibles ou qui ont des peaux très sèches.
8. UTILISATION DES PRODUITS	Cosmeto est un concentré dans un édulcorant sucré qui peut être dilué dans l'eau pour faire une lotion tonique. Il convient à la peau sensible ou à la peau atopique. Il convient également aux personnes qui ont des peaux très sensibles ou qui ont des peaux très sèches.
9. CONSEILS D'EMPLOI	Cosmeto est un concentré dans un édulcorant sucré qui peut être dilué dans l'eau pour faire une lotion tonique. Il convient à la peau sensible ou à la peau atopique. Il convient également aux personnes qui ont des peaux très sensibles ou qui ont des peaux très sèches.
10. CONSEILS D'EMPLOI	Cosmeto est un concentré dans un édulcorant sucré qui peut être dilué dans l'eau pour faire une lotion tonique. Il convient à la peau sensible ou à la peau atopique. Il convient également aux personnes qui ont des peaux très sensibles ou qui ont des peaux très sèches.

Grossesse et allaitement
La grossesse est une période où l'organisme subit de nombreux changements physiologiques. Ces modifications sont nécessaires pour assurer la croissance et le développement du fœtus. La grossesse peut également entraîner des complications telles que l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque ou le diabète gestationnel. Il est donc important de suivre régulièrement les recommandations de son obstétricien et de faire des examens de dépistage appropriés.

N'utilisez pas CQSOPT si vous allez ou avez l'intention d'allaiter. Votre bébé peut absorber le médicament présent dans le lait maternel, ce qui pourrait nuire à sa santé.

grossesse de grossesse ou **de projet de grossesse**

- les médicaments pour traiter la dépression;
- les médicaments pour traiter les douleurs de nos malades avec des modifications dans l'organisme.





مصحة العيون الرباط
Clinique de la Vision de Rabat

PT200921124734



10 novembre 2020

Mr. EL HADDAD MOHAMED

Traitements De L'œil Opéré

83.20

1. **SPECTRUM (CP 500 MG)**

- 1 comprimé 2 fois/jour pendant 5 jours

29.40

2. **CHIBRO-CADRON COLLYRE**

- 1 goutte 4 fois / jour, pendant 5 jours
- 1 goutte 2 fois / jour, pendant 5 jours
- 1 goutte 1 fois / jour, pendant 5 jours

54.40

3. **TOBRADEX POMMADE**

- 1 application 1 fois / jour, le soir, pendant 12 jours

147.-

4. **THEALOSE COLLYRE**

- 1 goutte 4 fois / jour , 3 Mois

31.-

5. **PANSEMENT OCULAIRE**

A changer chaque matin, pendant 5 jours

Prendre le traitement à partir de : demain


contrôle : le 11/11/2020 à 08h30 à la clinique

✓
345.20
PHARMACEUTIQUE AL MOUAHAD
صيادلة المواحد
Dr. MEDARHRI Soumia
Rue El Mahel Ben Toumar Hay
El Mouahidine, Tabriquet - Salé -
Tél : 05 37 67 66 66 (Ligne groupée) - Fax : 05 37 77 72 51





مصحة العيون الرباط
Clinique de la Vision de Rabat



10 novembre 2020

PT200921124734

Chirurgien	Anesthésiste	Aide Opératoire	Aide Anesthésiste	Panseuse
DR EL BAKKALI	DR SBAI	CHKIRINI FATIMA ZAHRA	GHALI KARIM	ismaaili nouhaila
	DR HAOUAS			

COMPTE RENDU OPÉRATOIRE

Date d'intervention : 10/11/2020

PATIENT: Mr. EL HADDAD MOHAMED

Age : 85 ans

Diagnostic : cataracte + pec

Oeil Opéré : gauche

Type d'anesthésie : sédation

Acte : phaco émulsification oeil OG avec mise en place d'un implant intra-oculaire

- ⌚ Badigeonnage à la bétadine.
- ⌚ Mise en place du blépharostat.
- ⌚ Lavage des culs de sac conjonctivaux à la bétadine ophtalmique
- ⌚ Incision cornéenne tunnelisée à 11h au couteau 2.2
- ⌚ Injection du visqueux dans la chambre antérieure.
- ⌚ Capsulo rhéxis à la pince.
- ⌚ Hydro dissection + mobilisation du noyau
- ⌚ Phakoémulsification du noyau
- ⌚ Irrigation-aspiration des masses
- ⌚ Injection de visqueux dans le sac capsulaire
- ⌚ Mise en place d'un implant pliable 22.5 MA60 dioptres, dans le sac capsulaire
- ⌚ Lavage du visqueux.
- ⌚ Injection de 0.1 cc de Céfuroxime en intracaméralaire
- ⌚ Hydrosuture
- ⌚ Traitement local

UV AcrySof IQ Alcon Laboratories, Inc.
MODEL: MA60AC POWER: 22.5 D LENGTH(ØT): 13.0mm OPTIC(ØB): 6.0mm SN: 12682816 055 EXP DATE: 2023-12-31



CVR

مصحة العيون الرباط
Clinique de la Vision de Rabat

Compte rendu de Consultation Pré-anesthésique



Date : 30/10/2020

Nom et Prénom : MOHAMMED MOHAMMED Age : 85 ans

Diagnostic : Cat Opérateur : Dr I.

Date de chirurgie : Côté à opérer OS Hospitalisation ambulatoire acceptée Oui

ANTCD

HTA : / Diabète : / Asthme : / Cardiopathie : / Hépatite : /

NYHA : I II III IV Gastrice Allergie : / Grossesse : /

ATCDchir : / AP opéré à 2 reprises

ATCD Méd.

TRT en cours

EXAMEN : TA : 14/7 Pouls : 60 SpO2 : 97% Conj : /

Ex. CVX : 120 Ex. PP : 120

ODB 3cm. DTM 3cm. Nuque Ronflement : Dentiers: sup inf

Dentition: Dents qui bougent:

BILAN

Hb : CB : Plq : Uréé : Crétat : 11 Clarence :

Hb A1C: Glycémie : 103 TP : TCA : INR :

ECG : RRS

CONCLUSION :

A programmer :

CH : ABT (D) → OK AS & Dib



23/10/2020

PT200921124734

Billet d'admission

Date Entrée	10/11/2020 08:00	Date Sortie	10/11/2020	PEC
Patient :	Mr. EL HADDAD MOHAMED			Etat PEC
Médecin traitant	DR EL BAKKALI			Diff 4 048,00
Médecin corresp.			HTA <input type="checkbox"/>	Diabète <input type="checkbox"/>
Médecin Anesth.			Dialyse <input type="checkbox"/>	Hépatite <input type="checkbox"/>
Diagnostic	phako+iol			
Acte	phako+iol			
Œil à opérer	OG		IOL (Cataracte)	
Anesthésie			Hospitalisation	
Observation				
Date Prochain RDV				

CRO
Consommables et documents particuliers

ACCUEIL 3
AVENUE EL KHAOURI - 1000
TUNISIE - TÉL: 0537 777251
fax: 0537 777251
Centre de la vision de Tunis

VPA

CLINIQUE DE LA VISION**RABAT****Reçu de caisse**

Numéro admission	Nom du patient	Date encaissement
20K100740	EL HADDAD MOHAMED	10/11/2020

Mode paiement	Références du paiement	Montant Dhs
Espèce		4 048,00
Total payé		4 048,00

Reçu établi par : S.F.D.E.



CLINIQUE DE LA VISION DE RABAT
ACCUEIL 3
26 Avenue Ibn Khaldoun - 10000 - Rabat
Tél: 05 37 67 46 63 - Fax: 05 37 77 72 51



Cer.

مصحة العيون الرباط
Clinique de la Vision de Rabat

30/10/2020

DR. SBAI YASSIR
Anesthésie - Réanimation
Clinique de la Vision de Rabat
Tel.: 05 37 67 66 66

Dr. HAMDAH Mohammed
Consultation pour analyse :
- glycémie
- créatinine

CENTRE DE BIOLOGIE
UNIBIO
3, Av Annabaa RDC - Hassan - Rabat
Patiente : 25135047 IF : 26746179
NCE : 001789594000057

Dr. SBAI YASSIR
Anesthésie - Réanimation
Clinique de la Vision de Rabat
Tel.: 05 37 67 66 66

Note Honoraires: 301020 027

RABAT le : 30/10/2020
Nom et Prénom ... : Monsieur Mohammed EL HADDAD
Prescripteur : Dr. SBAI YASSIR
Correspondant.... : CLINIQUE DE LA VISION DE RABAT

Bilan :

SEC Dh 0,00+ GLY B30+ CREA B30+

Montant..... : 98,00 Dhs soit B 60

Arrêtée la présente facture à la somme de:
Quatre-vingt dix huit Dirhams et zéro centime

Dr Saif El Islam SLIMANI

CENTRE DE BIOLOGIE
unibio
3, Av Annaba RDC - Hassan - Rabat
Patente : 25135047 IF : 20746179
ICE : 001789594000057



www.unibio.ma

3, Avenue Annaba RDC, Hassan, Rabat. CP : 10010 / GSM : +212 6 61 94 51 24
Tél : +212 5 37 76 64 64/65 - Fax : +212 5 37 76 64 60 - Mail : contact@unibio.ma - slimanilab@gmail.com
Patente N° 25135047 - IF : 20746170 - R.C : 125791 - CNSS : 2132736 - ICE : 001789594000057



Code Patient : 67964
Prélèvement reçu le : 30/10/20 16h20
Référence : 301020 027
Dossier édité le : 30/10/2020



3010027

Mr. EL HADDAD Mohammed

Dr. SBAI YASSIR

CLINIQUE DE LA VISION DE RABAT

Ref CLINIQUE : 20J301234 Chambre :

Page:1 /1

BIOCHIMIE

ARCHITECT 4100 à 37°C

Valeurs de référence Antécédents

GLYCEMIE A JEUN : 1,03 g/l (0,70- 1,10)
Soit : 5,72 mmol/l (3,88-6,12)

CREATININE : 11 mg/l (7,0- 13,0)
Soit.....: 96,80 µmol/l (44-106)

Dr. Saif El Islam SLIMANI
Pharmacien Biogiste

24h/24

URGENCES

7j/7

www.unibio.ma

3, Avenue Annaba RDC, Hassan, Rabat. CP : 10010 / GSM : +212 6 61 94 51 24
Tél : +212 5 37 76 64 64/65 - Fax : +212 5 37 76 64 60 - Mail : contact@unibio.ma - slimanilab@gmail.com
Patente N° 25135047 - IF : 20746170 - R.C : 125791 - CNSS : 2132736 - ICE : 001789594000057

