

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Consignes générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.  
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.  
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.  
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires; prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.  
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : [contact@mupras.com](mailto:contact@mupras.com)
- Prise en charge : [pec@mupras.com](mailto:pec@mupras.com)
- Adhésion et changement de statut : [adhesion@mupras.com](mailto:adhesion@mupras.com)

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge  
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

N°: 49717

## Déclaration de Maladie : N° P19-0003938

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e) **HOUSSI ABDALLAH**

Matricule : **971** Société : **ROYAL AIR MAROC**

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre : **11/11/11**

Nom & Prénom : **HOUSSI ABDALLAH** Date de naissance : **1942**

Adresse : **MONTE BLANC ESC 1012 DA Hay Mohand**

Tél. : **837874** Total des frais engagés : **11** Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

**Dr. REDA HALLAOUI**  
MEDECIN SPECIALISTE  
CHIRURGIEN UROLOGUE  
ANDROLOGUE  
76, Bd. Grande Ceinture  
Hay Mouzammag Casablanca  
Tél: 0522 64 11 52

Date de consultation : **12/11/2020**

Nom et prénom du malade : **HOUSSI ABDALLAH** Age : **1942**

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : **UROLOGIQUE**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **CASABLANCA** Le : **12/11/2020**

Signature de l'adhérent(e) : **[Signature]**



# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12/11/20	Consult	3	300,00	
27/11/20	Chirurgie		81,00	

# EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	12/11/20	310,00
	27/11/20	386,40

# ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

# AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient		
				COEFFICIENT DES TRAVAUX	
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 21433552 00000000 00000000 D G 00000000 00000000 35533411 11433553 B [Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			COEFFICIENT DES TRAVAUX	
				MONTANTS DES SOINS	
				DATE DU DEVIS	
				DATE DE L'EXECUTION	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

الدكتور رضا الحلاوي  
Docteur Réda HALLAOUI

طبيب أخصائي

في أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية  
الفحص والجراحة عبر المنظار، تفتيت الحصى، السيلان البولي  
جراحة البروستاتا و الجهاز التناسلي للرجل  
الاضطرابات الجنسية و العقم عند الرجل  
الختانة - الفحص بالصدى

Chirurgien Urologue • Andrologue

(Maladies et Chirurgie de l'Appareil Urinaire (reins, Vessie  
Incontinence Urinaire, Lithotripsie Extracorporelle

Maladies et Chirurgie de la Prostate

Chirurgie Génitale, Stérilité Masculine & Impuissance Sexuelle

Circoncision - Sexologie - Échographie

Laparoscopique & Endoscopique

Casablanca, le :

12/11/2020

Moussi Abdallah

130, 90

19/11/2020

137874

1/

Tu - Zou



Dr. REDA HALLAOUI  
MEDECIN SPECIALISTE  
CHIRURGIEN UROLOGUE  
ANDROLOGUE

89, Bd. Grande Ceinture  
Hay Mohammadi - Casablanca  
Fixe: 0522 62 51 52  
URGENCE: 06 61 09 17 07

Boyer b - tur  
(1 mo. 8)



4 - deir - 11

10 x 38

310100

PHARMACIE EL HOURIA  
149, Avenue El Houria  
Hay El Mohammadi - Casablanca

Dr. REDA HALLAOUI  
MEDECIN SPECIALISTE  
CHIRURGIEN UROLOGUE  
ANDROLOGUE  
76, Bd. Grande Ceinture  
Hay Mohammadi - Casablanca  
Fixe: 0522 62 51 52  
URGENCE: 06 61 09 17 07

Tél.: 05 22 62 51 52 - URG: 06 61 09 17 07  
E-mail: dr.hallaoui@gmail.com



الدكتور رضا الحلاوي

Docteur Réda HALLAOUI

طبيب أخصائي

في أمراض وجراحة الكلي والمسالك البولية  
الفحص والجراحة عبر المنظار، تفتيت الحصى، السيلان البولي  
جراحة البروستاتا و الجهاز التناسلي للرجل  
الاضطرابات الجنسية و العقم عند الرجل  
الختانة - الفحص بالصدى

Chirurgien Urologue - Andrologue

(Maladies et Chirurgie de l'Appareil Urinaire (reins, Vessie

Incontinence Urinaire, Lithotripsie Extracorporelle

Maladies et Chirurgie de la Prostate

Chirurgie Génitale, Stérilité Masculine & Impuissance Sexuelle

Circoncision - Sexologie - Echographie

Laparoscopie & Endoscopique

27/11/2020  
Casablanca, le : .....

Monsi Abdallah

9880 x3

Néofortau



1 - 381 (10-)

4500 x2  
PHARMACIE EL HOUR  
149 Avenue F  
Boulevard Hassan II  
Casablanca



386,40  
DR. REDA HALLAOUI  
MEDICIN SPECIALISTE  
UROLOGUE ANDROLOGUE  
26, Bd. Grande Ceinture  
Hay Mohammadi - Casablanca  
Tél : 05 22 62 51 52 - 06 61 09 17 07

76, Bd. Grande Ceinture, Résidence Al Khair (à côté Kissariat Aziza) Hay Mohammadi - Casablanca

Tél. : 05 22 62 51 52 - URG : 06 61 09 17 07

E-mail : dr.hallaoui@gmail.com

130/20  
F 1300DH20  
PER 06/22  
LOT 01914



Contenance : 20,00 mg  
Paroxétine base : la substance active est sous forme de chlorhydrate de paroxétine anhydre pour un comprimé pelliculé sécable.  
Les autres composants sont : mannitol, cellulose microcristalline (type A), silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, hypromellose, talc, dioxyde de titane.  
Excipient à effet notoire : mannitol.

1. QU'EST CE QUE TRE-ZEN® 20 mg, comprimé pelliculé ?

**CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :** Antidépresseur.  
Ce médicament se présente sous forme de comprimés.  
Existe en boîte de 15 et de 30 comprimés.

Ce médicament est indiqué dans le traitement :

- Des épisodes dépressifs majeurs, c'est-à-dire caractérisés par une humeur dépressive persistante.
- De la prévention des attaques de panique avec ou sans agoraphobie.
- Des troubles obsessionnels compulsifs.
- Du trouble de l'anxiété sociale caractérisé par des phobies sociales, des troubles professionnels ou sociaux.
- Du stress post-traumatique.
- De l'anxiété généralisée, évoluant depuis au moins 6 mois.

2. INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE TRE-ZEN®

**Contre-indications :**

- Ne pas prendre TRE-ZEN® comprimé pelliculé sécable si vous êtes allergique à la paroxétine ou à l'un des excipients.
- Enfants de moins de 15 ans.
- Association avec certains médicaments antidépresseurs (moclobémide, toloxatone).

Toutefois, si votre médecin juge indispensable de vous prescrire TRE-ZEN®, vous devrez surveiller votre état pendant quelques jours.

- En cas d'allaitement sans avis contraire de votre médecin.
- **Prendre des précautions particulières avec TRE-ZEN®**

**Mises en garde :**

Comme avec tous les antidépresseurs, l'action de TRE-ZEN® se fait progressivement. Il est donc important de poursuivre le traitement pendant plusieurs jours.

Dans certains cas, une accentuation de l'anxiété ou de l'agoraphobie peut survenir.

L'absorption d'alcool ou de boissons alcoolisées pendant le traitement peut aggraver les effets indésirables de la paroxétine.

La prise concomitante de millepertuis nécessite une surveillance particulière.

Le trouble anxieux social (phobies sociales) n'est pas un trouble dépressif. Il est caractérisé notamment par l'évitement ou la peur de situations sociales ou professionnelles entraînant une souffrance.

**Précautions d'emploi :**

Prévenez votre médecin en cas de :

- Insomnie ou nervosité en début de traitement.
- Insuffisance rénale ou insuffisance hépatique grave.
- Epilepsie ou antécédent d'épilepsie, la survenue d'épilepsie.
- Glaucome.
- Antécédent d'anomalies de la coagulation ou traitement par anticoagulant, certains antiplaquettaires.

**Grossesse :**

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin.

**Allaitement :**

Le traitement par la paroxétine est déconseillé pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Autres informations :**

Le traitement par la paroxétine est déconseillé pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Autres informations :**

Le traitement par la paroxétine est déconseillé pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Autres informations :**

Le traitement par la paroxétine est déconseillé pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Autres informations :**

Le traitement par la paroxétine est déconseillé pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Autres informations :**

Le traitement par la paroxétine est déconseillé pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Autres informations :**

Le traitement par la paroxétine est déconseillé pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Autres informations :**

Le traitement par la paroxétine est déconseillé pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Autres informations :**

Le traitement par la paroxétine est déconseillé pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Autres informations :**

Le traitement par la paroxétine est déconseillé pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Autres informations :**

Le traitement par la paroxétine est déconseillé pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Autres informations :**

Le traitement par la paroxétine est déconseillé pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Autres informations :**

Le traitement par la paroxétine est déconseillé pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Autres informations :**

Le traitement par la paroxétine est déconseillé pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Autres informations :**

# VEIN UP®

## Composition :

Vigne rouge feuille.....	200 mg
Hamamélis Feuille.....	60 mg
ES ginkgo bio 1/1%.....	60 mg
Stéarate de magnésium végétal.....	4 mg
Gélule végétale taille 1.....	78 mg
Poids net total/gélule.....	402 mg

## Propriétés

L'association Vigne rouge, Hamamélis, ginkgo a une action optimale sur les manifestations d'insuffisance veineuse à savoir la crise hémorroïdaire et les jambes lourdes.

- **Vigne rouge** aurait un effet protecteur sur les veines et les petits vaisseaux sanguins ainsi qu'une capacité à réduire les œdèmes (gonflements).
- **Hamamélis** serait vasculoprotecteur.
- **Ginkgo** fluidifierait le sang et protégerait la paroi des vaisseaux sanguins en augmentant leurs diamètres.

## Précaution d'emploi

- VEIN UP est déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement
- Ne pas associer à un traitement d'anti-coagulant
- A partir de 18 ans

## Conseils d'utilisation :

VEIN Up est indiqué dans les manifestations d'insuffisance veineuse à savoir la crise hémorroïdaire et les jambes lourdes à raison

**à base de plantes naturelles**

VEIN UP

LOT : 153122A

DLUO : 03/2023

PPC : 89.90 DH

PHARMA CONNECT

# VEIN UP®

## Composition :

Vigne rouge feuille.....	200 mg
Hamamélis Feuille.....	60 mg
ES ginkgo bio 1/1%.....	60 mg
Stéarate de magnésium végétal.....	4 mg
Gélule végétale taille 1.....	78 mg
Poids net total/gélule.....	402 mg

## Propriétés

L'association Vigne rouge, Hamamélis, ginkgo a une action optimale sur les manifestations d'insuffisance veineuse à savoir la crise hémorroïdaire et les jambes lourdes.

- **Vigne rouge** aurait un effet protecteur sur les veines et les petits vaisseaux sanguins ainsi qu'une capacité à réduire les œdèmes (gonflements).
- **Hamamélis** serait vasculoprotecteur.
- **Ginkgo** fluidifierait le sang et protégerait la paroi des vaisseaux sanguins en augmentant leurs diamètres.

## Précaution d'emploi

- VEIN UP est déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement
- Ne pas associer à un traitement d'anti-coagulant
- A partir de 18 ans

## Conseils d'utilisation :

VEIN Up est indiqué dans les manifestations d'insuffisance veineuse à savoir la crise hémorroïdaire et les jambes lourdes à raison

**à base de plantes naturelles**

VEIN UP

LOT : 153122A

DLUO : 03/2023

PPC : 89.90 DH

PHARMA CONNECT

Exclusivité



PHARMA CONNECT

# NEOFORTAN®

(phloroglucinol dihydraté)

## FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRESENTATION

- Comprimés effervescents dosés à 80 mg
- Comprimés effervescents dosés à 160 mg
- Suppositoires dosés à 150 mg

## COMPOSITION QUALITATIVE

- **Comprimé effervescent à 80 mg**

Phloroglucinol dihydraté .....

- **Comprimé effervescent à 160 mg**

Phloroglucinol dihydraté .....

**Excipient :** acide citrique, bicarbonate de sodium  
sodium qsp 1 comprimé effervescent

- **Suppositoire à 150 mg**

Phloroglucinol dihydraté .....

**Excipient :** triméthyl phloroglucinol, silice colloïdale,  
thétiques qsp 1 suppositoire .

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antispasmodique musculotrope.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

NEOFORTAN® est préconisé dans :

- Le traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires (dyskinésie biliaire, colite spasmodique), colique hépatique
- Le traitement des manifestations spasmodiques et douloureuses aiguës des voies urinaires : coliques néphrétiques
- Le traitement symptomatique des manifestations spasmodiques douloureuses en gynécologie (dysménorrhée)
- Le traitement adjuvant des contractions au cours de la grossesse en association au repos

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

ce médicament ne doit pas être utilisé dans le cas suivant :

- Hypersensibilité au phloroglucinol.

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPECIALES

L'association de phloroglucinol avec les antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en raison de leur effet spasmogène.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, ET NOTAMMENT les antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

### Grossesse

Les études réalisées chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène du phloroglucinol. En l'absence d'effet tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu.

En clinique, l'utilisation relativement répandue du phloroglucinol n'a apparemment révélé aucun risque malformatif à ce jour.

Toutefois, l'utilisation du phloroglucinol ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

NEOFORTAN® 160 mg

PPV 98DH80  
EXP 07/2023  
LOT 06063 1



# NEOFORTAN®

(phloroglucinol dihydraté)

## FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRESENTATION

- Comprimés effervescents dosés à 80 mg
- Comprimés effervescents dosés à 160 mg
- Suppositoires dosés à 150 mg

## COMPOSITION QUALITATIVE

- **Comprimé effervescent à 80 mg**

Phloroglucinol dihydraté .....

- **Comprimé effervescent à 160 mg**

Phloroglucinol dihydraté .....

**Excipient :** acide citrique, bicarbonate de sodium  
sodium qsp 1 comprimé effervescent

- **Suppositoire à 150 mg**

Phloroglucinol dihydraté .....

**Excipient :** triméthyl phloroglucinol, silice colloïdale,  
thétiques qsp 1 suppositoire .

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antispasmodique musculotrope.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

NEOFORTAN® est préconisé dans :

- Le traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires (dyskinésie biliaire, colite spasmodique), colique hépatique
- Le traitement des manifestations spasmodiques et douloureuses aiguës des voies urinaires : coliques néphrétiques
- Le traitement symptomatique des manifestations spasmodiques douloureuses en gynécologie (dysménorrhée)
- Le traitement adjuvant des contractions au cours de la grossesse en association au repos

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

ce médicament ne doit pas être utilisé dans le cas suivant :

- Hypersensibilité au phloroglucinol.

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPECIALES

L'association de phloroglucinol avec les antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en raison de leur effet spasmogène.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, ET NOTAMMENT les antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

### Grossesse

Les études réalisées chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène du phloroglucinol. En l'absence d'effet tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu.

En clinique, l'utilisation relativement répandue du phloroglucinol n'a apparemment révélé aucun risque malformatif à ce jour.

Toutefois, l'utilisation du phloroglucinol ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

NEOFORTAN® 160 mg

PPV 98DH80  
EXP 07/2023  
LOT 06063 1

# NEOFORTAN®

(phloroglucinol dihydraté)

## FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRESENTATION

- Comprimés effervescents dosés à 80 mg
- Comprimés effervescents dosés à 160 mg
- Suppositoires dosés à 150 mg

## COMPOSITION QUALITATIVE

- **Comprimé effervescent à 80 mg**

Phloroglucinol dihydraté .....

- **Comprimé effervescent à 160 mg**

Phloroglucinol dihydraté .....

**Excipient :** acide citrique, bicarbonate de sodium  
sodium qsp 1 comprimé effervescent

- **Suppositoire à 150 mg**

Phloroglucinol dihydraté .....

**Excipient :** triméthyl phloroglucinol, silice colloïdale,  
thétiques qsp 1 suppositoire .

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antispasmodique musculotrope.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

NEOFORTAN® est préconisé dans :

- Le traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires (dyskinésie biliaire, colite spasmodique), colique hépatique
- Le traitement des manifestations spasmodiques et douloureuses aiguës des voies urinaires : coliques néphrétiques
- Le traitement symptomatique des manifestations spasmodiques douloureuses en gynécologie (dysménorrhée)
- Le traitement adjuvant des contractions au cours de la grossesse en association au repos

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

ce médicament ne doit pas être utilisé dans le cas suivant :

- Hypersensibilité au phloroglucinol.

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPECIALES

L'association de phloroglucinol avec les antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en raison de leur effet spasmogène.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, ET NOTAMMENT les antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

### Grossesse

Les études réalisées chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène du phloroglucinol. En l'absence d'effet tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu.

En clinique, l'utilisation relativement répandue du phloroglucinol n'a apparemment révélé aucun risque malformatif à ce jour.

Toutefois, l'utilisation du phloroglucinol ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

NEOFORTAN® 160 mg

PPV 98DH80  
EXP 07/2023  
LOT 06063 1

# No-Spa® Forte 80mg

Chlorhydrate de drotavérine

Comprimé

SANOFI

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours.

## 1. QU'EST-CE QUE NO-SPA FORTE COMPRIME ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

No-Spa forte comprimé est un antispasmodique. Il est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

- Spasmes des muscles lisses dans des affections des voies biliaires : calcul biliaire, inflammation de la vésicule biliaire ou des voies biliaires.
- Spasmes des muscles lisses des voies urinaires : calcul urinaire (rein, urètre), inflammation du bassin, inflammation de la vessie, spasme de la vessie.
- Traitement d'appoint des troubles suivants :
  - Spasmes des muscles lisses du système digestif : ulcère gastro-duodénal, inflammation de la muqueuse gastrique, spasme du cardia et du pylore, inflammation de l'intestin grêle et du côlon, constipation spasmodique et météorisme lié au syndrome du côlon irritable (anomalie du fonctionnement du tube digestif).
  - Certains maux de tête (céphalées de tension).
  - Affections gynécologiques : règles douloureuses ou crampes menstruelles.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE NO-SPA FORTE COMPRIME ?

**Ne prenez jamais No-Spa forte comprimé :**

- si vous êtes allergique à la drotavérine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique informations supplémentaires),
- si vous souffrez d'insuffisance hépatique sévère,
- chez l'enfant âgé de moins de 12 ans

### Faites attention avec No-Spa forte

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien pour prendre No-Spa forte comprimé.

Ce médicament doit être utilisé avec précaution chez les personnes présentant une tension artérielle basse.

### Utilisation d'autres médicaments

Informez votre médecin ou pharmacien si vous avez récemment pris ou pourriez prendre d'autres médicaments. L'administration concomitante de la lévodopa diminue l'effet antiparkinsonien. Ce médicament peut aggraver les phénomènes de rigidité et les tremblements.

### Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

**Grossesse :** Les études menées chez l'animal et chez l'homme n'ont montré aucun effet toxique vis-à-vis du fœtus ou de la mère en cas d'utilisation pendant la grossesse. Cependant, ce médicament doit être prescrit avec précaution et nécessite un avis médical chez la femme enceinte.

**Allaitement :** En l'absence de données cliniques suffisantes, l'utilisation de ce médicament est déconseillée durant l'allaitement.

**Fertilité :** Aucune donnée n'est disponible concernant les effets sur la fertilité.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'administration de No-Spa forte comprimé à la posologie habituelle n'a pas d'effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Cependant, en cas d'apparition de vertiges suivant une prise de No-Spa forte comprimé, les activités dangereuses, ainsi que la conduite de véhicules et l'utilisation de machines, sont à éviter.

### Informations importantes concernant certains composants de No-Spa forte comprimé

Si votre médecin vous a prévenu que vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

### 3. COMMENT PRENDRE NO-SPA FORTE COMPRIME ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant

NO-SPA FORTE 80MG  
CP 820

P.P.V. : 45D400

LOT : 20E005  
PER.: 04 2023



6 118000 061816



# No-Spa® Forte 80mg

Chlorhydrate de drotavérine

Comprimé

SANOFI

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours.

## 1. QU'EST-CE QUE NO-SPA FORTE COMPRIME ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

No-Spa forte comprimé est un antispasmodique. Il est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

- Spasmes des muscles lisses dans des affections des voies biliaires : calcul biliaire, inflammation de la vésicule biliaire ou des voies biliaires.
- Spasmes des muscles lisses des voies urinaires : calcul urinaire (rein, urètre), inflammation du bassin, inflammation de la vessie, spasme de la vessie.
- Traitement d'appoint des troubles suivants :
  - Spasmes des muscles lisses du système digestif : ulcère gastro-duodénal, inflammation de la muqueuse gastrique, spasme du cardia et du pyllore, inflammation de l'intestin grêle et du côlon, constipation spasmodique et météorisme lié au syndrome du côlon irritable (anomalie du fonctionnement du tube digestif).
  - Certains maux de tête (céphalées de tension).
  - Affections gynécologiques : règles douloureuses ou crampes menstruelles.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE NO-SPA FORTE COMPRIMÉ ?

**Ne prenez jamais No-Spa forte comprimé :**

- si vous êtes allergique à la drotavérine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament ;
- la rubrique informations suppl
- si vous souffrez d'insuffisance h
- sévère,
- chez l'enfant âgé de moins de 12

## Faites attention avec No-Spa forte

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien pour prendre No-Spa forte comprimé.

Ce médicament doit être utilisé avec précaution chez les personnes présentant une tension artérielle basse.

## Utilisation d'autres médicaments

Informez votre médecin ou votre pharmacien de tous les médicaments que vous prenez, y compris ceux que vous avez récemment pris ou pourriez prendre.

L'administration concomitante de la drotavérine et de la lévodopa diminue l'effet antiparkinsonien de cette dernière, ce qui peut aggraver les phénomènes de rigidité et les tremblements.

## Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

**Grossesse :** Les études menées chez l'animal et chez l'homme n'ont montré aucun effet toxique vis-à-vis du fœtus ou de la mère en cas d'utilisation pendant la grossesse. Cependant, ce médicament doit être prescrit avec précaution et nécessite un avis médical chez la femme enceinte.

**Allaitement :** En l'absence de données cliniques suffisantes, l'utilisation de ce médicament est déconseillée durant l'allaitement.

**Fertilité :** Aucune donnée n'est disponible concernant les effets sur la fertilité.

## Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'administration de No-Spa forte comprimé à la posologie habituelle n'a pas d'effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Cependant, en cas d'apparition de vertiges suivant une prise de No-Spa forte comprimé, les activités dangereuses, ainsi que la conduite de véhicules et l'utilisation de machines, sont à éviter.

## Informations importantes concernant certains composants de No-Spa forte comprimé

Si votre médecin vous a prévenu que vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

## 3. COMMENT PRENDRE NO-SPA FORTE COMPRIMÉ ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant

