

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

tique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

29792

Déclaration de Maladie : N° P19-0016436

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 0022858 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : MOUSTAID, LAïLA Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 05 22 77 00 09 Toutes les franchises engagées Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : DR BENYACHOU 2020

Date de consultation : 02/02/2020

Nom et prénom du malade : MOUSTAID, LAïLA Age :

Lien de parenté : Fille Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Depression

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 02/02/2020 Le : 02/02/2020

Signature de l'adhérent(e) : MOUSTAID

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02/10/20	C	C	300.00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Docteur Benyachou	Montant de la Facture
	01/11/2020	Facebook Docteur Benyachou Instagram Docteur Benyachou Youtube Docteur Benyachou	206.20
	01/11/2020		164,40

ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
MONTANTS DES SOINS				MONTANTS DES SOINS
DEBUT D'EXECUTION				
FIN D'EXECUTION				
DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE	H	25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553	DATE DU DEVIS
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	D	00000000	00000000	
	G	00000000	00000000	
	B	35533411	11433553	
(Création, remont, adjonction)	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Mouhcine BENYACHOU

Psychiatre – Sexologue

Diplôme et Spécialisé dans les troubles du sommeil

Electro-encéphalographie

Alcoolisme et Toxicomanie

Ancien médecin chef et consultant à Riyad

Faculté de médecine de Grenoble-France

Expert assermenté auprès des tribunaux



د. بنيشو محسن

اختصاصي في الطب النفسي والعقلي للكبار والأطفال
Diplomé en psychiatrie et sexologie

Diplomé en psychopathologie du sommeil et en électro-encéphalographie
Diplomé en psychopathologie du sommeil et en électro-encéphalographie

الإمام على الكحول والمخدرات

رئيس الطب النفسي وطبيب استشاري سابق بالرياض

خريج كلية الطب بكرنيل - فرنسا

خبرير محلف لدى المحاكم

Casablanca le,

02/10/2020

الدار البيضاء في

83,70 x21

Devoxat 20

1

(2 mois)

N.S.

E 134415632

83,40 x21
= 167,40 24124

7134419638

Loua
Gretter

18,40 x21

mauve

0

(Bellaïs)

N.S.

Si Seim

26,20

د. بنيشو محسن

اختصاصي في الطب النفسي والجنسي
المخدرات اضطرابات النوم

مرض السمنة والعلاج السلوكي والمعرفي

Facebook Docteur Benyachou
Instagram Docteur Benyachou
Youtube Docteur Benyachou

Tél. 05 22 26 90 52

05 40 07 52 45 - 05 22 26 90 52 - الهاتف : 23 شارع الأمير مولاي عبد الله شقة 5 الدور الثاني الدار البيضاء - الهاتف :

23, Bd Prince Moulay Abdellah, Appt5, 2ème étage - Casablanca - tél: 0522 26 90 52 - 0540 075 245

email: docturbenyachou@yahoo.com - docturbenyachou@hotmail.com - Site Web : www.psysexo.com - Youtube : psysexo1

Tranxène® 5 mg

Tranxène® 10 mg

Clorazépate dipotassique

Gélule

SANOFI

1. QU'EST-CE QUE TRANXENE, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANXIOLYTIQUES

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE

AVANT DE PRENDRE TRANXENE, gélule ?

Ne prenez jamais TRANXENE, gélule dans les cas suivants :

- allergie connue à ce principe actif ou à l'un des composants du médicament,
- insuffisance respiratoire grave,
- syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil),
- insuffisance hépatique grave,
- myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire)

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec TRANXENE, gélule :

Mises en garde spéciales

Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose.

Risque de DÉPENDANCE : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance :
• durée du traitement, • dose, • antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique. La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts

physiques, etc...

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin.

La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé.

Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes (anxiété) qui avaient justifié la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations des fonctions psychomotrices sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions contraires à l'effet recherché : insomnie, cauchemars, agitation, nervosité, euphorie ou irritabilité, tension, modifications de la conscience, voire des comportements potentiellement dangereux (agressivité envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles du comportement et des actes automatiques).

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, contactez le plus rapidement possible votre médecin.

Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être utilisés avec prudence chez le sujet âgé, en raison du risque de somnolence et/ou de relâchement musculaire qui peuvent favoriser les chutes graves dans cette population.

Précautions d'emploi : Ce médicament peut à lui seul résoudre les convainc de demander conseil pour indiquer les conduites pour l'anxiété.

La prise de ce médicament renforcé notamment en cas de dépression chronique du foie, d'alcool. Ce médicament ne traite pas la dépression, il laisserait la dépression évoluer avec persistance ou majoration. La prise d'alcool est formellement interdite durant le traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INCONSEILLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autre médicament ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance médicale ou à votre pharmacien.



18/14



Tranxène® 5 mg Tranxène® 10 mg

Clorazépate dipotassique

Gélule

SANOFI

1. QU'EST-CE QUE TRANXENE, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANXIOLYTIQUES

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE

AVANT DE PRENDRE TRANXENE® , gélule ?

Ne prenez jamais TRANXENE, gélule dans les cas suivants :

- allergie connue à ce principe actif ou à l'un des composants du médicament,
 - insuffisance respiratoire grave,
 - syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil),
 - insuffisance hépatique grave,
 - myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire)

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER
L'AVIS DE VOTRE

Faites attention

Mises en garde

Si une perte d'efficacité du médicament, le risque de DEPENDANCE, surtout en cas d'addiction physique.

- avoriser la survie
• durée du traitement
dépendances médicales

Pour plus d'info

Votre pharmacie

l'apparition d'un p
quelques jours, de s
promps, doulou

également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts.

A standard linear barcode is located at the bottom right of the page.

A standard linear barcode is located at the bottom right of the page, consisting of vertical black bars of varying widths on a white background.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, contactez immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital.

Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, en lui expliquant que vous vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette notice. Vous vous signaler s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète dans votre comportement.

Effets indésirables importants observés avec DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable

Des patients traités par DEROXAT développent une réaction appelée akathisie, qui sentent agité et de ne pas pouvoir rester assis ou debout tranquillement. D'autre part, syndrome sérotoninergique ou syndrome malin des neuroleptiques, com totalité des symptômes suivants : sensation de grande agitation ou d'irritabilité, sensations d'agitation, sensation de chaleur, transpiration, tremblement, frissons, hallucinations (étranges), rigidité des muscles, contractions involontaires des muscles ou rythme sévérité de ces symptômes peut s'aggraver conduisant à une perte de connaissance. de ces symptômes, contactez votre médecin. Pour plus d'information sur les effets indésirables de DEROXAT lire ci-dessous la rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ? ».

Autres médicaments et DEROXAT 20mg, comprimé pelliculé sécable
Certains médicaments peuvent modifier l'action de DEROXAT, et augmenter le risque d'effets secondaires,

GlaxoSmithKline Maroc
Aïn El Aouda
Région de Rabat
PPV: 83,70
118001140237
0945125



Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, contactez immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital.

Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, en lui expliquant que vous vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette notice. Vous vous signaler s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète dans votre comportement.

Effets indésirables importants observés avec DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable

Des patients traités par DEROXAT développent une réaction appelée akathisie, qui sentent agité et de ne pas pouvoir rester assis ou debout tranquillement. D'autre part, syndrome sérotoninergique ou syndrome malin des neuroleptiques, com totalité des symptômes suivants : sensation de grande agitation ou d'irritabilité, sensations d'agitation, sensation de chaleur, transpiration, tremblement, frissons, hallucinations (étranges), rigidité des muscles, contractions involontaires des muscles ou rythme sévérité de ces symptômes peut s'aggraver conduisant à une perte de connaissance. de ces symptômes, contactez votre médecin. Pour plus d'information sur les effets indésirables de DEROXAT lire ci-dessous la rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ? ».

Autres médicaments et DEROXAT 20mg, comprimé pelliculé sécable
Certains médicaments peuvent modifier l'action de DEROXAT, et augmenter le risque d'effets secondaires,

GlaxoSmithKline Maroc
Aïn El Aouda
Région de Rabat
PPV: 83,70
118001140237
0945125



Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, contactez immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital.

Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, en lui expliquant que vous vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette notice. Vous vous signaler s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète dans votre comportement.

Effets indésirables importants observés avec DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable

Des patients traités par DEROXAT développent une réaction appelée akathisie, qui sentent agité et de ne pas pouvoir rester assis ou debout tranquillement. D'autre part, syndrome sérotoninergique ou syndrome malin des neuroleptiques, com totalité des symptômes suivants : sensation de grande agitation ou d'irritabilité, sensations d'agitation, sensation de chaleur, transpiration, tremblement, frissons, hallucinations (étranges), rigidité des muscles, contractions involontaires des muscles ou rythme sévérité de ces symptômes peut s'aggraver conduisant à une perte de connaissance. de ces symptômes, contactez votre médecin. Pour plus d'information sur les effets indésirables de DEROXAT lire ci-dessous la rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ? ».

Autres médicaments et DEROXAT 20mg, comprimé pelliculé sécable
Certains médicaments peuvent modifier l'action de DEROXAT, et augmenter le risque d'effets secondaires,

GlaxoSmithKline Maroc
Aïn El Aouda
Région de Rabat
PPV: 83,70
118001140237
0945125



Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, contactez immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital.

Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, en lui expliquant que vous vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette notice. Vous vous signaler s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète dans votre comportement.

Effets indésirables importants observés avec DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable

Des patients traités par DEROXAT développent une réaction appelée akathisie, qui sentent agité et de ne pas pouvoir rester assis ou debout tranquillement. D'autre part, syndrome sérotoninergique ou syndrome malin des neuroleptiques, com totalité des symptômes suivants : sensation de grande agitation ou d'irritabilité, sensations d'agitation, sensation de chaleur, transpiration, tremblement, frissons, hallucinations (étranges), rigidité des muscles, contractions involontaires des muscles ou rythme sévérité de ces symptômes peut s'aggraver conduisant à une perte de connaissance. de ces symptômes, contactez votre médecin. Pour plus d'information sur les effets indésirables de DEROXAT lire ci-dessous la rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ? ».

Autres médicaments et DEROXAT 20mg, comprimé pelliculé sécable
Certains médicaments peuvent modifier l'action de DEROXAT, et augmenter le risque d'effets secondaires,

GlaxoSmithKline Maroc
Aïn El Aouda
Région de Rabat
PPV: 83,70
118001140237
0945125

