

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Cessions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Nº P19- 059581

(50037)

Autres

Maladie

Dentaire

Optique

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 571 Société :

Actif Pensionné(e) Autre : RETRAITÉ

Nom & Prénom : WARID BOUZZA

Date de naissance : 1945

Adresse : AIN CHIFA I RUE 1 n° 80 CASA

Tél. : 06 95 37 26 53 Total des frais engagés : 328 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 11 / 11 / 2020

Nom et prénom du malade : WARID Aïcha Age: 60 ANS

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : End fèvle Bronchite, D.N.F, dysphénie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 11/11/20

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
11/06/2010	Acte de soins	1	130 DH	
11/06/2010	Acte de soins	1	130 DH	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE NOUVELLE MEDINA صيدلية المدينة الجديدة Tel 0522 80 44 61 0522 28 12 95	٢٠٢٠/١١/٢٠٢٠	٩٨.٧٥

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D —————— G 00000000 00000000 35533411 11433553 B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. EL Moustapha MAACHOU

Spécialiste en Médecine du Travail

Médecine Générale

- Echographie
 - E.C.G
 - Ancien Médecin de la Polyclinique des Electriciens

الدكتور المصطفى معاشو

إختصاصي في طب الشغل

الطب العام

فحص بالصدى

-تخطيط القلب الکهربائی

- طبيب سابق بمصحة الكهربائيين

ORDONNANCE

Casablanca, le : 11.11.2020

→ ← wahrer Archiv

91.00 - EFLOXIN 6.00g
NEW EXP 1/21

38.8° Nuclear Address

15.3° = Victoria 8-14

more S. Ag SS
14% at extreme

4960

D - C1
~~Dr MAAKOU EL MOUSTAPHA
MEDICAL DOCTOR
Electician
Baladia, Rue Cadet EL IRANI
#/Fax: 04 42 61 00 00~~

طبب سابق بمصحة الكهربائيين

طبيب سابق بمصحة الكهريائيين

درب البلدية زنقة القاضي العراقي 12 مكرر الهاتف والفاكس : 05 22 82 98 60

Quartier Baladia, Rue CADI EL IRAKI, 12 Bis - Tél.&Fax : 05 22 82 98 60

Notice :
Information de l'utilisateur
D-CURE FORTE 100.000 U.I.,
solution buvable en ampoule, boîtes de 3.
Cholécalciférol (Vitamine D 3).

3014

PPV 49,60 DH
LOT: 20E27
EXP: 05/2023

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Les informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration.

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que D-Cure forte et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure forte ?
3. Comment prendre D-Cure forte ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure forte ?
6. Information supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE D-CURE FORTE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaceutique : Vitamines.
- Indication thérapeutique : D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que tra-

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER D-CURE FORTE ?

- N'utilisez pas D-CURE FORTE :
- si vous êtes allergique (hypersensible) au cholécalciférol ou à tout autre excipient de ce médicament.
 - si vous avez moins de 18 ans.
 - si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou d'hypercalciurie (augmentation du taux de calcium dans les urines).
 - si vous souffrez de pseudo-hypoparathyroïdisme (perturbation du métabolisme de l'hormone parathyroïdienne), puisque le besoin en vitamine D peut être réduit lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D. Dans ce cas, il y a un risque de surdosage prolongé. Des dérivés de la vitamine D qui se régulent mieux sont disponibles dans ces cas.
 - si vous avez une prédisposition à la formation de calculs rénaux contenant du calcium.
 - si vous avez une hypervitaminose D.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Utilisez D-CURE FORTE avec précaution :

- si vous présentez des troubles de l'excrétion urinaire de calcium et de phosphate,
- si vous êtes actuellement traité par des dérivés de benzothiadiazine (utilisés pour stimuler l'excrétion urinaire),
- chez les patients immobilisés puisqu'ils risquent de développer une hypercalcémie, (augmentation du taux de calcium dans le sang) et une hypercalciurie (augmentation du taux de calcium dans les urines)
- si vous souffrez de sarcoidose complète tenu du risque accu de conversion de la vitamine D en son métabolite actif. Dans ce cas, il y a lieu de surveiller la calcémie et la calciurie.

Il y a lieu de surveiller l'effet sur le métabolisme calcique et phosphorique chez les patients souffrant d'insuffisance rénale traités avec D-CURE FORTE.

Si d'autres médicaments contenant de la vitamine D sont prescrits, la dose de vitamine D contenue dans D-CURE FORTE doit être prise en considération. L'administration supplémentaire de vitamine D ou de calcium ne peut se faire que sous surveillance médicale. Dans ces cas, les taux de calcium dans le sang et dans les urines doivent être contrôlés.

En cas d'interférence ou d'interaction avec D-CURE FORTE, il est recommandé de contrôler les taux de calcium dans le sang et les urines ainsi que la

PPV (DH):

LOT N°:

UT. AV.:

39180

موكسول
أسيروكسول

Vita C 1000®

(Acide ascorbique)

DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITA C 1000®, Comprimés effervescents : Boite de 10

VITA C 1000®, Comprimés effervescents : Boite de 20 (2 tubes de 10)

VITA C 1000® SANS SUCRE, Comprimés effervescents : Boite de 10

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.

- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Quel contenu cette notice

1. Qu'est-ce que VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
3. Comment prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
6. Informations supplémentaires

1 - QU'EST-CE QUE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C), NON ASSOCIEE - code ATC : A11GA01.

- Indications thérapeutiques

Ce médicament contient de la vitamine C.

Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents.

- Ne prenez jamais VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Contre-indications)

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- si vous êtes atteint de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépeinte à la naissance), en raison de la présence d'aspartam (VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents).
- si vous présentez une insuffisance rénale sévère (défaillance grave des fonctions du rein).
- si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux.
- si vous avez des calculs d'oxalate de calcium (hyperoxalurie).
- si vous avez moins de 15 ans.

- Faites attention avec VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents.

• VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents et VITA C 1000® comprimés effervescents

• Si votre fatigue s'accroît ou persiste après 1 mois de traitement ou si elle s'accompagne de manifestations inhabituelles, prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

• En raison d'un effet thérapeutique stimulant, il est souhaitable de ne pas prendre la vitamine C.

• Prendre en compte les risques (risque de saignement).

• La vitamine C (d'hémochromatose, fer), adressez-vous à votre pharmacien pour l'objet de prendre.

• La vitamine C (glucosé-6-phosphate, rouge), ça favorisent le risque d'apparition d'une anémie hémolytique (destruction des globules rouges).

• La vitamine C peut fausser les résultats de certaines analyses biologiques, notamment des tests de contrôle du glucose sanguin et urinaire, avertissez votre médecin si des tests sont prévus.

• VITA C 1000® comprimés effervescents

• Ce médicament contient 307 mg de sodium par comprimé effervescent. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

• En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne peut être administré chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

• Ce médicament contient 441,5 mg de saccharose par comprimé effervescent dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

• Ce médicament contient un agent colorant azoïque (Jaune orangé S E110) et peut provoquer des réactions allergiques.

• VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents

• Ce médicament contient 377,3 mg de sodium par comprimé effervescent. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

• Ce médicament contient 2,24 mg d'aspartam par comprimé effervescent. L'aspartam contient une source de phénylalanine. Peut être dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.

• Ce médicament contient un agent colorant azoïque (Jaune orangé S E110) et peut provoquer des réactions allergiques.

- Enfants « et adolescents »

Sans objet.

- Prises d'autres médicaments (Interactions avec d'autres médicaments)

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.
Ce médicament contient de la vitamine C. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées.

- Aliments et boissons (Interactions avec les aliments et les boissons)

Prendre en compte les apports en vitamines et minéraux, issus des aliments enrichis et des compléments alimentaires.

- Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement - Fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de la vitamine C, pendant la grossesse.

Allaitement

La vitamine C passe dans le lait maternel. Il n'existe pas de données suffisantes sur les effets de la vitamine C chez les nouveau-nés/nourrissons. Par conséquent, il est préférable d'éviter l'utilisation de la vitamine C, pendant l'allaitement aux issus d'autres sources, compléments alimentaires, votre organisme. En cas d'excès, par une surcharge en ce médicament doit faire en cas de déficit en heréditaire des globules jaunes (à 1 gramme par jour) et en cas de déficit en phénylalanine (à 1 gramme par jour).

PPV 15DH30

EXP 09/2023

LOT 09030 12

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été prescrit personnellement. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Composition du médicament

EFLOXIN 500 mg. Chaque comprimé pelliculé sécable contient 500 mg de substance active : Lévofoxacine (sous forme de Lévofoxacine héminhydrate : 512,46 mg).

Excipients : cellulose microcristalline, cellulose en poudre, amidon de maïs prégalatinisé, amidon de maïs, crospovidone Type A, povidone K25, sodium stéaryl fumarate, Opadry II3TF32643 (Lactose monohydrate, Hydromellose 15 CP, Titanium dioxide, Macrogol PEG 4000, Oxyde de fer jaune - E172, Oxyde de fer rouge - E172, Oxyde de fer noir - E172.)

Exipients à effet notoire : Sodium, Lactose.

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Classe pharmaco-thérapeutique : antibiotiques de la famille des quinolones, fluoruroniquolones - code ATC J01MA12.

Le nom de votre médicament est EFLOXIN comprimé pelliculé sécable. EFLOXIN comprimé contient une substance active appelée la lévofoxacine. Elle appartient à un groupe de médicaments appelés antibiotiques. La lévofoxacine est un antibiotique de type « quinolone ». Elle agit en tuant les bactéries responsables d'infections dans votre organisme.

3. Indications thérapeutiques

EFLOXIN peut être utilisé pour traiter les infections des :

• Sinus.

• Poumons, chez les personnes ayant des problèmes respiratoires chroniques ou une pneumonie.

• Voies urinaires, notamment au niveau de vos reins ou votre vessie.

• Prostate, lorsque vous avez une infection qui dure.

• Peau et tissus sous-cutanés, y compris les muscles. C'est ce que l'on appelle parfois les « tissus mous ».

Dans certaines situations particulières, EFLOXIN comprimé peut être utilisé pour diminuer les risques de contracter une maladie pulmonaire appelée maladie du charbon ou les risques d'aggravation de la maladie après exposition à la bactérie responsable de la maladie du charbon.

4. Posologie :

VEUILZ A TOUJOURS PRENDRE CE MEDICAMENT EN SUivant EXACTEMENT LES INDICATIONS DE VOTRE MEDECIN, VERIFIEZ AUPRES DE VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN EN CAS DE DOUTE.

Comment prendre ce médicament ?

• Ce médicament doit être pris par la bouche.

• Avelez les comprimés entiers avec de l'eau.

• Les comprimés peuvent être pris au cours des repas ou entre les repas. Si vous prenez déjà des comprimés de fer, des suppléments à base de zinc, des antacidés, de la didanosine ou du sacrafaté.

• Ne prenez pas ces médicaments en même temps qu'EFLOXIN. Prenez ces médicaments au moins 2 heures avant ou après EFLOXIN comprimé. Combien de comprimés prendre :

• Votre médecin décidera du nombre de comprimés d'EFLOXIN que vous devez prendre.

• La dose dépendra du type d'infection dont vous souffrez et du siège de l'infection dans votre organisme.

• La durée de votre traitement dépendra de la gravité de votre infection.

• Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop faible ou trop fort, ne modifiez pas la dose de vous-même, mais interrogez votre médecin.

Adultes et personnes âgées

• Infections des sinus.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une fois par jour.

• Infections pulmonaires, chez les personnes ayant des problèmes respiratoires à long terme

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une fois par jour.

• Pneumonies

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.

• Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie.

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une ou deux fois par jour.