

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

50272

Déclaration de Maladie : N° P19- 0011096

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5356 Société : R.D.T

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nader Abdellah Date de naissance : 1950

Adresse : Derb choufia Rue 55 N° 167 Casablanca

Tél. : 05 22 91 37 27 Total des frais engagés : 5000 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

DOCTEUR BERRADA Saïd

Dermatologue

338, Bd. Driss El Harti

CASABLANCA

Tél. : 05 22 57 97 30-Fax: 05 22 57 97 33

Date de consultation : 21/10/2007

Nom et prénom du malade : S.M.S. M. A. Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Plaie / urticaire

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

DOCTEUR BERRADA Saïd
Dermatologue
338 Bd Driss El Harti
CASABLANCA
05 22 57 97 30-Fax: 05 22 57 97 33

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/10/2022	1	300,00		 DOCTEUR BERRADA Saïd Dermatologue 338 Bd. Driss El Hanafi CASABLANCA T: 02 27 30 500 - Fax: 05 22 57 97 22

~~EXECUTION DES ORDONNANCES~~

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE EL MANSOUR Mohamed Ben TAIFOR 106, Avenue EL MANSOUR Hay Al Mansour Sidi Othmane CASABLANCA TAI - 022 37.34.98.	21.10.22	374,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	C
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

الدكتور سعيد برادة
Docteur Saïd BERRADA
DERMATOLOGUE

Diplômé de la faculté de Médecine Montpellier
Ancien Attaché des Hôpitaux de Montpellier

- Maladies de la peau et du cuir chevelu
- Maladies Sexuellement Transmissibles
- Dermatologie Pédiatrique
- Chirurgie Dérmato-Logique
- Allergologie Cutanée
- Phlébologie - Sclérose des varices
- Liposculpture-Peeling-Feeling-Dermabrasion
- Botox - Comblement



SADIK
MINA
خريج بكلية الطب بمونبولي بفرنسا
منتدب سابق بمستشفيات مونبولي
 إخصاصي في أمراض وجراحة الجلد والشعر
 الأمراض التناسلية
 الأمراض الجلدية للأطفال
 حساسية الجلد
 أمراض وجراحة الدوالي
 الطب التجميلي

Casablanca, le :

21/10/2002

69,00 x 2

DEMARCK



42,30 x 2

ALLERGAINS



88,00

ANATEC



PHARMACIE EL MANSOUR
Médecine et Parfumerie
100
Hay Aïcha
CASABLANCA
Tél : 022 37 34 98

(P) a main + 1 ues

1 ues

DOCTEUR BERRADA Saïd
Dermatologue
338, Bd. Driss El Harti
CASABLANCA
Tél.: 05 22 57 97 30-Fax: 05 22 57 97 33

05 22 57 97 30 / 05 22 57 97 33 - الدار البيضاء - قرية الجماعة - 338
338, Av. Commandant Driss EL HARTI - Cité Djemâa - Casablanca - Tél : 05 22 57 97 30 / 05 22 57 97 33

I.C.E : 001713620000096

63, 5th

for airmail 16



~~324,10 ⌂ 1800 x 6 scell~~

~~Pièce jointe à la demande~~

~~DOCTEUR BERRADA Said
Dermatologue
338, Bd. Orliss El Hami
CASABLANCA
Tél.: 05 22 57 97 30-Fax: 05 22 57 97 33~~

~~M. K.~~



PHARMACIE EL MANSOUR

Mohamed TAIFOR
106, Avenue Sidi Othmane
Hay Al Mansour Sidi Othmane
CASABLANCA Tél: 022 37 34 98

Tetralysal® 300mg

lymécycline

GELULE



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TETRALYSAL 300 mg, gélule

Lymécycline

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE TETRALYSAL 300 mg, gélule ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?
 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TETRALYSAL 300 mg, gélule ?
 3. COMMENT PRENDRE TETRALYSAL 300 mg, gélule ?
 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
 5. COMMENT CONSERVER TETRALYSAL 300 mg, gélule ?
 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.
1. QU'EST-CE QUE TETRALYSAL 300 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament est un antibiotique de la famille des tétracyclines.

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines formes d'acné.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TETRALYSAL 300 mg, gélule ?

Ne prenez jamais TETRALYSAL 300 mg, gélule dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la lymécycline, à l'un des autres composants contenus dans TETRALYSAL 300 mg, gélule ou aux antibiotiques de la famille des tétracyclines.
- Chez l'enfant de moins de 8 ans en raison du risque de coloration permanente des dents de l'enfant et de développement incomplet de l'émail dentaire.
- En association avec les rétinoides administrés par voie orale (médicaments utilisés dans certaines maladies de la peau).

SI CAS DE DOUCE, IL FAUT IMMÉDIATEMENT DEMANDER L'AIDE DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE

- Diminution des plaquettes (éléments du sang importants dans la coagulation sanguine) (*thrombopénie*).
- Troubles de la vue.
- Inflammation de la langue, inflammation de l'intestin.
- Vomissements.
- Douleur de l'estomac (*épigastralgie*).
- Fièvre.
- Jaunisse.
- Réactions allergiques : urticaire, œdème de Quincke (brusque gonflement du visage et du cou), réaction allergique pouvant être généralisée (œdème, chute de la tension artérielle, gêne respiratoire).
- Augmentations dans le sang des taux de transaminases, phosphatases alcalines et de bilirubine (enzymes du foie).
- Hypertension intracrânienne, sensation de malaise.
- Eruptions cutanées avec rougeur, réactions de photosensibilité (réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV), démangeaisons, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps (*syndrome de Stevens Johnson*).

D'autres effets indésirables ont été décrits lors de traitement par des tétracyclines :

- En cas d'administration chez l'enfant de moins de 8 ans, coloration anormale et permanente des dents et développement insuffisant de l'émail dentaire.
- Modifications du bilan sanguin (dont la diminution des globules rouges, augmentation de certains globules blancs (*éosinophilie*)).
- Augmentation du taux d'urée dans le sang chez l'enfant en raison de l'absorption des médicaments diurétiques.

Si vous remarquez des effets indésirables non indiqués dans cette notice, veuillez en informer votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER TETRALYSAL 300 mg, gélule

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser TETRALYSAL 300 mg, gélule à moins de 3 mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

TETRALYSAL 300 mg
Boîte de 16 gélules
AMM N°28 DMP/21/NCV
P.P.V : 69,00 DH
Distribué par SOTHEMA
B.P N°1, 27182 Bouskoura-Maroc





6 118001 070800



Tetralysal® 300mg

lymécycline

GELULE



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TETRALYSAL 300 mg, gélule

Lymécycline

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE TETRALYSAL 300 mg, gélule ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TETRALYSAL 300 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE TETRALYSAL 300 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER TETRALYSAL 300 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE TETRALYSAL 300 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament est un antibiotique de la famille des tétracyclines.

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines formes d'acné.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TETRALYSAL 300 mg, gélule ?

Ne prenez jamais TETRALYSAL 300 mg, gélule dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la lymécycline, à l'un des autres composants contenus dans TETRALYSAL 300 mg, gélule ou aux antibiotiques de la famille des tétracyclines.
- Chez l'enfant de moins de 8 ans en raison du risque de coloration permanente des dents de l'enfant et de développement incomplet de l'émail dentaire.
- En association avec les rétinoides administrés par voie orale (médicaments utilisés dans certaines maladies de la peau).

SI CAS DE DOUCE, IL FAUT IMPERATIVEMENT DEMANDER L'AIDE DE VOTRE MEDICIN OU DE VOTRE

- Diminution des plaquettes (éléments du sang importants dans la coagulation sanguine) (*thrombopénie*).
- Troubles de la vue.
- Inflammation de la langue, inflammation de l'intestin.
- Vomissements.
- Douleur de l'estomac (*épigastralgie*).
- Fièvre.
- Jaunisse.
- Réactions allergiques : urticaire, œdème de Quincke (brusque gonflement du visage et du cou), réaction allergique pouvant être généralisée (œdème, chute de la tension artérielle, gêne respiratoire).
- Augmentations dans le sang des taux de transaminases, phosphatases alcalines et de bilirubine (enzymes du foie).
- Hypertension intracrânienne, sensation de malaise.
- Eruptions cutanées avec rougeur, réactions de photosensibilité (réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV), démangeaisons, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps (*syndrome de Stevens Johnson*).

D'autres effets indésirables ont été décrits lors de traitement par des tétracyclines :

- En cas d'administration chez l'enfant de moins de 8 ans, coloration anormale et permanente des dents et développement insuffisant de l'émail dentaire.
- Modifications du bilan sanguin (dont la diminution des globules rouges, augmentation de certains globules blancs (*éosinophilie*)).
- Augmentation du taux d'urée dans le sang chez l'enfant en raison de l'absorption des médicaments diurétiques.

Si vous remarquez des effets indésirables non indiqués dans cette notice, veuillez en informer votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER TETRALYSAL 300 mg, gélule

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser TETRALYSAL 300 mg, gélule au-delà de la date limite de validité.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

TETRALYSAL 300 mg
Boîte de 16 gélules
AMM N°28 DMP/21/NCV
P.P.V : 69,00 DH
Distribué par SOTHEMA
B.P N°1, 27182 Bouskoura-Maroc



6 118001 070800



Curtec®

Cétirizine
10 mg

COMPOSITION :

Cétirizine (DCI) Dichlorhydrate 10 mg
Excipients q.s.p. 1 comprimé

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé sécable.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antihistaminique H1.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est un antihistaminique. (Il s'oppose aux effets de certaines substances telles que l'histamine libérées dans l'organisme au cours de l'allergie). Il est préconisé :

Chez l'adulte pour traiter les symptômes :

- de la rhinite allergique saisonnière (ex. rhume des foins) ou perannuelle,
- de l'urticaire,
- des conjonctivites d'origine allergique.

Chez l'enfant de 6 à 12 ans pour traiter les symptômes :

- de la rhinite allergique saisonnière (ex. rhume des foins) ou perannuelle,
- de l'urticaire.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par 24 heures en 1 prise, soit 1 comprimé 1 fois par jour.


Enfant de 6 à 12 ans : 10 mg par 24 heures en 1 ou 2 prises, soit 1 comprimé 1 fois par jour ou $\frac{1}{2}$ comprimé 2 fois par jour.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT AUX INSTRUCTIONS DE VOTRE MEDECIN.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ :

- Si vous êtes allergique à l'un des ingrédients (cétirizine, lévocétirizine ou à l'éthylène diamine),
- Insuffisance rénale,
- Chez l'enfant de moins de 6 ans.



PPV: 88DH00

PER: 05/23

LOT: J1299



DE

la

FONGICAN®

Fluconazole

Formes et présentations :

Gélule à 150 mg : Boîte de 1 gélule
Gélule à 150 mg : Boîte de 2 gélules
Gélule à 150 mg : Boîte de 3 gélules
Gélule à 150 mg : Boîte de 4 gélules
Gélule à 150 mg : Boîte de 5 gélules
Gélule à 150 mg : Boîte de 6 gélules
Gélule à 150 mg : Boîte de 7 gélules
Gélule à 50 mg : Boîte de 3 gélules
Gélule à 50 mg : Boîte de 7 gélules

Composition :

FONGICAN® 150 mg

Fluconazole (DCI)..... 150 mg
Excipients q.s.p 1 gélule

FONGICAN® 50 mg

Fluconazole (DCI)..... 50 mg
Excipients q.s.p 1 gélule

Propriétés :

- Le fluconazole est un agent antifongique bis-triazolé utilisable par voie orale.

Indications :

Le fluconazole est indiqué pour le traitement :

- Des candidoses vaginales et périnéales aigües et récidivantes.
- Des balanites candidosiques.
- Des dermo épidermomycoses incluant les Tinea pedis (intertrigo interorteils), les Tinea corporis (Herpès circiné), les Tinea cruris (Intertrigo) et les candidoses cutanées.
- Des onychomycoses (Tinea unguium).
- Des candidoses oropharyngées, notamment chez les patients immunodéprimés, soit en raison d'une affection maligne soit d'un syndrome de déficience immunitaire acquise.
- Des candidoses buccales atrophiques.
- Des cryptococcoses neuroméningées.
- Des candidoses systémiques.
- De la prophylaxie des infections fongiques chez les patients présentant une affection maligne et qui sont prédisposés à ce genre d'infections suite à la chimiothérapie cytotoxique et à la radiothérapie.

Contre-indications :

- Hypersensibilité au fluconazole et/ou à d'autres dérivés azolés
- Cisapride
- Femme enceinte ou qui allaite

Effets indésirables :

- Effets gastro-intestinaux : nausées, flatulence, douleurs abdominales, diarrhées.
- Effets allergiques et cutanés : rashes, réactions cutanées sévères à type de toxidermies bulleuses. (syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell, en particulier au cours du Sida), réactions anaphylactiques.
- Effets généraux : céphalées pouvant être éventuelles.

Mises en garde et précautions d'emploi :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, ne pas prendre avec tout autre traitement en cours à votre médecin ou pharmacien.

Posologie et mode d'emploi :

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

- Ce médicament doit être conservé à l'abri de la chaleur et de l'humidité, à une température ne dépassant pas 30 °C.
- Ne pas laisser à la portée des enfants
- Liste I



ALLERGINE® 10mg, Comprimé
Boîte de 10, 15 & 30
(Loratadine)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION

Principe actif :

Loratadine micronisée 10,00 mg

Pour 1 comprimé

Excipients : Lactose, amidon de maïs, stéarate de magnésium q.s.p 1 comprimé

Excipient à effet notoire : Lactose

CLASSE PARACO-THÉRAPEUTIQUE

Ce médicament est un antihistaminique (il s'oppose aux effets de l'histamine, libérée dans l'organisme au cours de l'allergie).

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

Il est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 30 kg pour traiter les symptômes :

- de la rhinite allergique,
- de l'urticaire.

POSOLOGIE

Adultes et enfants de plus de 30kg : la posologie usuelle est de 1 comprimé par jour.

Ce comprimé dosé à 10 mg n'est pas adapté aux enfants de moins de 30 kg.

La posologie doit être adaptée en cas d'insuffisance hépatique sévère.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez l'impression que l'effet de ALLERGINE® 10 mg, comprimé est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Avaler le comprimé à l'aide d'un verre d'eau.

Ce médicament peut être pris indifféremment par rapport aux repas (pendant ou en dehors des repas).

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais ALLERGINE® 10 mg, comprimé si vous êtes allergique à la loratadine ou à l'un des autres composants de ce médicament.

EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, ALLERGINE® 10 mg, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Possibilité de :

- Maux de tête, nervosité, fatigue, somnolence, augmentation de l'appétit, insomnie (difficulté à dormir).

Très rarement :

- Hypersensibilité (réaction allergique), vertiges, tachycardie (accélération du rythme cardiaque), palpitations, nausées, bouche sèche, douleur d'estomac, troubles des fonctions hépatiques (foie), rash (éruption cutanée), chute de cheveux, fatigue.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI

Faites attention avec ALLERGINE 10 mg, comprimé :

Prévenez votre médecin en cas de maladie grave du foie.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients prése

12/30

ALLERGINE® 10mg, Comprimé
Boîte de 10, 15 & 30
(Loratadine)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION

Principe actif :

Loratadine micronisée 10,00 mg

Pour 1 comprimé

Excipients : Lactose, amidon de maïs, stéarate de magnésium q.s.p 1 comprimé

Excipient à effet notoire : Lactose

CLASSE PARACO-THÉRAPEUTIQUE

Ce médicament est un antihistaminique (il s'oppose aux effets de l'histamine, libérée dans l'organisme au cours de l'allergie).

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

Il est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 30 kg pour traiter les symptômes :

- de la rhinite allergique,
- de l'urticaire.

POSOLOGIE

Adultes et enfants de plus de 30kg : la posologie usuelle est de 1 comprimé par jour.

Ce comprimé dosé à 10 mg n'est pas adapté aux enfants de moins de 30 kg.

La posologie doit être adaptée en cas d'insuffisance hépatique sévère.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez l'impression que l'effet de ALLERGINE® 10 mg, comprimé est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Avaler le comprimé à l'aide d'un verre d'eau.

Ce médicament peut être pris indifféremment par rapport aux repas (pendant ou en dehors des repas).

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais ALLERGINE® 10 mg, comprimé si vous êtes allergique à la loratadine ou à l'un des autres composants de ce médicament.

EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, ALLERGINE® 10 mg, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Possibilité de :

- Maux de tête, nervosité, fatigue, somnolence, augmentation de l'appétit, insomnie (difficulté à dormir).

Très rarement :

- Hypersensibilité (réaction allergique), vertiges, tachycardie (accélération du rythme cardiaque), palpitations, nausées, bouche sèche, douleur d'estomac, troubles des fonctions hépatiques (foie), rash (éruption cutanée), chute de cheveux, fatigue.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI

Faites attention avec ALLERGINE 10 mg, comprimé :

Prévenez votre médecin en cas de maladie grave du foie.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients prése

12/30