

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

iologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

ique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

ladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19-0029124

Optique *SO248* Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : *4855*

Société : *Royal air maroc*

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom : *TAWFIK Ahmed*

Date de naissance : *01 - 01 - 1948*

Adresse : *Haj. El Raed Résidence Al Fajr n° 100*

Boulevard N° 1 - Gidi Bourguessa - CASABLANCA

Tél. : *02 79 41 11 17* Total des frais engagés : *695.80* Dhs

Cadre réservé au Médecin **Docteur Abdel-Ilah NABIL**

Medecine generale
148 Lotissement Al Fajr
1er étage - Appart N° 1 - Mohammedia
Téléphone : 05 23 32 03 04

Cachet du médecin :

Date de consultation : *13.0 NOV 2020*

Nom et prénom du malade : *SAJID NAIMA* Age : *en 1978*

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : *Affectation pulmonaire*

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : *CASABLANCA* Le : *30.11.2020*

Signature de l'adhérent(e) : *J. Muz*

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
30 NOV 2020	C		150.00	Docteur Abdellah NABIL Médecine générale 146 Lotissement Al Fajr 1er étage Appart N° 10 Mohammedia Telephone : 05 23 32 03 04

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>HARMACIE EL JOUAISSI Mohamed El Joussi 05 22 00 00 00</i>	30/11/2020	535,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

BELEVE DES FRAIS ET LAISSES LES AIRS

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient													
				COEFFICIENT DES TRAVAUX												
				MONTANTS DES SOINS												
				DEBUT D'EXECUTION												
				FIN D'EXECUTION												
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table>		H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	00000000	00000000		35533411	11433553		COEFFICIENT DES TRAVAUX
H	25533412	21433552														
D	00000000	00000000														
B	00000000	00000000														
	35533411	11433553														
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS												
				DATE DU DEVIS												
				DATE DE L'EXECUTION												

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Abdel-Illah NABIL

Médecine générale



الدكتور عبد الله نabil

الطب العام

Mohammedia, le: 3.0 Nov. 2020 الخمسة في

متر NAIMA SAGID

163,40

3) Mowzeder 500

99,00 ٢٤٥ مل ٥٠٠ مل × ٧٤

2) Ivermect 40

79,45 ١٩٧ مل × ١٤٣

3) Fitorax ١٠٠ مل × ٣٦

٥٩,٥ ١٠٠ مل × ٣٦

4) Alperin 50

١٣٤,٥٠ ٢٤٥ مل × ١٠٠

5) Cibulet

٢٥٦

535,80

PHARMACIE EL JOULANE
SOCIETE DE PHARMACEUTIQUE
Mohammedia
Tél: 05 23 28 38 27

Docteur Abdel-Illah NABIL
Médecine générale
148 Lotissement Al Fajr
1er étage - Appart N°1 - Mohammedia
Téléphone : 05 23 32 03 04

ALPERIDE® 50,100,200 et 400 mg

Comprimé Sécable

Boîtes de 30

Amisulpride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative

Amisulpride (DCI).....	50 mg ou 100 mg ou 200 mg ou 400 mg
Excipients	Q.S.P..... 1 Comprimé

EXCIPENT A EFFET NOTOIRE

Lactose.

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIPSYCHOTIQUE (code ATC : N05AL05).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques et du comportement, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Respectez toujours la dose prescrite par votre médecin.

En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Ce médicament est à utiliser par voie orale.

Avalez le(s) comprimé(s) avec un peu d'eau.

DUREE DE TRAITEMENT :

N'arrêtez pas de vous-même le traitement.

NE DEPASSEZ PAS LA POSOLOGIE NI LA DUREE DE TRAITEMENT PRESCRITES PAR VOTRE MEDECIN.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ne prenez jamais ALPERIDE®, comprimé sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'Amisulpride) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous souffrez d'un phéochromocytome (croissance excessive des glandes surrénales situées au niveau des reins et libérant des substances qui provoquent une pression artérielle élevée).
- Chez l'enfant de moins de 15 ans.
- Si vous allaitez.

• Si vous avez une tumeur dépendante de la prolactine provoquant la sécrétion de lait, par exemple un cancer des troubles d'origine hypophysaire.

• Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que avec ce médicament n'est pas contre-indiquée (Voir le prospectus d'autres médicaments*).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFECTS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUTS LES MEDICAMENTS, ALPERIDE®, comprimé sécable SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES EFFECTS INDÉSIRABLES, SURTOUT DANS LES DEUX PREMIÈRES SEMAINES DE TRAITEMENT.

La survenue d'une rigidité des muscles et de troubles de la conscience s'accompagnant d'une fièvre inexplicable au cours du traitement nécessite l'arrêt immédiat du traitement et une consultation médicale d'urgence.

Les effets indésirables suivants surviennent très fréquemment (plus de 1 personne sur 10) :

Tremblements, rigidité musculaire, crampes, mouvements anormaux, salivation excessive.

Les effets indésirables suivants surviennent fréquemment (de 1 à 10 personnes sur 100) :

Torticoli, crises oculogyres (mouvements anormaux de certains muscles des yeux), contraction intense des mâchoires,

Somnolence,

Insomnie, anxiété, agitation,

Constipation, nausées, vomissements, sécheresse de la bouche,

Frigidité (absence de plaisir sexuel chez la femme),

Hyperprolactinémie (quantité excessive de prolactine dans le sang, hormone provoquant la lactation) pouvant provoquer :

o Chez la femme : arrêt des règles, écoulement de lait en dehors des périodes normales d'allaitement,

o Chez l'homme : gonflement des seins et impuissance (trouble de l'érection).

Prise de poids,

Tension artérielle basse (hypotension).

Les effets indésirables suivants surviennent peu fréquemment (de 1 à 10 personnes sur 1 000) :

Mouvements involontaires de la langue et/ou du visage,

Convulsions (contractions involontaires d'un ou plusieurs muscles),

Hyperglycémie (quantité excessive de sucre dans le sang),

Ralentissement du rythme cardiaque,

Augmentation des enzymes du foie et principalement des transaminases,

Réactions allergiques.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir mais on ne connaît pas leur fréquence. Si vous ressentez un de ces symptômes, consultez immédiatement un médecin :

Fievre inexplicable associée à des troubles généraux et neurologiques,

Syncopes graves (pertes de connaissance), troubles du rythme cardiaque pouvant entraîner le décès,

Gonflement, douleur et rougeur au niveau des jambes. En effet, des caillots sanguins veineux, (particulièrement au niveau des jambes) peuvent se déplacer via les vaisseaux sanguins jusqu'aux poumons et provoquer une douleur dans la poitrine et une difficulté à respirer.

Brusque gonflement du visage et/ou du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer et mettre en danger le patient (ango-oedème), plaques rouges sur la peau qui démangent (urticaire).

Leucopénie, neutropénie, agranulocytose (quantité basse de globules blancs dans le sang) (voir paragraphe « Mises en garde spéciales »),

Syndrome de sevrage du nouveau-né (voir paragraphe « Grossesse »).

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec ALPERIDE®, comprimé sécable :

- Votre médecin pourra pratiquer un électrocardiogramme avant de vous donner ce médicament. Il peut provoquer des troubles cardiaques.



formation de caillots sanguins, car la prise d'antipsychotiques peut provoquer la formation de caillots sanguins,

CIBALAX®

FOS - *Bifidobacterium lactis*

Cibalax® est un complément alimentaire riche en fibres alimentaires et contient également une haute concentration de bifidobactéries qui favorisent naturellement des selles régulières et un bon transit intestinal

Qu'est-ce que CIBALAX®?

- Chaque stick de Cibalax® contient 1 milliard de *Bifidobacterium lactis* lyophilisées. Les Bifidobactéries dans Cibalax® sont protégées grâce à l'Intellicaps, une nouvelle technologie de microencapsulation qui leur garantit une meilleure survie. Ce nouveau procédé breveté mondialement améliore la qualité du produit.
- FOS qui est une fibre soluble.

Dans quels cas CIBALAX® est-il utilisé?

- Cibalax® favorise naturellement le bon fonctionnement intestinal et l'émission régulière des selles.
- Cibalax® est efficace dès les premiers jours d'utilisation.
- Cibalax® n'entraîne pas de prise de poids.
- Cibalax® peut être utilisé de manière prolongée.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CIBALAX®?

- Il est recommandé de ne pas dépasser la quantité journalière recommandée.
- Il n'existe pas de contre-indication à la prise de Cibalax®, cependant les personnes souffrant de troubles sévères de l'immunité doivent être suivies de près par leur médecin.
- Ne pas utiliser Cibalax® en cas d'hypersensibilité ou d'allergie à un ou plusieurs excipients du produit.
- Cibalax® ne peut se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.

CIBALAX® en période de grossesse ou d'allaitement

- Grâce à sa composition naturelle, Cibalax® peut être utilisé par la femme enceinte ou en période d'allaitement.

Comment prendre CIBALAX®?

- Cibalax® peut être utilisé par les enfants à partir de l'âge de 5 ans et les adultes.
- La dose recommandée est de 1 stick par jour le matin ou le midi. Cette dose peut être augmentée si nécessaire à maximum 2 sticks par jour à prendre en 2 prises séparées.
- Dissoudre le stick dans un verre d'eau ou de jus de fruit ou encore dans les céréales du petit-déjeuner.

Quelques conseils supplémentaires d'hygiène de vie

- Démarrer votre journée par la prise d'un grand verre d'eau et veillez à boire 1,5 à 2 litres de liquides par jour.
- Prenez vos repas assis et à heure fixe en mangeant lentement et en mâchant bien les aliments.
- Favorisez les aliments riches en fibres.
- Maintenez une activité physique régulière.
- Évitez de vous retenir lorsque le besoin se fait sentir.

Comment conserver CIBALAX®?

- Il est conseillé de conserver Cibalax® au sec, à une température inférieure à 25°C et de le consommer avant la date de péremption.
- La date de péremption est mentionnée sur la face externe de l'emballage et fait référence au produit non ouvert et correctement conservé.

Quelle est la composition de CIBALAX®?

Fructo-oligo-saccharides (FOS);
Bifidobacterium lactis; Dioxyde de silicium

Comment se procurer CIBALAX®?

- Cibalax est disponible en pharmacie

PPC : 134DH00

Distrib

b

82, Allée des Casu

07 2022
SG20002



5 420044 310395

ECLAR® 500 mg
és à libération modifiée
(amoxicilinac)

cette notice avant de

pourriez avoir besoin

estions, interrogez votre pharmacien.

• • • Il vous a été personnellement
• • • Je donnez pas à d'autres personnes. Il
• • • Soit leur être nocif, même si leurs symptômes
• • • Soit identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que MONOZELAR et dans quel cas est-il utilisé
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MONOZELAR
 3. Comment prendre MONOZELAR
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels
 5. Comment conserver MONOZELAR
 6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE MONOZECLAR ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ

MONOZELAR est un antibiotique appartenant à un groupe appelé macrolides. Les antibiotiques arrêtent le développement de certains germes (microbes) qui provoquent des infections. Son utilisation est décrite ci-dessous. Les comprimés de **MONOZELAR** sont des comprimés pelliculés à libération modifiée, ce qui signifie que la substance active est libérée lentement du comprimé ; cela vous permet de ne prendre le médicament qu'une fois par jour.

Dans quel cas MONOZECLAR est-il utilisé

Les comprimés de MONOZECIAP sont pris par jour en 1 p. t.
des infections telles que Traitement débuté le
(أعراض) في اليوم

- 1 Infections du thorax
pneumonie
 - 2 Infections de la gorge
 - 3 Infections de la peau connues sous le nom de

Les comprimés de MONO,
adultes et les enfants de 12

2. QUELLES SONT LES INITIATIVES AVANT DE PRENDRE M

Ne prenez jamais les comprimés

- Si vous êtes allergique à la clarithromycine ou à d'autre classe de médicaments, comme l'érythromycine ou l'azithromycine.

- Si vous prenez des alcaloïdes de l'ergot (par exemple des comprimés d'ergotamine ou de dihydroergotamine) ou utilisez un inhalateur d'ergotamine contre la migraine, de la terfénadine ou de l'astémizole (médicaments contre le rhume des foins ou les allergies), des comprimés de cisapride (contre les troubles de l'estomac) ou des comprimés de pimozide (médicament utilisé pour traiter certaines affections psychiatriques) ou du midazolam par voie orale (contre l'anxiété pour aider à dormir).

- Si vous prenez des médicaments contre

vous continuiez à prendre les comprimés pendant toute la durée prescrite par le médecin, faute de quoi l'infection pourrait ne pas être complètement traitée et le problème pourraît réapparaître.

Utilisation chez les enfants

Il est possible que ces comprimés ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans, car ils sont difficiles à avaler. Il est donc préférable d'utiliser des médicaments liquides chez les enfants. Votre médecin prescrira un autre médicament adapté à votre enfant.

Si vous oubliez de prendre MONOZECLAR

Si vous oubliez de prendre un comprimé de MONOZECLAR, prenez-le dès que vous y pensez. Ne prenez pas plus de comprimés sur une journée que votre médecin ne nous l'a prescrit.

Si vous avez pris plus de MONOZECLAR que vous n'auriez dû

Si vous prenez accidentellement plus de deux comprimés de MONOZECLAR sur une journée, ou si un enfant avale des comprimés par accident, consultez un médecin d'urgence, même en l'absence de symptômes ou de problèmes. Il est probable qu'un surdosage de MONOZECLAR provoque des vomissements et des douleurs d'estomac, et il existe un risque de réactions allergiques. Si vous avez pris trop de MONOZECLAR, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245 245).

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, MONOZECLAR peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables signalés lors de l'utilisation de MONOZECLAR sont énumérés ci-dessous.

Effets indésirables fréquents de MONOZECLAR (survenant chez 1 à 10 utilisateurs sur 100) sont les suivants :

- | | |
|--|--|
| Insomnies | |
| de tête | |
| du goût | |
| éé | |
| es ou vomissements | |
| ir d'estomac | |
| n cutanée | |
| indésirables | |
| 8 | |
| lanca | |
| ét | |
| - Perte de connaissance, étourdissements, tremblements | |
| - Tintement dans les oreilles, surdité, vertige, sensation de tête qui tourne, et troubles auditifs | |
| - Manque d'énergie, douleur thoracique, gonflement du visage, sensation de malaise général, douleur et soif | |
| - Modifications du rythme cardiaque | |
| - Asthme et essoufflement | |
| - Constipation, pancréatite, sécheresse de la bouche, quantité excessive de gaz dans l'estomac et vomissements | |

1 à
Exp: _____
Fab: _____
Lot: _____
1130581
04-2020
03-2023





Solution buvable

FitOrax®

FORMES ET PRESENTATIONS :

FitOrax® Adultes Solution buvable, flacon 200ml.

FitOrax® Enfants Solution buvable, flacon 200ml.

PROPRIETES :

FitOrax® solution buvable est à base d'extraits de propolis, d'échinacée ainsi que d'autres actifs naturels qui contribuent à libérer les voies respiratoires encombrées et à apaiser l'irritation de la gorge tout en fortifiant les défenses naturelles de l'organisme procurant ainsi un confort respiratoire global.

UTILISATIONS :

- Voies respiratoires encombrées.
- Gorge irritée.
- Enrouement.

CONSEILS D'UTILISATION :

FitOrax® Adultes : 1 cuillère à soupe 3 à 4 fois par jour.

FitOrax® Enfants : - Moins de 4 ans : 1 cuillère à café 3 fois par jour.

- De 4 à 12 ans : 1 cuillère à soupe 3 fois par jour.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Après ouverture, à conserver au frais et à consommer dans un délai d'un mois.
- Le produit peut présenter des sédiments dûs à la nature de ses composants, toutefois sa qualité et son efficacité ne sont pas altérées.
- FitOrax® Adultes est déconseillé chez la femme enceinte.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament

Fabriqué par Pharmalife Research s.r.l. - Italie.

Importé et distribué au Maroc par MEDIPRO Pharma

Autorisations du Ministère de la Santé n° :

FitOrax® Adultes / DA 20151405347DMP/20UCA/v1

FitOrax® Enfants / DA 20161405271DMP/20UCA/v1

Autorisation sanitaire ONSSA n° : ES.5.229.16

Lot :
À consommer
avant le :

200150

PPC : 20,90 DH

03/2023