

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## itions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## otique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## ééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

ND: 50414

## Déclaration de Maladie : № P19- 0015625

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 12955 Société : Royal Air Maroc

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Benkisra Hassou Date de naissance : 01/07/1986

Adresse :

187 av Abdellah Benkouhen, Rendevi Uudili prc 200c, Apt 18

Tél. :

0661534530 Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 09 NOV 2020

Nom et prénom du malade : Benkisra Zineb Age: 34 ans

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection ORL

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 09/11/2020

 MUPRAS

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
19-07-2014		03	850,00	 Dr. MOUSSA OUALI Mohamed Professeur de Pédiatrie Tél: 0522 26.07.2014 Charles Nicolle

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 <b>Pharmacie ARFEL MOUMEN</b> <b>EL Hassine BENNANI</b> <b>Pharmacien Biogiste</b> <b>T 173 de 1000 752273</b>	09/11/20	165-80

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d

Dr. Mohamed SQALLI HOUSSAINI

Professeur de Pédiatrie

Ancien Chef de Service de Réanimation Pédiatrique et  
de Néonatalogie Hôpital d'Enfants C.H.U. Ibn Rochd

Spécialiste des Maladies des Enfants et des Nourrissons

Pathologie Néonatale - Urgences Pédiatriques

Exploration et traitement de l'Asthme de l'Enfant

Membre de la Société Pédiatrique de Pneumologie

et d'Allergologie

الدكتور محمد صقلی حسيني

أستاذ جامعي في طب الأطفال

رئيس سابق لمصلحة إنعاش الأطفال

والملود الجديد - مستشفى ابن رشد

اختصاصي في أمراض الأطفال والرضيع

أمراض المولود الجديد المستعجلات الطبية

تشخيص و علاج مرض الضيق عند الأطفال

عضو جمعية الأطفال المختصة في الجهاز

التنفسية و الحساسية

Casablanca, le ..... الدار البيضاء, في

09.11.2020

Enfant BENKIRANE Zineb

Age : 3 ans 3 mois

1 JOSACINE SIROP 500 MG (240 DOSES)

Graduation à 15, 2 fois / jour, pendant 5 jours


1 boite

2 APIRETIL SIROP (PARAC) (CONSER < 15)

Graduation à 15, 3 fois / jour, pendant 4 jours

3 DOLIPRANE SUPPOSITOIRES 300 MG (VERT)

1 suppositoire, le soir pendant 2 jours



صيدلية عبد المؤمن  
Pharmacie ABDELMOUNEN  
EL Houssine BEN NANI  
Pharmacien Biologiste  
110, av. Abd el Karim Gueliz  
Tél: 0522 25 11 11

صيدلية عبد المؤمن  
Pharmacie ABDELMOUNEN  
EL Houssine BEN  
Pharmacien Biologiste  
110, av. Abd el Karim Gueliz  
Tél: 0522 25 11 11

Dr Mohamed SQALLI  
Professeur de Pédiatrie  
Tél: 022 26 07 20

Résidence Pasteur : 21. Place Charle Nicols (Face Institut Pasteur) 1er étage - N°3 - Casablanca

Tél.: 05 22 26 07 20 / 05 22 26 90 07 - Fax : 05 22 29 78 67 - GSM: 06 61 14 98 84 - E-mail : azhoum@yahoo.fr

D

100 mg  
150 mg  
200 mg  
300 mg

LOT J612  
PER 02/23  
120HB0



#### COMPOSITION

Doliprane 100 mg	Pour un suppositoire	100 mg
Doliprane 150 mg : paracétamol		150 mg
Doliprane 200 mg : paracétamol		200 mg
Doliprane 300 mg : paracétamol		300 mg

Excipients : glycérides hémisynthétiques solides

#### FORME PHARMACEUTIQUE

Doliprane 100 mg suppositoire sécable	Boîte de 10 suppositoires
Doliprane 150 mg suppositoire	Boîte de 10 suppositoires
Doliprane 200 mg suppositoire	Boîte de 10 suppositoires
Doliprane 300 mg suppositoire	Boîte de 10 suppositoires

#### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE - ANTIPYRETIQUE

(N: Système nerveux central)

#### DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué en cas de douleurs et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

#### DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Allergie connue au paracétamol
- Maladie grave du foie
- Inflammation récente anale ou rectale ou saignement récent du rectum
- **En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**

#### MISES EN GARDE SPECIALES

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre «posologie»)

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

**En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**

#### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Signaler la prise de Doliprane à votre médecin en cas de prescription de dosage de l'acide urique sanguin ou de la glycémie.

LOT : M0184  
EXP : AVR 2024  
PPV : 127,60 DH



**n buvable  
n buvable  
n buvable  
orale**



édicament.  
ations à votre  
qu'un d'autre,  
désirable non  
QUEL CAS  
: JOSACINE,

QUEL CAS

pathétaires et sur

uspension buvable"

ml, 250 mg/5 ml et 500

JO,  
est sp.  
mg/5 ml.

Le dosage à utiliser dépend du poids de votre enfant :

Le dosage "JOSACINE 125 mg/5 ml" est réservé au nourrisson pesant entre 2 et 5 kg.

Le dosage "JOSACINE 250 mg/5 ml" est réservé à l'enfant pesant entre 5 et 10 kg.


Le dosage "JOSACINE 500 mg/5 ml" est réservé à l'enfant pesant entre 10 et 40 kg.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE JOSACINE  
granulés pour suspension buvable ?**

Si votre médecin vous a informé (e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais JOSACINE, granulés pour suspension buvable dans les cas suivants:**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (la josamycine) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6.
- L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée chez la mère qui allaite un enfant traité par cisapride (voir paragraphe « Allaitement »).
- En association avec :



2) Tirez sur le piston pour aspirer la suspension, jusqu'au trait correspondant au poids de l'enfant.

Si le poids de l'enfant dépasse celui indiqué sur les graduations de la seringue, complétez-en prélevant la quantité manquante.



**JOSACINE 500 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable** : Pour un enfant pesant 30 kg, prélevez une première fois jusqu'à la graduation 20 kg puis prélevez une seconde fois jusqu'à la graduation 10 kg.

3) Après utilisation, refermez le flacon et rincez la seringue avec de l'eau.

4) Enlevez la pellicule de protection du support de la seringue et collez le support sur le côté du flacon.

5) Replacez la seringue dans son support fixé sur le flacon.

Attention, cette seringue pour administration orale ne doit pas être utilisée pour un autre médicament, la graduation étant spécifique à ce produit.

**Durée du traitement**

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

La disparition de la fièvre ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que votre enfant est complètement guéri.

L'éventuelle impression de fatigue n'est pas due au traitement antibiotique mais à l'infection elle-même.

Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait la guérison.

**Si vous avez pris plus de JOSACINE, granulés pour suspension buvable que vous n'auriez dû:**  
Cela peut entraîner des effets gastro-intestinaux comme des nausées ou des diarrhées qui doivent être traités.

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre JOSACINE, granulés pour suspension buvable:**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

**Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.**

**4. QUELLES SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Effets digestifs : nausées, vomissements, maux d'estomac, diarrhée, douleur au ventre, colite pseudo-membraneuse (diarrhée sévère, persistante et/ou sanguinante), inflammation de la muqueuse de la bouche (stomatite).

- Effets sur la peau : éruptions, rougeurs, lésions sur la peau avec des bulles, décollement de la peau (érythème polymorphe).

# OLUTION ORALE

## mol

contient des informations importantes pour votre traitement. Ce devez toujours utiliser APIRETIL® 100 mg/ml Pédiatrique avec

enfants et 5 jours chez les adultes (2 jours pour les maux de gorge),  
table non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à

28,40

g/ml ?

### UTILISE ?

appelés analgésiques et antipyétiques.  
légère à modérée, et pour éliminer la fièvre chez l'enfant et le nourrisson.

#### 2. Quel

Ne pas prendre APIRETIL® 100 mg/ml solution orale :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au paracétamol ou à l'un des autres composants d'APIRETIL® 100 mg/ml solution orale.
- Si vous avez une maladie du foie.

Précautions spéciales avec APIRETIL® 100 mg/ml solution orale :

- Ne pas prendre plus que la dose recommandée dans la section 3 "Comment prendre APIRETIL® 100 mg/ml Solution orale".
- La consommation de boissons alcoolisées simultanément avec le paracétamol peut endommager le foie.
- Il convient de faire contrôler régulièrement les fonctions hépatiques et rénales lors d'un traitement prolongé ou à fortes doses de paracétamol.
- Si l'enfant souffre d'une maladie des reins, du cœur, des poumons ou d'anémie, vous devez consulter le médecin traitant avant de lui administrer ce médicament.
- Si des symptômes persistent plus de 3 jours, ou s'aggravent ou si d'autres symptômes non mentionnés dans cette notice apparaissent, interrompre le traitement et consultez le médecin traitant.
- Si l'enfant prend déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique "Utilisation d'autres médicaments".

Utilisation des autres médicaments :

Si l'enfant prend ou a pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en au médecin traitant. En effet, l'association d'APIRETIL® 100 mg/ml avec un autre médicament peut diminuer l'efficacité de l'un des médicaments ou exposer l'enfant à un effet indésirable. En particulier, si vous utilisez des médicaments qui contiennent dans leur composition certains des principes actifs suivants, puisqu'il peut être nécessaire de modifier la dose ou d'interrompre le traitement de l'un d'eux :

- Antibiotiques (chloramphénicol)
- Anticoagulants oraux (acénocoumarol, warfarine)
- Contraceptifs oraux et traitements avec œstrogènes
- Antépileptiques (lamotrigine, phénobarbital et autres hydantoïnes, phénobarbital, méthylephénobarbital, primidone, carbamazépine)
- Antituberculeux (isoniazide, rifampicine)
- Barbituriques (utilisés comme inducateurs du sommeil, sédatifs et anticonvulsifs)
- Charbon actif, utilisé pour la diarrhée ou pour le traitement des gaz
- Cholestyramine (utilisé pour diminuer les taux de cholestérol sanguin)
- Médicaments utilisés pour le traitement de la goutte (probénécide et sulfipyrazone)
- Médicaments utilisés pour les spasmes ou les contractions destomac, de l'intestin et de la vessie (anticholinergiques)
- Méthoclopramide et dompéridone (utilisés pour éviter les nausées et les vomissements)
- Propanolol utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle et les modifications du rythme cardiaque (arythmie cardiaque)
- Zidovudine (utilisé dans le traitement des patients ayant contracté le virus de l'immunodéficience humaine causant le SIDA)

Ce médicament contient du paracétamol : il est nécessaire d'en tenir compte en cas de prise d'autres médicaments à base de paracétamol, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

Interaction de APIRETIL® 100 mg/ml avec les aliments et les boissons :

APIRETIL® 100 mg/ml peut être dilué avec l'eau, le lait ou les jus des fruits. L'utilisation de paracétamol chez des patients qui consomment habituellement l'alcool peut endommager le foie.

Grossesse et allaitement :

Sans objet.

Conduite et utilisation des machines :

Il n'a pas décrit aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

Informations importantes concernant certains composants d'APIRETIL® 100 mg/ml solution orale :

Ce médicament peut produire des réactions allergiques parce qu'il contient Rouge Cochenille A (E-124). Il peut provoquer l'asthme, spécialement chez les patients allergiques à l'acide acétylsalicylique.

Ce médicament peut produire des réactions allergiques (possiblement retardées) et exceptionnelles de type bronchospasme (sensation soudaine d'étouffement) parce qu'il contient du parahydroxybenzoate de méthyle sel de sodium (E-219).

### 3. COMMENT PRENDRE APIRETIL® 100 mg/ml SOLUTION ORALE ?

Suivez exactement les instructions de l'administration d'APIRETIL® 100 mg/ml solution orale indiquées par votre médecin.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des questions.

N'oubliez pas d'administrer le médicament.

Ce médicament doit être pris par voie orale. Il est destiné à être utilisé chez les enfants entre 3 et 32 kg (approximativement de 0 à 10 ans).

La dose quotidienne de paracétamol recommandée est d'environ 60 mg/kg/jour, à répartir en 4 ou 6 prises quotidienne, soit 15 mg/kg chaque 6 heures ou 10 mg/kg chaque 4 heures.