

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-593672

50530


<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule : <b>MS2</b>		Société :	
<input checked="" type="checkbox"/> Actif		<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	
Nom & Prénom : <b>GHAZALI</b>		<input type="checkbox"/> Autre : <b>Abdelhak ZAKIR</b>	
Date de naissance :			
Adresse :			
Tél. :		Total des frais engagés : ..... Dhs	

Cadre réservé au Médecin		Dr. Abdelhak ZAKIR Pédiatre N°13 Bd. Ain Taoujoute 1er étage Appt. N°1- Cesa Tél : 05.22.48.67.86 / 69 - 00.66.99.99.94 GSM : 06.01.14.45.00
Cachet du médecin :	GHAZALI MUPRAS	
Date de consultation :	/	
Nom et prénom du malade :	Age: ..... <b>Vacancier</b>	
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint
Nature de la maladie :	<input type="checkbox"/> Enfant	
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :		
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.		
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.		
Fait à : <b>21/11/2020</b>	Signature de l'adhérent(e) : <b>GHAZALI</b>	
Le : <b>21/11/2020</b>		



VOLET ADHERENT

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
17 RUE EL GHAZALI CASABLANCA	21/11/12	411,00

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES																
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.																
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.																
<b>SOINS DENTAIRES</b> 		Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient												
				INP : <input type="text"/>												
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>												
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>												
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>												
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>												
<b>O.D.F. PROTHÉSES DENTAIRES</b> 		<b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>00000000</td> <td>35533411</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>11433553</td> <td></td> </tr> </table> <p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	G	00000000	35533411	B	11433553	
H	25533412	21433552														
D	00000000	00000000														
G	00000000	35533411														
B	11433553															
		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>														
		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
		DATE DU DEVIS <input type="text"/>														
		DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>														
ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS																
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION																

**Docteur Abdelhak ZAKIR**  
**Pédiatre**

Lauréat de la Faculté de Médecine de Montpellier  
Ancien Assistant & Ancien Praticien Hospitalier  
des Hôpitaux de France  
Diplômé en Réanimation néo-Natale  
Diplômé en Médecine Foetale  
Diplômé en Rééducation Fonctionnelle Respiratoire

**الدكتور عبد الحق زكير**

إختصاصي في أمراض الطفل والرضيع  
خريج كلية الطب بمونبولي  
طبيب مساعد سابق بمستشفيات فرنسا  
مجاز في إنعاش الرضيع  
مجاز في طب الجنين  
مجاز في ترويض أمراض الجهاز التنفسي

Chalme yasmine Casablanca le 21.11.20.....

411/00 Hexaxim



PHARMACIE LES TERRASSES MARINE  
17, Rue El Ghazali  
Casablanca

Dr. Abdelhak Zakir  
Pédiatre

N°13, Bd. Aïn Taoujlate 1er étage App. N°1 - Cesa  
Tél : 05.22.43.67.66 / 06.66.99.99.94  
GSM : 06.61.14.45.00

13, Bd Aïn Taoujlate (en face Clinique BADR) Rés. ILIAS 1er Étage, App. N°1 - Bourgogne  
Casablanca - Tél: 05 22 48 67 66 - 06 66 99 99 94 - EN CAS D'URGENCE: 06 61 14 45 00

# Hexaxim

Suspension inj

Vaccin diph  
coqueluchet  
de l'hépatite  
(inactivé) et  
influenza

352 757637

Veuillez lire attentivement cette notice avant de faire toute utilisation.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la consulter à d'autres occasions.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Si votre enfant ressent un quelconque effet indésirable, informez l'infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable.

Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que l'HEXAXIM et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant qu'HEXAXIM soit administré à votre enfant ?
- Comment utiliser HEXAXIM ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver HEXAXIM ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que l'HEXAXIM et dans quel cas est-il utilisé ?

HEXAXIM (DTaP-Hib-HB) est un vaccin utilisé pour se protéger contre les maladies infectieuses.

HEXAXIM aide à protéger contre la diphtérie, le tétonis, la coqueluche, l'hépatite A, la poliomélite et les maladies

graves à Haemophilus influenzae type b. HEXAXIM peut être donné aux enfants dès l'âge de six semaines.

Le vaccin agit à manière à ce que le corps développe sa propre protection (anticorps) contre les bactéries et virus responsables des maladies suivantes :

- La diphtérie, maladie infectieuse qui commence généralement par tousser la gorge, provoquant des douleurs et un gonflement pouvant entraîner une suffocation. La bactérie responsable de la maladie produit également une toxine (poison) pouvant endommager le cœur, les reins et les nerfs.
- Le tétonis, généralement causé par la pénétration de la bactérie du tétonis par une plaie profonde. La bactérie produit une toxine (poison) qui provoque des spasmes musculaires entraînant une incapacité à respirer et un risque de suffocation.
- La coqueluche est une maladie hautement infectieuse qui touche les voies respiratoires. Elle provoque une toux très sévère susceptible de provoquer des difficultés à respirer. Cette toux ressemble au bruit que fait le coq lorsqu'il chante. La toux peut persister pendant un à deux mois, voire plus longtemps. La coqueluche peut aussi provoquer des infections des oreilles, des infections des bronches (bronchite) qui peuvent durer longtemps, des infections pulmonaires (pneumonie), des convulsions, des crises cérébrales et même le décès.

- L'hépatite B est provoquée par le virus de l'hépatite B. Elle entraîne un gonflement du foie (une inflammation). Chez certaines personnes, le virus peut subsister dans le corps pendant longtemps et il peut finir par entraîner de graves problèmes de l'foie, y compris un cancer du foie.
- La poliomélite (souvent appelée polio), causée par des virus qui affectent les nerfs. La poliomélite peut entraîner la paralysie ou la mort fatale.
- Les infections à Haemophilus influenzae type b (souvent appelé Hib), infections bactériennes graves pouvant entraîner une méningite (inflammation de l'enveloppe externe du cerveau) susceptible d'entraîner des lésions cérébrales, une surdité, une épilepsie ou rendre partiellement aveugle. L'infection peut provoquer une inflammation et un gonflement de la gorge entraînant des difficultés à avaler ou à respirer. L'infection peut boucher d'autres parties du corps comme le sang, les poumons, la peau, les os et les articulations.

## Informations importantes concernant la protection conférée

HEXAXIM aide à prévenir ces maladies uniquement si elles sont causées par les bactéries ou les virus cible par le vaccin. Votre enfant peut attraper des maladies dont les symptômes sont similaires, si elles sont dues à d'autres bactéries ou à d'autres virus.

Ce vaccin ne contient pas de bactéries vivante ou de virus vivant et ne peut pas provoquer les maladies infectieuses contre lesquelles il protège.

Ce vaccin ne protège pas contre les infections invasives dues à d'autres types d'*Haemophilus influenzae*. Il ne protège pas contre les méningites causées par d'autres micro-organismes.

HEXAXIM ne protège pas contre les infections hépatiques causées par d'autres agents pathogènes, telles que ceux de l'hépatite A, l'hépatite C, l'hépatite E.

Etant donné que les symptômes de l'hépatite B se développent lentement, il est possible qu'une infection non détectée soit présente lors de la vaccination. Dans ce cas, il se peut que le vaccin ne protège pas contre l'hépatite B.

Comme pour toute autre vaccin, HEXAXIM ne peut garantir la protection de 100 % des enfants vaccinés.

2. Quelles sont les informations à connaître avant qu'HEXAXIM ne soit administré à votre enfant ?

Pour être sûr qu'HEXAXIM convient bien à votre enfant, il est important de dire à votre médecin ou à votre infirmier/ère si l'un des cas ci-dessous s'applique à votre enfant. S'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas, demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère de vous l'expliquer.

N'utilisez jamais HEXAXIM si votre enfant :

- présente un trouble respiratoire ou un gonflement du visage (réaction anaphylactique) après l'administration d'HEXAXIM.
- a eu une réaction allergique
  - aux substances actives,

- à l'un des excipients mentionnés dans la rubrique 6.

- au glutaraldehyde, au formaldéhyde, à la néomycine, à la streptomycine ou à la polymyxine B, ces substances étant ayant le procédé de fabrication.

Précédente administration d'HEXAXIM ou d'autres vaccins contre la diphtérie, le tétonis, la coqueluche,

l'hépatite B ou vaccins HIB.

Une réaction grave touchant le cerveau (encéphalopathie) dans les 7 jours suivant une précédente dose d'une dose de vaccin coqueluchéen (cellulaire ou à germes entiers).

ou non contrôlée ou une maladie grave touchant le cerveau (troubles neurologiques non contrôlés) ou

épilepsie non contrôlée.

Si vous avez des questions, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère si votre enfant :

• température modérée ou élevée ou une maladie aiguë (par ex., fièvre, mal de gorge, toux, rhume ou

• possible que la vaccination par HEXAXIM depuis être rapportée jusqu'à ce que votre enfant se sente mieux.

• l'un des événements suivants : fièvre, maladie grave touchant le cerveau, la décision

• autres doses de vaccin contenant la valence coqueluchéenne devra être évaluée soigneusement.

• une attaque brutale avec chute de la pression artérielle) ou état évitant un état de choc avec épisode

hypotensif (baisse de tonus) dans les 48 heures suivant la vaccination.

• états, inconsolables, pendant une durée de trois heures ou plus, survenant dans les 48 heures après la

• avec ou sans fièvre, survient dans les trois jours après la vaccination.

Précédemment un syndrome de Guillain-Barré (inflammation temporaire des nerfs provoquant une douleur, une paralysie et des troubles de la sensibilité) ou une neuropathie du plexus brachial (douleur sévère et réduction de la mobilité du bras et de l'épaule) après avoir reçu un vaccin contenant de l'anatoxine tétaïnique (une forme inactive de la toxine tétaïnique), dans ce cas, la décision d'administrer de nouveau un vaccin contenant de l'anatoxine tétaïnique devra être évaluée par votre médecin.

• suit actuellement un traitement qui supprime son système immunitaire (les défenses naturelles du corps) ou si votre enfant souffre d'une maladie qui affaiblit son système immunitaire. Dans ces cas la réponse immunitaire vis-à-vis du vaccin peut être diminuée. Il est alors recommandé d'attendre la fin du traitement ou de la maladie pour vacciner. Les enfants présentant une immunodéficience de longue durée, telle qu'une infection par le VIH (SIDA) peuvent toujours recevoir HEXAXIM même si la protection dont ils bénéficient peut ne pas être aussi bonne que celle observée chez les enfants dont le système immunitaire est normal.

• souffre d'une maladie qui affaiblit son système immunitaire à fonctionner correctement.

• souffre d'une maladie du cœur non diagnostiquée ou d'une épilepsie non contrôlée. Votre médecin évaluera le bénéfice potentiel d'une vaccination

a, après des blessures mineures, des problèmes sanguins, provoquant facilement des bleus et des saignements qui durent longtemps. Votre médecin vous dira si c'est souhaitable que votre enfant reçoive HEXAXIM.

Autres médicaments ou vaccins et HEXAXIM

Informez votre médecin ou infirmier/ère si votre enfant prend, a récemment pris ou pourrait prendre d'autres médicaments ou vaccins.

HEXAXIM peut être administré en même temps que d'autres vaccins, tels que les vaccins pneumocoques polyvalents conjugués, vaccins rougeole-oreille-rubéole, vaccins rotavirus ou les vaccins méningocoques.

Lorsqu'il est administré en même temps que d'autres vaccins, HEXAXIM sera admis à des sites d'injection différents.

3. Comment utiliser HEXAXIM ?

HEXAXIM sera administré à votre enfant par un médecin ou infirmier/ère formés à l'utilisation des vaccins et équipés pour la prise en charge des cas peu fréquents, de réaction allergique grave survenant après l'injection [voir rubrique 4 - Effets indésirables éventuels].

HEXAXIM sera administré en injection dans un muscle [voie intramusculaire (IM) du haut de la cuisse ou du bras de votre enfant]. Le vaccin ne sera jamais administré dans un vane sanguin ou sous la peau.

Le schéma posologique est le suivant :

Première série de vaccinations (primovaccination)

Votre enfant recevra soit deux injections espacées de deux mois, soit trois injections espacées d'un à deux mois (intervalle d'au moins 4 semaines entre chaque injection). Ce vaccin doit être utilisé conformément au calendrier de vaccination local.

Injections supplémentaires (rapel).

Après la première série de vaccinations, votre enfant devra recevoir une dose de rappel, conformément à la réglementation locale en vigueur, au moins 6 mois après la dernière dose de la série. Votre médecin vous dira quand cette dose devra être administrée.

Si vous oubliez une dose d'HEXAXIM

Si votre enfant manque une injection prévue, il est important que vous en discutiez avec votre médecin ou infirmier/ère. Il (le) décidera du moment auquel la dose manquée doit être administrée.

Il est important de suivre les instructions du médecin ou de l'infirmier/ère afin que votre enfant termine sa série d'injections. Dans le cas contraire, il risque de ne pas être complètement protégé contre les maladies.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce vaccin, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce vaccin peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Réactions allergiques graves (réaction anaphylactique)

Si l'un de ces symptômes survient alors que votre enfant a déjà quitté l'endroit où il a reçu son injection, vous devez IMMÉDIATEMENT consulter un médecin :

- une difficulté à respirer
- une coloration bleue de la langue ou des lèvres
- une éruption cutanée
- un gonflement du visage ou du cou
- un malaise soudain et grave avec une baisse de la pression artérielle entraînant des sensations vertigineuses et perte de conscience, accélération du rythme cardiaque associée à des troubles respiratoires.

Lorsque ces signes ou symptômes (signes ou symptômes) apparaissent rapidement après l'injection et/ou à des relations allergiques graves, bien que vaccin.

## Autres effets indésirables

Si votre enfant présente l'un des effets indésirables ou votre pharmacien.

• Effets indésirables très fréquents (pouvant

• perte d'appétit (anorexie)

• pluies

• somnolence

• douleur, rougeur ou gonflement au site

• irritation

• fièvre (température de 38°C ou plus)

• Effets indésirables fréquents (pouvant

• pleurs anormaux (pleurs prolongés)

• diarrhée

• durcissement au site d'injection (induré)

• Effets indésirables peu fréquents (pouvan

• réaction allergique

• boule (nodule) au site d'injection

• forte fièvre (39,6°C ou plus)

• Effets indésirables rares (peuvent tou

• jeter aux articulations de la cheville, de la

• vaccination et peuvent être douloureux

• d'jection. Elles disparaissent en 1 à 3 mois.

• Convulsions avec ou sans fièvre

• Périodes prolongées lorsquelles votre enfant

• épisodes d'hypotonie-hypertonie.

Effets indésirables potentiels

D'autres effets indésirables, non mentionnés à la diphtérie, le tétonis, la coqueluche, la poliomélite.

• Une inflammation temporaire des nerfs (Guillain-Barré) ou une douleur sévère et récurrente (polyradiculonévrite, une paralysie faciale droite, une maladie inflammatoire du bras ou du bras (polyradiculonévrite), une paralysie faciale droite, une sciatique en plaques) ont été rapportées jusqu'à l'admission.

• Une inflammation de plusieurs nerfs (polyradiculonévrite), une paralysie faciale droite, une sciatique en plaques) ont été rapportées jusqu'à l'admission.

• Un gonflement ou une inflammation du cœur ou des poumons (œdème pulmonaire).

• Chez les nouveau-nés grands prématurés, surviennent à 2-3 fois plus après la vaccination.

Confirment l'efficacité des deux pieds ou le bras (vaccin) de la partie inférieure ou de la partie supérieure, suivant l'application de la partie inférieure ou de la partie supérieure, suivant généralement après les premières doses de l'antécédent de la vaccination.

Haemophilus influenzae type b. Si cette réaction survient la vaccination. Les symptômes de

## Déclaration des effets secondaires

Si votre enfant ressent un quelconque effet indésirable, veillez à appeler votre pharmacien ou infirmier/ère tout de suite.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.

Ne pas utiliser et vaccin après la pose de peinture ou de colle.