

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

tions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

ladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5565

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : SABER NADIA N° EL M. EL BOUT

Date de naissance : 01/02/65

Adresse : 9, Rue Clemenceau n° 3 Rue I. B. L. Casablanca

Tél. : 06 42 14 15 54 Total des frais engagés : 1309,20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur BENNANI Mohamed
Cardiologue Interventionnel
Rythmologue
22 RUE DES HOPITAUX, 1er
Tél. 05 22 20 45 45

MUPRAS

19 DEC. 2020

ACCUEIL

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21.01.2020	visite		700	
22.01.2020	HAFTER ECG		4000	Docteur BENNANI Nourredine logue Interventionnel arthroscopique poloiz, 1er Etage 49 14 14 BENNANI

EXECUTION DES ORDONNANCES.

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AIDA Mme. BENOUNA BENZAKOUR Hayat 196, Bd. Zerktouni - Casablanca Tél.: 05 22 26 32 53-Fax: 05 22 29 36 61	22 Oct 2020	761,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DÉBUT D'EXÉCUTION
				FIN D'EXÉCUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)

ctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

A diagram of a dental arch (maxilla) with 28 numbered teeth. The teeth are arranged in four quadrants: upper right (1-4), upper left (5-8), lower left (9-12), and lower right (13-16). A coordinate system is overlaid on the arch, with the vertical axis labeled 'H' at the top, the horizontal axis labeled 'D' on the left, and the diagonal axis labeled 'B' at the bottom right. The teeth are represented by small circles with numbers, and the arch is shown in a perspective view.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



CABINET DE CONSULTATION ET D'EXPLORATION CARDIOVASCULAIRE ET RYTHMOLOGIQUE

Dr. Mohamed BENNANI

Diplômé en Cardiologie de la
Faculté de Médecine de
Casablanca

Diplômé en Échocardiographie
de la Faculté de Médecine de
Bordeaux, France

Diplômé en Rythmologie
et Stimulation Cardiaque
de la Faculté de Médecine de
Montpellier, France

Diplômé en Cardiologie
Interventionnelle de la Faculté
de Médecine de Montpellier,
France

PHARMACIE AIDA
Mme. BENOUA BENZAKOUR Hayat
196, Bd. Zerktouni - Casablanca
Tél.: 05 22 26 32 53-Fax: 05 22 29 36 61
ICE : 001754606000050

$$T = 761.10$$

Traitement à ne pas interrompre et à continuer jusqu'à la prochaine visite. En cas d'uraence, partir directement à la clinique

40, Angle Rue des Hôpitaux et Rue Dubreuil, 1^{ère} étage, App N°1 - Quartier des Hôpitaux (en face du pavillon 28) - Casablanca
Tél. : 0522 49 14 14 - Fax : 0522 49 22 22 - (Urgences) GSM : 06 62 80 57 57 - E-mail: smbennani@yahoo.fr

Sur Rendez-vous



CABINET DE CONSULTATION ET D'EXPLOITATION
CARDIOVASCULAIRE ET RYTHMOLOGIQUE

22 OCT. 2020
Casablanca le :

Dr. Mohamed BENNANI

Diplôme en Cardiologie de la
Faculté de Médecine de
Casablanca

Diplôme en Echocardiologie
de la Faculté de Médecine de
Bordeaux, France

Diplôme en Rythmologie et
Stimulation Cardiaque
de la Faculté de Médecine de
Montpellier, France

Diplôme en Cardiologie
interventionnelle de la Faculté
de Médecine de Montpellier,
France

Note D'honoraire
Saber Nader

LE DOCTEUR BENNANI MOHAMED

Vous remercie de votre confiance et

Vous adresse la note D'honoraire de :

Correspondant à :

300 -

Consultation

ECG

Réglage du Pacemaker

Echocardiographie Doppler

EchoDoppler TSA

Holter TA

Holter ECG

4000 -

Epreuve d'effort

Autre :

22.10.2020
Dr. BENNANI Mohamed
Cardiologue Interventionnel
Rythmologue
40, Rue des Hôpitaux, 1er Etage
Tél : 0522 49 22 22 - (Urgences) GSM : 06 62 80 57 57 - E-mail : smbennani@yahoo.fr

Traitements à ne pas interrompre et à continuer jusqu'à la prochaine visite. En cas d'urgence, partir directement à la clinique

40, Angle Rue des hôpitaux et Rue Dubreuil, 1ère étage, Appt N°1 - quartier des hôpitaux (en face du pavillon 28) - Casablanca
Tél : 0522 49 22 22 - (Urgences) GSM : 06 62 80 57 57 - E-mail : smbennani@yahoo.fr

SULIAT®

80 mg/5 mg

160 mg/5 mg

160 mg/10 mg

Comprimés pelliculés, boîtes de 14, 28
Valsartan / Amlodipine

501319 8

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle pour vous.

- Garder cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été prescrit par votre pharmacien. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

Quel content de cette notice :

- 1- Qui est ce que SULIAT® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
- 3- Comment prendre SULIAT® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver SULIAT® ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Code ATC : C09B01

Tous les comprimés de SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

- L'Amlodipine appartient à la classe des « inhibiteurs calciques ».

- Le Valsartan appartient à la classe des « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins, avec pour conséquence une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II. Cela signifie que ces deux substances contribuent à empêcher le rétrécissement des vaisseaux sanguins. De ce fait, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT® est utilisé pour traiter la tension artérielle élevée (hypertension), chez les patients adultes dont la tension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée soit par l'amlopipine soit par le valsartan, chacun administré seul.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre - indications :

Ne prenez **jamais** SULIAT®, comprimés pelliculés dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au valsartan, à l'amlopipine, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.
- Si vous avez de graves problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires, tels que cirrhose biliaire ou cholestase.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT® en début de grossesse.
- Si vous présentez une basse sévérité de la pression artérielle (hypotension sévère).
- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
- Si vous présentez un diabète ou une insuffisance rénale ($DG < 60 \text{ ml}/\text{min}/1,73 \text{ m}^2$) et vous avez l'association de SULIAT® des médicaments contenant de l'olmesartane.
- Si vous présentez un choc, y compris choc cardiogénique (une affection cardiaque qui entraîne une diminution importante de l'apport sanguin au cœur).
- Si vous présentez une obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, cardiopathie hypertrophique obstrutive et sténose coronaire de degré élevé).
- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après un infarctus aigu du myocarde.

Si vous êtes dans l'une des situations ci-dessous, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec SULIAT® dans les cas suivants :

- Si vous êtes malade (vomissements ou diarrhée).
- Si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux.
- Si vous avez un rétrécissement de l'artère rénale unilatérale ou bilatérale ou une sténose artérielle sur rein unique.
- Si vous avez une affection touchant les glandes surrenales qui s'appelle « hyperaldostéronisme primaire ».
- Si vous avez une insuffisance cardiaque ou un post infarctus. Votre médecin doit évaluer votre fonction rénale.
- Si votre médecin vous a informé que vous avez un rétrécissement des valves du cœur (appelé « sténose coronaire ou mitrale ») ou que l'épaisseur de votre muscle cardiaque est augmentée de manière anormale (ce qui est appelé « cardiopathie hypertrophique obstrutive »).
- Si vous avez eu une grêve de main (ce qui est appelé « syndrome de l'artère coronaire droite »).
- Si vous avez une grossesse ou une période d'allaitement ($DG < 30 \text{ ml}/\text{min}/1,73 \text{ m}^2$) et si vous êtes sous dialyse.
- Si vous avez des problèmes cardiaques, en particulier du visage et de la gorge, lors de la prise d'autres médicaments (y compris les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine). Ces symptômes surviennent, prendre de préférence SULIAT® et contactez votre médecin immédiatement. Vous ne devez jamais reprendre SULIAT®.
- Si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :
 - Un « inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) » (par exemple enlopip, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux dus à un diabète. - Aliskiren.
 - Votre médecin pourra régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression artérielle, et le taux des électrolytes (par ex. du potassium) dans votre sang.
- Enfants et adolescents : L'utilisation de l'association valsartan/amlopipine n'est pas recommandée chez l'enfant et chez l'adolescent (âgés de moins de 18 ans).

Interactions avec d'autres médicaments :

- Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Votre médecin pourrait avoir besoin de modifier la dose de vos médicaments et/ou prendre d'autres précautions. Il se peut, dans certains cas, que vous deviez arrêter l'un de ces médicaments. Ceci est d'autant plus important si vous utilisez l'un des médicaments énumérés ci-dessous :
- La litiaïne (Médicament utilisé pour traiter certains types de dépression).
 - Diurétiques (type de médicament qui augmente la quantité d'urine que vous produisez) ;
 - Diurétiques dépourvus de potassium, suppléments potassiques, substituts du sel contenant du potassium et autres substances susceptibles d'augmenter les taux de potassium.
 - Trinitrine, nitroglycérine et autres nitrates ou autres substances appelées « vasodilatateurs »
 - Médicaments utilisés pour traiter des myoses (ex: atropine, scopolamine).
 - Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase-2, acide acétylsalicylique (>3g/jour) et AINS non sélectifs. Votre médecin peut vérifier votre fonction rénale.
 - Médicaments anticonvulsifs (ex: carbamazépine, phénobarbital, phénopyridine, fosfophénopyridine, primidone).
 - Médicaments utilisés dans le HIV/AIDS (ex: ritonavir).
 - Médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes (tels que rifampicine, érythromycine, clarithromycine).
 - Propofol, éfizipip (médicaments à visée cardiological)
 - Sotalol (médicament utilisé pour contrôler les taux élevés de cholestérol).
 - Dométoside (pour prévenir les crises graves de température corporelle).
 - Médicaments utilisés en prévention du rejet de greffe (cyclosporine).

Interactions avec les aliments et les boissons :

Le pamplemousse ou le jus de pamplemousse ne doivent pas être consommés par les personnes à qui SULIAT® a été prescrit. Ceci est dû au fait que le pamplemousse et le jus de pamplemousse peuvent conduire à une augmentation des taux sanguins de la substance active Amlodipine, pouvant induire une augmentation imprévue de l'effet hypotenseur de SULIAT®.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Extrait de millerupt.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Grossesse :
Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre SULIAT® avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de SULIAT®.

SULIAT® est déconseillé en début de grossesse, et il ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant s'il est utilisé après le troisième mois de grossesse.

Allaitement :

Il n'est pas recommandé d'allaiter si vous êtes enceinte ou si vous êtes allaitante. SULIAT® est déconseillé chez les femmes qui allaitent et votre médecin pourra choisir

3- COMMENT PRENDRE SULIAT® ?

usage
Prenez ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

• Il est recommandé de prendre SULIAT® une fois par jour.

</div

SULIAT®

80 mg/5 mg

160 mg/5 mg

160 mg/10 mg

Comprimés pelliculés, boîtes de 14, 28
Valsartan / Amlodipine

501319 8

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle pour vous.

- Garder cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été prescrit par votre pharmacien. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

Quel content de cette notice :

- 1- Qui est ce que SULIAT® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
- 3- Comment prendre SULIAT® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver SULIAT® ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Code ATC : C09B01

Tous les comprimés de SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

- L'Amlodipine appartient à la classe des « inhibiteurs calciques ».

- Le Valsartan appartient à la classe des « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins, avec pour conséquence une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II. Cela signifie que ces deux substances contribuent à empêcher le rétrécissement des vaisseaux sanguins. De ce fait, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT® est utilisé pour traiter la tension artérielle élevée (hypertension), chez les patients adultes dont la tension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée soit par l'amlopipine soit par le valsartan, chacun administré seul.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre - indications :

Ne prenez **jamais** SULIAT®, comprimés pelliculés dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au valsartan, à l'amlopipine, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.
- Si vous avez de graves problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires, tels que cirrhose biliaire ou cholestase.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT® en début de grossesse.
- Si vous présentez une basse sévérité de la pression artérielle (hypotension sévère).
- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
- Si vous présentez un diabète ou une insuffisance rénale ($DG < 60 \text{ ml}/\text{min}/1,73 \text{ m}^2$) et vous avez l'association de SULIAT® des médicaments contenant de l'olmesartane.
- Si vous présentez un choc, y compris choc cardiogénique (une affection cardiaque qui entraîne une diminution importante de l'apport sanguin au cœur).
- Si vous présentez une obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, cardiopathie hypertrophique obstrutive et sténose coronaire de degré élevé).
- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après un infarctus aigu du myocarde.

Si vous êtes dans l'une des situations ci-dessous, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec SULIAT® dans les cas suivants :

- Si vous êtes malade (vomissements ou diarrhée).
- Si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux.
- Si vous avez un rétrécissement de l'artère rénale unilatérale ou bilatérale ou une sténose artérielle sur rein unique.
- Si vous avez une affection touchant les glandes surrenales qui s'appelle « hyperaldostéronisme primaire ».
- Si vous avez une insuffisance cardiaque ou un post infarctus. Votre médecin doit évaluer votre fonction rénale.
- Si votre médecin vous a informé que vous avez un rétrécissement des valves du cœur (appelé « sténose coronaire ou mitrale ») ou que l'épaisseur de votre muscle cardiaque est augmentée de manière anormale (ce qui est appelé « cardiopathie hypertrophique obstrutive »).
- Si vous avez eu une grêve de main (ce qui est également appelé « crise d'angine de poitrine »).
- Si vous avez une grossesse dans les derniers mois ($DG < 30 \text{ ml}/\text{min}/1,73 \text{ m}^2$) et si vous êtes sous dialyse.
- Si vous avez des problèmes cardiaques, en particulier du visage et de la gorge, lors de la prise d'autres médicaments (y compris les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine). Ces symptômes surviennent, prendre de préférence SULIAT® et contactez votre médecin immédiatement. Vous ne devez jamais reprendre SULIAT®.
- Si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :
 - Un « inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) » (par exemple enlopip, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux dus à un diabète. - Aliskiren.
 - Votre médecin pourra régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression artérielle, et le taux des électrolytes (par ex. du potassium) dans votre sang.
- Enfants et adolescents : L'utilisation de l'association valsartan/amlopipine n'est pas recommandée chez l'enfant et chez l'adolescent (âgés de moins de 18 ans).

Interactions avec d'autres médicaments :

- Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Votre médecin pourrait avoir besoin de modifier la dose de vos médicaments et/ou prendre d'autres précautions. Il se peut, dans certains cas, que vous deviez arrêter l'un de ces médicaments. Ceci est d'autant plus important si vous utilisez l'un des médicaments énumérés ci-dessous :
- La litiaïne (Médicament utilisé pour traiter certains types de dépression).
 - Diurétiques (type de médicament qui augmente la quantité d'urine que vous produisez) ;
 - Diurétiques dépourvus de potassium, suppléments potassiques, substituts du sel contenant du potassium et autres substances susceptibles d'augmenter les taux de potassium.
 - Trinitrine, nitroglycérine et autres nitrates ou autres substances appelées « vasodilatateurs »
 - Médicaments utilisés pour traiter des myoses (ex: atropine, scopolamine).
 - Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) qui empêchent les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase-2, acide acétylsalicylique (>3g/jour) et AINS non sélectifs. Votre médecin peut vérifier votre fonction rénale.
 - Médicaments anticonvulsifs (ex: carbamazépine, phénobarbital, phénopyridine, fosfophénopyridine, primidone).
 - Médicaments utilisés dans le HIV/AIDS (ex: ritonavir).
 - Médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes (tels que rifampicine, érythromycine, clarithromycine).
 - Propofol, éfizipip (médicaments à visée cardiological)
 - Sotalol (médicament utilisé pour contrôler les taux élevés de cholestérol).
 - Dométoside (pour empêcher les réactions graves de température corporelle).
 - Médicaments utilisés en prévention du rejet de greffe (cyclosporine).

Interactions avec les aliments et les boissons :

Le pamplemousse ou le jus de pamplemousse ne doivent pas être consommés par les personnes à qui SULIAT® a été prescrit. Ceci est dû au fait que le pamplemousse et le jus de pamplemousse peuvent conduire à une augmentation des taux sanguins de la substance active Amlodipine, pouvant induire une augmentation imprévue de l'effet hypotenseur de SULIAT®.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Extrait de milliporelle.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Grossesse :
Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre SULIAT® avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de SULIAT®.

SULIAT® est déconseillé en début de grossesse, et il ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant s'il est utilisé après le troisième mois de grossesse.

Allaitement :

Il n'est pas recommandé d'allaiter si vous êtes enceinte ou si vous avez des effets de la notice de SULIAT®.

3- COMMENT CONSERVER SULIAT® ?

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

