

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

tions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Nº P19- 059578

50570

Autres

Maladie

Dentaire

Optique

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2466

Société : ROYAL AIR MAROC

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom : Mme SOUSSISaïda

Date de naissance : 1954 à CASABLANCA

Adresse : 30, Rue Ain oulmes, Le Koya EL JARRAH, Bougogne

Tél. : 0668971004

Total des frais engagés : 657,44 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr Hassen BERRADA
Gynécologue et Obstétricien
150, Bd de Ben Youssef
Tél. 0522 49 13 78 - Casablanca

Date de consultation : 05/11/2020

Nom et prénom du malade : IHYADEN

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Affection Gynécologique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à CASABLANCA

Signature de l'adhérent(e) : 

Le : 09/12/2020

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05-MAI-2020	CS	1	300	Dr HAY Gynéco Tél: 0522 49 12 78 Casablanca

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DU PHARE ICE - 0522 97600039 16, Avenue du Phare - CASABLANCA Tel: 0522 26 68 19 - Fax: 0522 48 20 01	11/12/20	357,30

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				<input type="text"/>
<img alt="Diagram of upper and lower dental arches with				

عيادة طبية لأمراض النساء والتوليد

CABINET MEDICAL DE GYNECOLOGIE - OBSTETRIQUE

Docteur Hassan BERRADA

Spécialiste en

Gynécologie - Obstétrique

Ancien Assistant aux Hôpitaux de
PLEVEIN et de NANCY

- Accouchement • Stérilité du couple
- Maladie des Seins • Gynécologie de l'enfant et de l'Adolescente • Fécondation invitro
- Chirurgie Mammaire et Gynécologique
- Ménopause • Echographie
- Colposcopie • Coelioscopie



الدكتور حسان براة

اختصاصي في

الولادة والحمل وأمراض النساء

- ملحق سابق بمستشفيات بليفان ونانتسي
- الولادة • عقم الزوجين • أمراض الثدي
 - أمراض الجهاز التناسلي للطفلة أو المراهقة
 - جراحة الثدي والجراحة النسوية
 - ما بعد سن الإنجاب • الفحص بالصدى
 - الفحص والجراحة بالجهاز

Casablanca, Le : 05- NOV- 2020 الدار البيضاء في

M: IHYADEN Zineb



Duphasit 10 mg Arop 2 boites

1cp/j pdt 10j

114,50 leuros produit 1cp/j pdt 10j du 16- des regls

Properi od 1cp/j

32,40

Difthal 100 suppo 1/102.



PHARMACIE DU PHARE
TÉL : 0522 309700 0030
76, Avenue du Phare - CASABLANCA
Tél : 0522 26 68 19 - Fax : 0522 48 22 02

3; avant les regls
et 3; pdt les regls

83,00 Nospa cp

1cp3x/

Family solut 1-500mg

1-500mg

150. شارع بوركون بقامة فراس جاسم (قرب إتصالات المغرب بوركون) - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 49 13 78

150, Bd.Bourgogne - Résidence FIRAS JASSIM (Prés de Maroc Telecom Bourgogne) - Casablanca - Tel: 05 22 49 13 78

URGENCES : 06 67 46 21 24 - المستعجلات : Email : berradahassan2013@gmail.com - Site : www.gynecologue.ma

Horaire du Cabinet : 9h à 17h (Horaire continu)

Dr Hassan BERRADA
Obstetrician
Casablanca
Tel : 0522 48 22 02
150, Bd Bourgogne
Email : berradahassan2013@gmail.com

PROPERIOD®

Vitex Agnus-Castus 12mg

PROPERIOD®
Vitex Agnus-Castus 12mg

A consommer de préférence

avant fin :

114,50 DH

Lot n° :

Lot:C200490

Per:02-2023

PROPERIOD® | C

À base d'extrait de Vitex Agnus-Castus

- Aide à réguler les règles difficiles.

COMPOSITION PAR 1 COMPRIMÉ

Extrait de vitex agnus-castus (15 :1) 12mg

Excipients : cellulose microcristalline, lactose, croscarmellose de sodium, talc, stéarate de magnésium et dioxyde de silice.

Sans Hormones - Sans Soja

CONSEILS D'UTILISATION

• Troubles liés au syndrome prémenstruel tels que céphalées, problèmes cutanés, sentiment de légère tension dans les seins, troubles dans le bas-ventre, humeur instable, irritabilité, tension nerveuse, baisse de l'humeur, fatigue et troubles du sommeil.

• Troubles du cycle menstruel.

- 1 comprimé 1 fois par jour à prendre avec un grand verre d'eau (matin ou soir, de préférence toujours au même moment de la journée).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée
- Conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière et d'humidité

PRÉSENTATIONS

Boîtes de 30 et de 90 comprimés sous blisters.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié.
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE, CE N'EST PAS UN MÉDICAMENT

Sans Hormones • Sans Soja

Fabriqué par **ISIO LABORATOIRES**, Z.I. Dar Bouazza lot°104-20220-Casablanca-Maroc

Distribué par **ESNAPHARM**, 7 rue abdelmajid benjelloun Maarif extension-Casablanca-Maroc

DIFAL®

Diclofénac de sodium

DIFAL®
Diclofénac sodique 100 mg
Boîte de 10 Suppositoires

P.P.V. : 32,40 DH



6 118000 190363

Boîte de 10

Formes	Composition	
DIFAL® 25 mg DIFAL® 50 mg Comprimés gastro-résistants	Diclofenac sodique 25 mg / 50 mg amidon de maïs, cellulose microcristalline, liant PVP30, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, dioxyde de silice colloidal qsp 1 comprimé GR. Excipients à effet notoire : lactose – colorant jaune orangé S	
DIFAL® 25 mg / 100 mg Suppositoires	Diclofenac sodique 25 mg / 100 mg lactose, aérosil, glycérides hémisynthétiques qsp 1 suppositoire.	Boîte de 10
DIFAL® 75 mg Injectable Solution injectable IM 75 mg / 3 ml	Diclofenac sodique 75 mg Excipients qsp 1 ampoule injectable IM de 3 ml Excipients à effets notoire : sodium métabisulfite – propylène glycol, alcool benzyllique.	Boîtes de 2/5 ampoules de 3 ml

PROPRIETES :

Le diclofénac est un composé non stéroïdien possédant des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et antipyrétiques, agissant par inhibition de la synthèse des prostaglandines.

INDICATIONS :

Elles procèdent de l'activité anti-inflammatoire du diclofénac, de l'importance des manifestations d'intolérance auxquelles le médicament donne lieu et de sa place dans l'éventail des produits anti-inflammatoires actuellement disponibles.

Elles sont limitées au traitement symptomatique des affections suivantes :

- **Rhumatismes inflammatoires chez les enfants** : suppositoire à 25 mg (enfant > 16 kg, soit environ 4 ans), comprimé à 25 mg (enfant ≥ 6 ans) et comprimé à 50 mg (enfant à partir de 35 kg, soit environ 12 ans).

Pour les adultes et enfants à partir de 15 ans (comprimés à 25 mg et à 50 mg, suppositoire à 100 mg) :

- **Traitements symptomatiques au long cours des rhumatismes inflammatoires chroniques et de certaines arthroses douloureuses et invalidantes** : notamment polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante ou syndromes apparentés, tels que le syndrome de Fießinger-Leroy-Reiter, et rhumatisme psoriasique.

- **Traitements symptomatiques de courte durée des poussées aiguës des rhumatismes abarticulaires** (épaules douloureuses aiguës, tendinites, bursites), arthrites microcristallines, arthroses, lombalgies, radiculalgies sévères.

- **Traitements des dysménorrhées essentielles, après bilan étiologique.**

- **Solution injectable à 75 mg/3 ml** : traitement symptomatique de courte durée des rhumatismes inflammatoires en poussée, lombalgies aiguës, radiculalgies, crises de coliques néphrétiques.

CONTRE-INDICATIONS :

- DIFAL® (toutes formes) est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 12 mois ;
- Enfants de moins de 6 ans pour les formes : comprimé 25 mg, 50 mg, suppositoire 100 mg et injectable 75 mg ;
- Enfant de moins de 16 kg : suppositoire à 25 mg, en raison du dosage inadapté ;
- Enfant de moins de 35 kg : comprimé à 50 mg, en raison du dosage inadapté ;
- Enfants de moins de 15 ans : suppositoire 100 mg et injectable 75 mg ;
- Antécédents d'hémorragie ou de perforation digestive au cours d'un précédent traitement par AINS ;
- Hypersensibilité au diclofénac ou à l'un des composants ;
- Grossesse : dès le 5ème mois ;
- Insuffisance hépatocellulaire sévère ;
- Insuffisance rénale sévère ;
- Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée ;
- Ulcère gastrique ou duodénal évolutif ;
- Antécédent d'asthme ou d'urticaire suite à la prise d'acide acétylsalicylique ou d'autres médicaments anti-inflammatoires ;
- Antécédents récents de rectites ou de rectorragies (pour les suppositoires à 25 mg et à 100 mg) ;
- Contre-indication liée à la voie intramusculaire solution injectable à 75 mg/3 ml : troubles de l'hémostase ou traitement anticoagulant en cours.
- Chez les prématurés et nouveau-nés à terme, en raison de la présence d'acide benzyllique.

En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Respecter la prescription médicale.

ENFANT à partir de 12 mois : 2 à 3 mg/kg/jour, à répartir en 2 ou 3 prises, soit à titre indicatif

: DIFAL® 25 mg suppositoire (enfant de 16 à 35 kg) 1 suppositoire à 25 mg, 2 à 3 fois par jour.

ENFANT à partir de 6 ans (en raison du risque de fausse route) : DIFAL® 25 mg et 50 mg

No-Spa® 40mg

Chlorhydrate de
Comprimé

Veuillez lire at-
teindre ce médi-
comprimé impo.

10:
01:
199001
022

NO - SPA 40MG
CP 820

P.P.V : 32DH00



Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours.

1. Qu'est-ce que No-Spa 40 mg comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?

No-Spa 40 mg comprimé est un antispasmodique. Il peut être utilisé dans les situations suivantes :

Spasmes des muscles lisses associés à des troubles d'origine biliaire : calcul biliaire, inflammation de la vésicule biliaire ou des voies biliaires.

Spasmes des muscles lisses associés à des troubles d'origine urinaire : calcul urinaire (dans les reins ou les uretères), pyélique (inflammation du bassinet), cystite (inflammation de la vessie), ténèseme vésical (tension douloureuse de la vessie avec sensation de brûlure et envie continue d'uriner).

Traitement d'appoint des troubles suivants :

- spasmes des muscles lisses associés à des troubles d'origine digestive : ulcère gastrique (de l'estomac) ou ulcère duodénal (du duodénum), inflammation de la muqueuse gastrique, spasmes du sphincter (anneau musculaire) du cardia ou du pylore (orifice supérieur ou inférieur de l'estomac), inflammation de l'intestin grêle ou du gros intestin ;
- affections gynécologiques : règles douloureuses ou crampes menstruelles.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre No-Spa 40 mg comprimé ?

Ne prenez jamais No-Spa 40 mg comprimé

• si vous êtes allergique à la drotavérine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique informations supplémentaires).

• si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

Faites attention avec No-Spa 40 mg comprimé :

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre No-Spa 40 mg comprimé.

Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une tension artérielle basse (hypotension).

Utilisation d'autres médicaments

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. L'utilisation simultanée de la drotavérine et de la lévodopa entraîne une diminution de l'effet de la lévodopa, à savoir l'atténuation des symptômes de la maladie de Parkinson, ainsi qu'une accentuation de la rigidité des muscles squelettiques et des tremblements.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Les études effectuées chez l'animal gravide et celles réalisées chez la femme enceinte n'ont pas mis en évidence d'effet délétère pour le foetus ou pour la mère. Si vous êtes enceinte, votre médecin déterminera si l'utilisation de ce médicament est pertinente pour vous.

Allaitement

En l'absence de données cliniques suffisantes, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée durant l'allaitement.

Fertilité

Aucune donnée n'est disponible concernant un éventuel effet sur la fertilité chez l'homme.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'administration de No-Spa 40 mg comprimé aux posologies habituelles n'a pas d'effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Cependant, en cas d'apparition de vertiges suite à la prise d'un comprimé, les activités en environnement à risque, ainsi que la conduite de véhicules et l'utilisation de machines, sont à éviter.

No-Spa 40 mg comprimé contient du lactose

Si votre médecin vous a prévenu que vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

3. Comment prendre No-Spa 40 mg comprimé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou de votre pharmacien.. Vérifiez auprès de

Duphaston®

10 mg, comprimé pelliculé

Dydrogestérone

Veuillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations

- Gardez cette notice. Vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, consultez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit pour une ou plusieurs personnes. Il pourrait leur maladie être identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que Duphaston 10 mg est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations sur ce médicament ?
 3. Comment prendre ce médicament ?
 4. Quels sont les effets indésirables ?
 5. Comment conserver ce médicament ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.
- 1. Qu'est-ce que Duphaston 10 mg comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?**

Duphaston contient l'ingrédient actif hydrogestérone. La hydrogestérone est une hormone progestagène féminine. Les hormones progestagénines ont le même effet que la progestérone naturelle. Elle régule avec les hormones oestrogénines le cycle menstruel.

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé est utilisé : - Pour les problèmes que vous pourriez avoir lorsque votre corps ne produit pas suffisamment de progestérone :

- contrôler le cycle menstruel irrégulier ;
- croissance de muqueuse utérine en dehors de l'utérus (endométriose) ;
- menstruations douloureuses ;
- infertilité due à un faible niveau de progestérone ;
- soutien de la phase lutéale dans le cadre des cycles induits pendant les traitements de fertilité.
- limiter le risque d'une menace de fausse couche ou si vous avez eu des fausses couches à répétition.

- Thérapie hormonale de substitution (THS)

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé est également utilisé en combinaison avec des œstrogènes :

- afin d'éviter des anomalies de la muqueuse de l'utérus pendant le traitement des symptômes de la ménopause ;
- si vous avez cessé d'avoir des périodes avant la ménopause ;
- pour des périodes exceptionnellement abondantes et / ou irrégulières.

Votre corps équilibre normalement la quantité d'hormones naturelles de progestérone et d'œstrogène (l'autre hormone féminine). Si votre corps ne produit pas suffisamment de progestérone, Duphaston 10 mg comprimé pelliculé compense et rétablit l'équilibre.

Votre médecin peut également vous demander d'utiliser des œstrogènes en plus de Duphaston

10 mg. Cela dépend de la raison pour laquelle vous utilisez Duphaston 10 mg comprimé pelliculé.

Pour connaître les



6 118000 010500

maphar

Km 10, route côtière 111, Quartier industriel

Zenata, Ain Sabaa Casablanca - Maroc

DUPHASTON 10MG CP PEL B10 PPV. : 47DH70

Rachid Lamri: Pharmacien Responsable

1121402



6 118000 010500

maphar

Km 10, route côtière 111, Quartier industriel

Zenata, Ain Sabaa Casablanca - Maroc

DUPHASTON 10MG CP PEL B10 PPV. : 47DH70

Rachid Lamri: Pharmacien Responsable

1121402