

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

## Déclaration de Maladie

N° W19-563634

(51229)

Optique

Autres



Maladie

Dentaire

Optique

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 0002176 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom :

RAMI BOUC HAIB

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0665670203

Total des frais engagés : 2552

Cadre réservé au médecin

Carnet du médecin

M. ZOUBIDI ZINABIDIN Mohamed  
Médecin Agrégé - Cardiologie Interventionnelle  
157 Boud Point de Marseille Oasis  
Casablanca - Tél. : +212 5 22 25 51 55  
Mob : +212 6 69 58 10 00

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

En de parenté :

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

WOP : +515 6 22 28 10 81  
Casablanca - Agglopolis - 19  
Za 233 32 22  
M. ZOUBIDI ZINABIDIN Mohamed  
Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/11/2020 Cr.ELKA		34000		INP : 037026935 Pr. ZOUBIDI ZIMARIDIN Mohamed Pr. Agrégé - Cardiologie Interventionnelle 67, Rond Point de Marseille Oasis Casablanca - Tel. : +212 5 22 25 51 35

### EXECUTION DES ORDONNANCES Slob. : +212 6 69 58 10 81

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE SIDIE EL KHADIR 26 Rue Moulay Bouchaïb Darb Jamila Hay Hassan Casa 6 05 22 9 30 46	10/11/2020	2212,80

### ANALYSES - RADIGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



### O.D.F PROTHESES DENTAIRES



### DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

25533412 21433553  
00000000 00000000  
35533411 11433553

[Création, remont, adjonction]  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT  
DES TRAVAUX

MONTANTS  
DES SOINS

DEBUT  
D'EXECUTION

FIN  
D'EXECUTION

COEFFICIENT  
DES TRAVAUX

MONTANTS  
DES SOINS

DATE DU  
DEVIS

DATE DE  
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



ZOUBIDI MOHAMED ZINABDIN

Professeur Agrégé

Coronarographie - Angioplastie - Stimulation Cardiaque

Centre Cardiologique  
Interventionnel

Date : 1-11-2009

- Mr Rami Bouchair b.

210.00 24

1 Coplovia x

1 - 0 - 0



50.70 24

1 Cardalee triel 215

1 - 0 - 0



210.00 24

1 Senopla x

0 - 1



x 4 won

Pr. ZOUBIDI ZINABDIN Mohamed  
Pr. Agrégé - Cardiologie Interventionnel  
67 Rond Point de Marseille Oasis  
Casablanca - Tel. : +212 5 22 25 51 35  
Mob. : +212 6 69 99 10 81



Centre Cardiologique Interventionnel

67, Rond point de Marseille, Oasis - Casablanca - Tél. : +212 5 22 25 51 35 / GSM : +212 669 58 10 81  
E-mail : mz\_zoubidi@yahoo.fr / mz\_zoubidi@centrecardiologie.com / www.centrecardiologie.com

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# CoPlavix® 75 mg/100 mg

## comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

SANOFI

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrégent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose d' dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

### Contre-indications :

#### Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

- si vous avez une maladie associée à des polypes nasaux.
- si vous avez une maladie qui entraîne un saignement tel qu'un ulcère de l'estomac ou du cerveau.
- si vous souffrez d'une maladie grave de l'estomac.
- si vous souffrez d'une maladie grave de l'intestin.
- si vous êtes dans le 3ème trimestre de grossesse.

### Précautions d'emploi ; mises en garde

#### Avertissements et précautions

Si l'une des situations mentionnées dans cette notice vous concerne, vous devez en avertir votre médecin.

- si vous avez un risque hémorragique élevé (telle qu'une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac), des troubles de la coagulation ou d'autres maladies internes (saignement au sein, au nez, à la tête ou à une articulation).
- une blessure grave récente.
- une intervention chirurgicale récente.
- une intervention chirurgicale programmée dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans un vaisseau cérébral ischémique (AVC).
- si vous présentez une maladie de l'estomac ou de l'intestin.
- si vous avez des antécédents d'allergie à ce médicament, y compris les allergies à tout médicament.
- si vous avez de la goutte.
- si vous buvez de l'alcool, en raison de l'effet de l'alcool sur les malades ou de lésions gastro-intestinales.
- si vous avez une maladie appelée déficit en deshydrogénase (ou déficit en alcool déshydrogénase) qui peut développer une forme particulière de maladie dans le sang en faible quantité).

#### Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin :
  - si une intervention chirurgicale est programmée.
  - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des selles rouges ou dans l'intestin (selles rouges ou dans l'intestin).
- Vous devez aussi avertir votre dentiste (apart de l'inclusion de la dent).

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1.

Ain sebaâ Casablanca

CoPlavix 75mg/100mg

530 cp

P.P.V : 270,00 DH



6 118001 082018

Si vous avez une blessure ou un temps de saignement anormal, ou si vous constatez d'anomalies, vous devez en avertir immédiatement votre médecin. Votre médecin pourra vous donner des instructions pour empêcher les saignements.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# CoPlavix® 75 mg/100 mg

## comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

SANOFI

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrégent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose d' dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

### Contre-indications :

#### Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

- si vous avez une maladie associée à des polypes nasaux.
- si vous avez une maladie qui entraîne un saignement tel qu'un ulcère de l'estomac ou du cerveau.
- si vous souffrez d'une maladie grave.
- si vous souffrez d'une maladie grave.
- si vous êtes dans le 3ème trimestre de grossesse.

### Précautions d'emploi ; mises en garde

#### Avertissements et précautions

Si l'une des situations mentionnées dans cette notice vous concerne, vous devez en avertir votre médecin.

- si vous avez un risque hémorragique élevé (telle qu'une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac), des troubles de la coagulation, des maladies internes (saignement au sein, au cerveau, à une articulation).
- une blessure grave récente.
- une intervention chirurgicale.
- une intervention chirurgicale programmée dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans un vaisseau cérébral ischémique (AVC).
- si vous présentez une maladie de l'œil.
- si vous avez des antécédents d'allergie, y compris les allergies à tout médicament.
- si vous avez de la goutte.
- si vous buvez de l'alcool, en raison de l'effet de l'alcool sur les malades ou de lésions gastro-intestinales.
- si vous avez une maladie appelée déficit en déshydrogénase (ou déficit en alcool déshydrogénase) qui peut développer une forme particulière de maladie dans le sang en faible quantité).

#### Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin si vous avez une intervention chirurgicale.
- si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des selles rouges ou dans l'intestin (selles rouges ou dans l'intestin).
- Vous devez aussi avertir votre dentiste (apart de l'inclusion de la dent).

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1.

Ain sebaâ Casablanca

CoPlavix 75mg/100mg

530 cp

P.P.V : 270,00 DH

Barcode : 6 118001 082018

Expiry date : 08/2018

Exemple au cours du rasage, par exemple au cours du rasage,

vous devez en avertir immédiatement votre dentiste.

• Votre dentiste pourra vous donner des instructions pour éviter les saignements.





other medicines used for example in the treatment of depression (imipramine, desipramine).

## Utilizadores

DE N° 07/16A 105/381

Lundbeck 

# Seroplex® 10 mg

SEROPILEX® 10 mg scored film coated tablet

- The active substance is:  
Escitalopram ..... 10.00 mg  
In the form of escitalopram oxalate ..... 12.77 mg  
For one scored film coated tablet
  - The other ingredients are:  
Uncoated core:  
microcrystalline cellulose, anhydrous colloidal silica, talcum, sodium croscarmellose, magnesium stearate.  
Film coating:  
OPADRY white OY-S-28849 : hypromellose, macrogol 400 and titanium dioxide (E171).

**Holder/Manufacturer:** H. HUNDRECK A/S Ottiliavej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DENMARK

**WHAT IS SEROPLEX 10 mg. SCORED FILM COATED TABLET, AND WHEN IS IT USED?**

This medicine is presented in the form of scored film coated tablet in boxes of 28 or 14 tablets.

ANTIDEPRESSANT/SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITOR

This medicine is an antidepressant. It is indicated in:

- the treatment of major depressive episodes,
  - the treatment of panic disorders with or without agoraphobia,
  - the treatment of social phobia.

**SEROBIFLEX® 10 mg comprimido revestido e seccionável**

- A substância activa é:  
Escitalopram ..... 10,00 mg  
Na forma de oxalato de escitalopram ..... 12,77 mg  
Para um comprimido seccionalável revestido por película.
  - Os outros componentes são:  
Núcleo não coberto:  
celulose microcristalina, silício coloidal anidro, talco, croscarmelose sódica, esteára e óleo de magnésio.  
Revestimento:  
OPADRY branco OY-S-28849: hipromelose, macrogol 400 e dióxido de titânia (E171).

**Titular/Fabricante:**  
H. LUNDBECK A/S Ottiliavej, 9 - DK-2500 Copenhaga-Vall

#### O QUE É O SEROPLEX 10 mg, COMPRIMIDO REVESTIDO EM QUE CASO É UTILIZADO?

Este medicamento é apresentado sob a forma de comprimidos em caixas de 28 ou 14 comprimidos.

ANTIDEPRESSOR/INIBIDOR SELETIVO DA RECAPTAÇÃO DE

- Este medicamento é um antidepressor. É indicado no:

  - tratamento dos episódios depressivos de maior vulto,
  - tratamento do transtorno de pânico com ou sem agorafobia,
  - tratamento da fobia social.

**Maphar**  
Km 10, Route Côtier 111,  
QI Zenata Ain sebaa Casablanca  
Seroplex 10mg cp sec b28  
P.P.V : 240.00 DH



116001 18498

other medicines used for example in the treatment of depression (imipramine, desipramine).

BRUNSWICK

DE N° 07/16A 105/381

Lundbeck

# Seroplex® 10 mg

SEROPILEX® 10 mg scored film coated tablet

- The active substance is:  
Escitalopram ..... 10.00 mg  
In the form of escitalopram oxalate ..... 12.77 mg  
For one scored film coated tablet
  - The other ingredients are:  
Uncoated core:  
microcrystalline cellulose, anhydrous colloidal silica, talcum, sodium croscarmellose, magnesium stearate.  
Film coating:  
OPADRY white OY-S-28849 : hypromellose, macrogol 400 and titanium dioxide (E171).

**Holder/Manufacturer:** H. HUNDRECK A/S Ottiliavej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DENMARK

**WHAT IS SEROPLEX 10 mg. SCORED FILM COATED TABLET, AND WHEN IS IT USED?**

**WHAT IS SEROFLX 10 mg, 50 mg, 100 mg?**  
This medicine is presented in the form of scored film coated tablet in boxes of 28 or 14 tablets.

## ANTIDEPRESSANT/SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITOR

This medicine is an antidepressant. It is indicated in:

- the treatment of major depressive episodes,
  - the treatment of panic disorders with or without agoraphobia,
  - the treatment of social phobia.

**SEROBIFLEX® 10 mg comprimido revestido e seccionável**

- A substância activa é:  
Escitalopram ..... 10,00 mg  
Na forma de oxalato de escitalopram ..... 12,77 mg  
Para um comprimido seccionável revestido por película.
  - Os outros componentes são:  
Núcleo não coberto:  
celulose microcristalina, silício coloidal anidro, talco, croscarmelose sódica, estearato de magnésio.  
Revestimento:  
OPADRY branco OY-S-28849: hipromelose, macrogol 400 e dióxido de titânia (E171)

**Titular/Fabricante:** H. LUNDBECK A/S Ottiliavej, 9 - DK-2500 Copenhaga-Vall

O QUE É O SEROPLEX 10 mg, COMPRIMIDO REVESTIDO  
EM QUE CASO É UTILIZADO?

Este medicamento é apresentado sob a forma de comprimidos em caixas de 28 ou 14 comprimidos.

ANTIDEPRESSOR/INIBIDOR SELETIVO DA RECAPTAÇÃO DE

- Este medicamento é um antidepressor. É indicado no:

  - tratamento dos episódios depressivos de maior vulto,
  - tratamento do transtorno de pânico com ou sem agorafobia,
  - tratamento da fobia social.

Maphar  
Km 10, Route Côtier 111.

QI Zenata Ain sebaa Casablanca

Seroplex 10mg cp sec b28  
210-00 PH

P.P.V : 240,00 DH



File 118001 184989

other medicines used for example in the treatment of depression (imipramine, desipramine).

2011ZG0057003

DE N° 07/16A 105/381

Lundbeck

# Seroplex® 10 mg

SEROPILEX® 10 mg scored film coated tablet

- The active substance is:  
Escitalopram ..... 10.00 mg  
In the form of escitalopram oxalate ..... 12.77 mg  
For one scored film coated tablet
  - The other ingredients are:  
Uncoated core:  
microcrystalline cellulose, anhydrous colloidal silica, talcum, sodium croscarmellose, magnesium stearate.  
Film coating:  
OPADRY white OY-S-28849 : hypromellose, macrogol 400 and titanium dioxide (E171).

**Holder/Manufacturer:** H. HUNDRECK A/S Ottiliavej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DENMARK

**WHAT IS SEROPLEX 10 mg. SCORED FILM COATED TABLET, AND WHEN IS IT USED?**

**WHAT IS SEROFLX 10 mg, 50 mg, 100 mg?**  
This medicine is presented in the form of scored film coated tablet in boxes of 28 or 14 tablets.

ANTIDEPRESSANT/SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITOR

This medicine is an antidepressant. It is indicated in:  
- Major depressive episodes

- the treatment of major depressive episodes,
  - the treatment of panic disorders with or without agoraphobia,
  - the treatment of social phobia.

**SEROBIFLEX® 10 mg comprimido revestido e seccionável**

- A substância activa é:  
Escitalopram ..... 10,00 mg  
Na forma de oxalato de escitalopram ..... 12,77 mg  
Para um comprimido seccionalável revestido por película.
  - Os outros componentes são:  
Núcleo não coberto:  
celulose microcristalina, silício coloidal anidro, talco, croscarmelose sódica, esteára e óleo de magnésio.  
Revestimento:  
OPADRY branco OY-S-28849: hipromelose, macrogol 400 e dióxido de titânia (E171).

**Titular/Fabricante:** H. LUNDBECK A/S Ottiliavej, 9 - DK-2500 Copenhaga-Vall

#### O QUE É O SEROPLEX 10 mg, COMPRIMIDO REVESTIDO EM QUE CASO É UTILIZADO?

Este medicamento é apresentado sob a forma de comprimidos em caixas de 28 ou 14 comprimidos.

ANTIDEPRESSOR/INIBIDOR SELETIVO DA RECAPTAÇÃO DE

- Este medicamento é um antidepressor. É indicado no:

  - tratamento dos episódios depressivos de maior vulto,
  - tratamento do transtorno de pânico com ou sem agorafobia,
  - tratamento da fobia social.

**Maphar**  
Km 10, Route Côtier 111,  
QI Zenata Ain sebaa Casablanca  
Seroplex 10mg cp sec b28  
P.P.V : 240.00 DH



116001 18498

other medicines used for example in the treatment of depression (imipramine, desipramine).

2011ZG0057003

DE N° 07/16A 105/381

Lundbeck

# Seroplex® 10 mg

SEROPILEX® 10 mg scored film coated tablet

- The active substance is:  
Escitalopram ..... 10.00 mg  
In the form of escitalopram oxalate ..... 12.77 mg  
For one scored film coated tablet
  - The other ingredients are:  
Uncoated core:  
microcrystalline cellulose, anhydrous colloidal silica, talcum, sodium croscarmellose, magnesium stearate.  
Film coating:  
OPADRY white OY-S-28849 : hypromellose, macrogol 400 and titanium dioxide (E171).

**Holder/Manufacturer:** H. HUNDRECK A/S Ottiliavej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DENMARK

**WHAT IS SEROPLEX 10 mg. SCORED FILM COATED TABLET, AND WHEN IS IT USED?**

This medicine is presented in the form of scored film coated tablet in boxes of 28 or 14 tablets.

ANTIDEPRESSANT/SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITOR

This medicine is an antidepressant. It is indicated in:

- the treatment of major depressive episodes,
  - the treatment of panic disorders with or without agoraphobia,
  - the treatment of social phobia.

**SEROPILEX® 10 mg** comprimido revestido e seccionável

- A substância activa é:  
Escitalopram ..... 10,00 mg  
Na forma de oxalato de escitalopram ..... 12,77 mg  
Para um comprimido seccionável revestido por película.
  - Os outros componentes são:  
Núcleo não coberto:  
celulose microcristalina, silício coloidal anidro, talco, croscarmelose  
sódica, esteára to de magnésio.  
Revestimento:  
OPADRY branco OY-S-28849: hipromelose, macrogol 400 e dióxido de titâno (E171).

**Titular/Fabricante:**  
H. LUNDBECK A/S Ottiliavej, 9 - DK-2500 Copenhaga-Vall

#### O QUE É O SEROPLEX 10 mg, COMPRIMIDO REVESTIDO EM QUE CASO É UTILIZADO?

Este medicamento é apresentado sob a forma de comprimidos em caixas de 28 ou 14 comprimidos.

ANTIDEPRESSOR/INIBIDOR SELETIVO DA RECAPTAÇÃO DA SEROTONINA, É um antidepressor. É indicado no:

- Este medicamento é um antidepressor. É indicado no:

  - tratamento dos episódios depressivos de maior vulto,
  - tratamento do transtorno de pânico com ou sem agorafobia,
  - tratamento da fobia social.

Maphar  
Km 10, Route Côtier 111.

## QI Zenata Ain sebaa Casablanca

Seroplex 10mg cp sec b28  
210-00 PH

P.P.V : 240,00 DH



File 118001 184989

# CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

## Bisoprolol Fumarate

### Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

#### Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bêtabloquants.

#### Indications thérapeutiques

Les bêtabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps.

L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements d'épisodes de pâlissement ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,

Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

- insuffisance cardiaque aiguë,
- aggravation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction du cœur,
- rythme cardiaque lent,
- pression artérielle basse,
- certaines affections cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,
- choc cardiogénique, grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

Faites attention avec CARDENSIEL :

Si vous présentez l'une des affections suivantes, indiquez-le à votre médecin avant de prendre CARDENSIEL ; il/elle pourra décider si vous avez besoin d'un traitement complémentaire ou réaliser des contrôles plus fréquents.



6 118001 100859

Com

Cardensiel 2,5mg B30

PPV : 50,70DH

7862160238

# CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

## Bisoprolol Fumarate

### Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

#### Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bêtabloquants.

#### Indications thérapeutiques

Les bêtabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps.

L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements d'épisodes de pâlissement ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,

Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

- insuffisance cardiaque aiguë,
- aggravation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction du cœur,
- rythme cardiaque lent,
- pression artérielle basse,
- certaines affections cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,
- choc cardiogénique, grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

Faites attention avec CARDENSIEL :

Si vous présentez l'une des affections suivantes, indiquez-le à votre médecin avant de prendre CARDENSIEL ; il/elle pourra décider si vous avez besoin d'un traitement complémentaire ou réaliser des contrôles plus fréquents.



6 118001 100859

Com

Cardensiel 2,5mg B30

PPV : 50,70DH

7862160238

# CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

## Bisoprolol Fumarate

### Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

#### Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bêtabloquants.

#### Indications thérapeutiques

Les bêtabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps.

L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements d'épisodes de pâlissement ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,

Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

- insuffisance cardiaque aiguë,
- aggravation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction du cœur,
- rythme cardiaque lent,
- pression artérielle basse,
- certaines affections cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,
- choc cardiogénique, grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

Faites attention avec CARDENSIEL :

Si vous présentez l'une des affections suivantes, indiquez-le à votre médecin avant de prendre CARDENSIEL ; il/elle pourra décider si vous avez besoin d'un traitement complémentaire ou réaliser des contrôles plus fréquents.



6 118001 100859

Com

Cardensiel 2,5mg B30

PPV : 50,70DH

7862160238

# CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

## Bisoprolol Fumarate

### Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

#### Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bêtabloquants.

#### Indications thérapeutiques

Les bêtabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps.

L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements d'épisodes de pâlissement ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,

Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

- insuffisance cardiaque aiguë,
- aggravation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction du cœur,
- rythme cardiaque lent,
- pression artérielle basse,
- certaines affections cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,
- choc cardiogénique, grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

Faites attention avec CARDENSIEL :

Si vous présentez l'une des affections suivantes, indiquez-le à votre médecin avant de prendre CARDENSIEL ; il/elle pourra décider si vous avez besoin d'un traitement complémentaire ou réaliser des contrôles plus fréquents.



6 118001 100859

Com

Cardensiel 2,5mg B30

PPV : 50,70DH

7862160238

Name: rami bouchaib	Frequency: 1000Hz	PR Interval: 134 ms	Prompt:
Sex: BedNo.: Pr. ZOUBIDI ZINABIDIN Mohamed	Sample Time: 183s	QT Interval: 433 ms	Total Beats 83 ,Normal Beats 60 ,SVE 10 ,VE 12 .
Age: Date: 10/11/2020 14:24:05	HR: 74bpm	QTc Interval: 479 ms	ST depression, possible mild inferior myocardial ischemia;Abnormal ECG.
SN:0001896 Section: Pr Agrégé - Cardiologie Interventionnel 67, Rond Point de Marseille Oasis Casablanca - Tel : +212 5 22 25 51 35 M8: +212 8 89 39 10 81	P Interval: 96ms	P Axis: -0.90;ā	
Cli No.: CaseNo.:	QRS Interval: 93 ms	QRS Axis: 51.60;ā	
	T Interval: 178 ms	T Axis: 26.00;ā	Doctor:

