

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## ique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

Nº P19- 0025904

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 0581

Société : RETRAITE RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : ABDELKARIM BRAHIM NAIMA

Date de naissance : 01.01.1946

Adresse : HAY TAKADOUUM Bir Jdid

Tél. : 06 70 88 23 33 Total des frais engagés : 166,65 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr BOUHACHOUCHE Said  
Médecine Générale  
Lot Riad 1 N° 18 Bir Jdid  
Tél: 0523 36 07 83  
INPE : 111242632

Date de consultation : 10/11/2020

Nom et prénom du malade : EP. REIHAD NAIMA Age: 1961

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : 15 DEC. 2020

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

ACCUEIL

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
10/07/2009			€ 1109,00	 Dr BOUHACHOUCHE Médecin Lyon 6 <sup>e</sup> Tél: 04 72 30 07 03 INPE 24203
AB/07/2009			0	 Dr BOUHACHOUCHE Médecin Généraliste 11 Rue 18 Bir Hakeim Lyon 6 <sup>e</sup> Tél: 04 72 36 07 03

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fourisseur	Date	Montant de la Facture
	12/11/20	284,60
	13/11/20	411,90

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LASORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES Dr. Naeem Biologiste Dr. Mabrouka N° 17 Bir Jidid Tel / Fax : 05 23 38 03 04 Ref : 11306295	14/11/20	3870,00 P.F.	970,00

## AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
Praticien : Dr. BOURGEOIS	2010-01-01					

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS

Dr. Said BOUHACHOUCHE

MEDECINE GENERALE

Echographie



الدكتور سعيد بوحشوش

الطب العام

المفحص بالصدى

INPE : 111242632

Bir Jdid, le :

٢٠١٨/١١/٢٦



53,10 .

1

Relaxol



82,50 .

2

Moxibustion



3

Spécialité R

149,50 .

4

Art. + fleur jasmin



284,60 .




تجزئة رياض 1 - رقم 18 - البئر الجديد - الهاتف / الفاكس : 05 23 36 07 83

Lotissement Riad 1 - N°18 - Bir Jdid - Tél./Fax : 05 23 36 07 83



# ARTIFLEX®

Les douleurs articulaires sont de plus en plus fréquentes, et ceci est dû à l'usure des cartilages, façon progressive et irrémédiable jusqu'à disparition du tissu cartilagineux, à une protection optimale pour effectuer les mouvements sans douleurs.



poisson (Chondroïtine), Harpagophytum  
Sanglier (gingembre, inuline), enveloppe

#### Composition :

Matière Première	Actif	Teneur en actif par 2 gélules	A.J.R.*/2 gélules
Poudre de carapace de Crustacés	Glucosamine	500 mg	-
Poudre de cartilage de poisson	Chondroïtine	150 mg	-
Harpagophytum		150 mg	-
Reine des Prés poudre		90 mg	-
Prêle poudre		90 mg	-
Vitamine B12	Cyanocobalamine	0,66 µg	66,66 %

#### \* Apport Journalier Recommandé

#### 3. Propriétés :

ARTIFLEX® contient des substances naturelles qui contribuent à ralentir l'usure des cartilages et entretenir le confort et la souplesse articulaire.

#### ARTIFLEX® contient :

- La glucosamine (poudre de carapace de crustacés) et la chondroïtine (poudre de cartilage de poisson), constituants des substances cartilagineuses qui agissent en synergie pour une protection optimale des articulations.
- L'harpagophytum et la reine de près possèdent des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques naturelles.
- La prêle, riche en silice, possède des propriétés reminéralisantes.
- La vitamine B12 reconnue pour ses propriétés antiarthritique et antistéoporotique.

Pris chaque jour, ARTIFLEX® permet de soulager progressivement ces symptômes.

#### 4. Posologie :

Se référer à la prescription médicale

A prendre au milieu des repas.

#### 5. Précautions d'emploi

Contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des composants (présence de dérivés salicylés)

Ne peut être utilisé par la femme enceinte et allaitante.

Fabriqué par Laboratoire FCV

Exploitant RAMO-PHARM

Complément Alimentaire n'est pas un médicament



# Relaxol® 500mg /2mg

Paracétamol/ thiocolchicoside

comprimé

SANOFI

LOT :19E000  
PER :10/2022

RELAXOL 500MG/2MG  
CP B20



P.P.V :53DH10



6 118000 060833

dépassant 7 jours. Ceci est dû au fait  
génome lorsque vous prenez du  
provocer des lésions sur certaines  
à. Cela a été mis en évidence lors  
de l'homme, ce type de  
lésions cellulaires est un facteur de risque de cancer, d'altération de la fertilité  
masculine et peut-être dangereux pour un  
enfant à naître. Parlez-en avec votre  
médecin si vous avez plus de questions.

Votre médecin vous renseignera sur toutes les mesures relatives à une  
contraception efficace et sur les risques potentiels d'une grossesse.

La durée du traitement est limitée à 7 jours consécutifs.

Avant de débuter un traitement par ce médicament, vérifier que vous ne prenez  
pas d'autres médicaments contenant du paracétamol.

La prise de paracétamol peut entraîner des troubles du fonctionnement du foie.  
Prévenez votre médecin : • Si vous pesez moins de 50 kg. • Si vous avez une  
maladie du foie ou maladie grave des reins. • Si vous buvez fréquemment de  
l'alcool ou que vous avez arrêté de boire de l'alcool récemment. • Si vous souffrez de  
déshydratation. • Si vous souffrez par exemple de malnutrition chronique, si  
vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu beaucoup de poids récemment,  
si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous présentez  
des maladies de longue durée, si vous êtes atteints du virus du SIDA ou d'une  
hépatite virale chronique, si vous souffrez de mucoviscidose (maladie génétique et  
héritaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou  
encore si vous êtes atteints de la maladie de Gilbert (maladie hérititaire associée  
à une augmentation du taux de bilirubine dans le sang).

La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.  
En cas de sevrage récent d'un alcoolisme chronique, le risque d'atteinte hépatique  
est majoré.

En cas d'hépatite virale aiguë, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.  
En cas de problème de nutrition (malnutrition) ou de déshydratation, Relaxol,  
comprimé doit être utilisé avec précaution.

**Enfants et adolescents :** N'administrez pas ce médicament à des enfants ou des  
adolescents âgés de moins de 16 ans pour des raisons de sécurité.  
**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**Prise ou utilisation d'autres médicaments :** Signalez que vous prenez ce  
médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique dans  
le sang ou un dosage de la glycémie.  
Ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol. Vous risqueriez  
un surdosage.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale (par warfarine ou AVK),  
la prise de paracétamol aux doses maximales (4 g/jour) pendant plus de 4 jours  
nécessite une surveillance renforcée des examens biologiques dont notamment  
de l'INR. Dans ce cas, consultez votre médecin.

L'efficacité du paracetamol peut être diminuée si vous prenez simultanément des  
résines chélantes – médicament qui diminue le taux de cholestérol dans le sang  
(respectez un intervalle de plus de 2 heures entre les 2 prises).

Si vous recevez en même temps que du paracétamol, un traitement par  
flucoxacilime (un antibiotique), vous risquez de présenter une acidose  
métabolique (sang trop acide à l'origine d'une accélération de la fréquence  
respiratoire).

La toxicité du paracetamol peut être augmentée, si vous prenez :  
• Des médicaments potentiellement toxiques pour le foie. • Des médicaments qui  
favorisent la production du métabolite toxique du paracétamol tels que les  
médicaments antiépileptiques (phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine,  
topiramate). • De la rifampicine (un antibiotique). • En même temps de l'alcool.  
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou  
pourriez prendre tout autre médicament.

Relaxol peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

Grossesse, allaitement et fertilité

**Ne prenez pas ce médicament :** • si vous êtes enceinte, pourriez tomber

## Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. • Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. • Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. • Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 1. QU'EST-CE QU' Relaxol ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est indiqué dans le traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses en rhumatologie chez les adultes et les adolescents à partir de 16 ans.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAIRE AVANT DE PRENDRE Relaxol ?

**Ne prenez jamais RELAXOL dans les cas suivants :** • Si vous êtes allergique au thiocolchicoside et/ou au paracétamol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6). • Si vous êtes enceinte, pourriez tomber enceinte ou pensez que vous pourriez être enceinte. • Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants n'utilisant pas de contraception. • Si vous allaitez

• Insuffisance hépatocellulaire ou si vous avez une maladie grave du foie. • Enfants de moins de 16 ans.

**EN CAS DE DOULE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Faites attention avec RELAXOL :

**Mises en garde spéciales :** Utiliser avec précaution en cas d'antécédents d'épilepsie ou de convulsions. La survenue de crise convulsive impose l'arrêt du traitement.

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

**Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Vérifiez que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol, y compris si ce sont des médicaments obtenus sans prescription.**

**Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (voir rubrique « Posologie »).**

**Précautions d'emploi :** En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la posologie.

En cas de douleurs d'estomac, de nausées, de vomissements, prévenez votre médecin.

Respectez rigoureusement les doses et la durée du traitement décrites à la rubrique 3. Vous ne devez pas utiliser ce médicament à une dose plus élevée (soit

**VOXCIB®** 200 mg

10 gélules



LOT: 20072  
PER: 02/22  
PPV: 82,00 DH

**VOXCIB®**  
Ibuprofène

6 118 000 140665  
Lactose.

carmellose sodique, polyvidone K30, stéarate de magnésium.

**VISAGE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :**

Ce médicament est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) appartenant à la classe des Coxibs (Inhibiteur sélectif de la cyclo-oxygénase 2).

**INDICATIONS :**

Ce médicament est indiqué chez l'adulte.

Il calme la douleur et réduit l'inflammation provoquée par la polyarthrite rhumatoïde ou l'arthrose. Il réduit la quantité des prostaglandines fabriquées par le corps, qui sont à l'origine de la douleur et de l'inflammation.

**CONTRE-INDICATIONS :**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'hypersensibilité à l'un des composants des gélules VOXCIB ou aux sulfamides et chez les patients souffrant de maladies cardiaques (telle qu'une angine de poitrine, un infarctus du myocarde ou une insuffisance cardiaque) de maladie cérébro-vasculaire (antécédent d'accident vasculaire cérébral ou d'accident ischémique transitoire), de maladie inflammatoire de l'intestin, d'ulcère. De même, il ne doit pas être administré en cas de Grossesse et Allaitemment, d'insuffisance hépatique sévère, d'ulcère peptique évolutif ou saignement gastro-intestinal.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**MISES EN GARDE :**

Ce médicament DOIT ETRE PRIS SOUS SURVEILLANCE MEDICALE, PREVENIR VOTRE MEDECIN EN CAS DE :

- Femmes en âge de procréer, en l'absence de contraception efficace.
- Tension artérielle élevée.
- Insuffisance cardiaque.
- En cas d'accumulation de liquides dans le corps (œdème).

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN:**

- En cas de maladies hépatiques ou rénales sévères
- En cas d'antécédents de réaction allergique telle que rash cutané, œdème, démangeaisons, sensation d'étouffement ou respiration sifflante après prise d'aspirine ou d'agents anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- En cas de traitement à la warfarine ou tout autre anticoagulant
- Si vous présentez des facteurs de risque cardio-vasculaire, tels qu'une hypertension, un taux de cholestérol élevé, un diabète ou un tabagisme.
- VOXCIB doit être utilisé aux doses efficaces les plus faibles durant la période la plus courte.

**INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE VOXCIB et plusieurs autres médicaments tels que :

- warfarine.
- les antidépresseurs, les neuroleptiques, les antiarythmiques (sauf avis du médecin)
- les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Dr. Said BOUHACHOUCHE

MEDECINE GENERALE

Echographie



الدكتور سعيد بوحشوش

الطب العام

الفحص بالصدى

INPE : 111242632

Bir Jdid, le : 13/11/2016 البئر الجديد، في :

4950 x 3

1)

D<sub>3</sub> norm.

✓ 15

2087€/T x 4 mi

2)

Osteocore

✓ 15

18/T x 1 mi

5782 x 3

3)

LDR NOR 10U

✓ 15

411,90

- ^ A  
+ mi



Dr. BOUHACHOUCHE Said  
Médecine Générale  
Bir Jdid 1 N° 18 Bir Jdid  
Tél: 0523360783  
Fax: 0523360783  
INPE: 111242632

تجزئة رياض 1 - رقم 18 - البئر الجديد - الهاتف / الفاكس : 05 23 36 07 83

Lotissement Riad 1 - N°18 - Bir Jdid - Tél./Fax : 05 23 36 07 83

# LD-NOR®

## 10, 20 & 40 mg, Comprimé pelliculé (DCI : Atorvastatine)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gan  
S

LOT : 201049  
UT AV : 07/2023  
PPV : 57,800H

UT. AV.:

LOT N° :

PPV (DH) :

Le médicament a été enrobé : lactose monohydrate

### LD-NOR 10mg

30 comprimés pelliculés



6 118000 082217

de médicaments appelés statines, qui interviennent dans

le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et associé à des modifications du mode de vie ne sont pas de survenue de maladie du cœur, LD-NOR, comprimé même si votre taux de cholestérol est normal. Vous standard, pauvre en cholestérol pendant toute la durée du

comprimé pelliculé ou à un autre médicament similaire

- Si vous avez ou avez eu une maladie du foie.
- Si vous avez ou des résultats d'analyse des tests de votre fonction hépatique anormaux et inexplicables.
- Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous n'utilisez pas une méthode de contraception fiable.
- Si vous êtes enceinte ou essayez de l'être.
- Si vous allez.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTION D'EMPLOI :

Faites attention avec LD-NOR, comprimé pelliculé :

Si vous présentez l'une des situations suivantes, LD-NOR, comprimé pelliculé peut ne pas être adapté pour VOUS :

- Si vous avez précédemment eu un accident vasculaire cérébral avec saignement dans le cerveau, ou si vous avez de petites poches de liquides dans le cerveau suite à un accident vasculaire cérébral.
- Si vous avez des problèmes aux reins.
- Si l'activité de votre grande thyroïde est insuffisante (hypothyroïdie).
- Si vous avez présenté dans le passé des courbatures ou des douleurs musculaires répétées et inexplicables, ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires.
- Si vous avez eu des problèmes musculaires pendant un traitement avec d'autres médicaments diminuant les lipides du sang (par exemple une autre statine ou un fibrate).
- Si vous buvez régulièrement d'importante quantité d'alcool.
- Si vous avez des antécédents de maladie du foie.
- Si vous êtes âgé de plus de 70 ans.

Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé

Si vous avez une insuffisance respiratoire sévère.

Si vous présentez l'une des situations ci-dessus, votre médecin vous prescrira une analyse de sang avant,

établie. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.  
D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

### CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Ce médicament n'affecte normalement pas votre capacité à conduire ou utiliser des machines. Cependant ne conduisez pas si ce médicament affecte votre aptitude à conduire. N'utilisez pas d'appareils ou de machines si votre capacité à les utiliser est affectée par ce médicament.

### POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION :

Avant que vous ne commencez le traitement, votre médecin vous prescrira un régime pauvre en cholestérol, que vous devez poursuivre pendant toute la durée de votre traitement par LD-NOR, comprimé pelliculé. La posologie initiale habituelle de LD-NOR, comprimé pelliculé est de 10 mg en une prise par jour chez les adultes et enfants âgés de 10 ans ou plus. La posologie peut être augmentée si nécessaire par votre médecin jusqu'à la posologie dont vous avez besoin. La posologie sera adaptée par votre médecin à intervalle d'au moins 4 semaines. La dose maximale de LD-NOR est de 80 mg une fois par jour chez les adultes et est de 20 mg une fois par jour chez les enfants.

### MODE D'ADMINISTRATION :

Les comprimés de LD-NOR, comprimé pelliculé doivent être avalés entiers avec un verre d'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée, avec ou sans aliments. Essayez cependant de prendre votre comprimé tous les jours à la même heure.

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La durée du traitement par LD-NOR, comprimé pelliculé est déterminée par votre médecin.

Si vous pensez que l'effet de LD-NOR, comprimé pelliculé est trop fort ou trop faible parlez-en à votre médecin. Si vous avez pris plus de LD-NOR, comprimé pelliculé qu'il ne faut, contactez immédiatement votre médecin.

### SURDOSAGE

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de LD-NOR, que vous n'auriez dû (plus que votre dose quotidienne habituelle), contactez votre médecin ou l'hôpital le plus proche pour avis.

### Instructions en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez simplement la prochaine dose prévue à l'heure normale. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### Risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé :

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, ou souhaitez arrêter de prendre votre traitement demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### EFFETS SECONDAIRES :

Comme tous les médicaments, LD-NOR, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables graves suivants, arrêtez de prendre vos comprimés et contactez immédiatement votre médecin ou allez au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Rare : affecte 1 à 10 patients sur 10000 :

- Réaction allergique sévère entraînant un gonflement du visage, de la langue et de la gorge pouvant provoquer d'importantes difficultés à respirer.
- Pathologie sévère avec pelade et gonflement grave de la peau, cloques sur la peau, dans la bouche, sur la zone génitale et autour des yeux et une fièvre. Éruption cutanée de taches roses rouges, particulièrement sur la paume des mains ou la plante des pieds qui peuvent former des cloques.
- Faiblesse musculaire, endolorissement ou douleurs musculaires associées à une sensation de malaise ou de fièvre, pouvant être causées par une atteinte musculaire anormale qui peut engager le pronostic vital et entraîner des problèmes de reins.

Très rare : affecte moins de 1 patient sur 10000 :

• La présence inattendue ou inhabituelle de saignements ou d'hématomates peut être le signe d'anomalie du fonctionnement de votre foie. Dans ce cas consultez votre médecin dès que possible.

Autres effets indésirables éventuels LD-NOR, comprimé pelliculé

Effets indésirables fréquents (affectent 1 à 10 patients sur 100) :

• Inflammation des cavités nasales, maux de gorges, saignements de nez.

• Réaction allergiques.

• Augmentation du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique, continuez à surveiller attentivement votre glycémie) augmentation du taux de créatine phosphokinase dans le sang.

• Maux de tête

• Nausée, constipation, flatulence, indigestion.

• Douleurs articulaires, douleurs musculaires et maux de dos.

• Résultat d'analyse de sang montrant l'apparition d'une anomalie de la fonction du foie.

Effets indésirables peu fréquents (affectent 1 à 10 patients sur 1000) :

• Anorexie (d'appétit), prise de poids, diminution du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique,

vous devez continuer à surveiller attentivement votre glycémie).

# LD-NOR®

## 10, 20 & 40 mg, Comprimé pelliculé (DCI : Atorvastatine)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gan  
S

LOT : 201049  
UT AV : 07/2023  
PPV : 57,800H

UT. AV.:

LOT N° :

PPV (DH) :

Le médicament a été enrobé : lactose monohydrate

### LD-NOR 10mg

30 comprimés pelliculés



6 118000 082217

de médicaments appelés statines, qui interviennent dans

le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et associé à des modifications du mode de vie ne sont pas de survenue de maladie du cœur, LD-NOR, comprimé même si votre taux de cholestérol est normal. Vous standard, pauvre en cholestérol pendant toute la durée du

comprimé pelliculé ou à un autre médicament similaire

- Si vous avez ou avez eu une maladie du foie.
- Si vous avez ou des résultats d'analyse des tests de votre fonction hépatique anormaux et inexplicables.
- Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous n'utilisez pas une méthode de contraception fiable.
- Si vous êtes enceinte ou essayez de l'être.
- Si vous allez.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTION D'EMPLOI :

Faites attention avec LD-NOR, comprimé pelliculé :

Si vous présentez l'une des situations suivantes, LD-NOR, comprimé pelliculé peut ne pas être adapté pour VOUS :

- Si vous avez précédemment eu un accident vasculaire cérébral avec saignement dans le cerveau, ou si vous avez de petites poches de liquides dans le cerveau suite à un accident vasculaire cérébral.
- Si vous avez des problèmes aux reins.
- Si l'activité de votre grande thyroïde est insuffisante (hypothyroïdie).
- Si vous avez présenté dans le passé des courbatures ou des douleurs musculaires répétées et inexplicables, ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires.
- Si vous avez eu des problèmes musculaires pendant un traitement avec d'autres médicaments diminuant les lipides du sang (par exemple une autre statine ou un fibrate).
- Si vous buvez régulièrement d'importante quantité d'alcool.
- Si vous avez des antécédents de maladie du foie.
- Si vous êtes âgé de plus de 70 ans.

Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé

Si vous avez une insuffisance respiratoire sévère.

Si vous présentez l'une des situations ci-dessus, votre médecin vous prescrira une analyse de sang avant,

établie. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.  
D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

### CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Ce médicament n'affecte normalement pas votre capacité à conduire ou utiliser des machines. Cependant ne conduisez pas si ce médicament affecte votre aptitude à conduire. N'utilisez pas d'appareils ou de machines si votre capacité à les utiliser est affectée par ce médicament.

### POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION :

Avant que vous ne commencez le traitement, votre médecin vous prescrira un régime pauvre en cholestérol, que vous devez poursuivre pendant toute la durée de votre traitement par LD-NOR, comprimé pelliculé. La posologie initiale habituelle de LD-NOR, comprimé pelliculé est de 10 mg en une prise par jour chez les adultes et enfants âgés de 10 ans ou plus. La posologie peut être augmentée si nécessaire par votre médecin jusqu'à la posologie dont vous avez besoin. La posologie sera adaptée par votre médecin à intervalle d'au moins 4 semaines. La dose maximale de LD-NOR est de 80 mg une fois par jour chez les adultes et est de 20 mg une fois par jour chez les enfants.

### MODE D'ADMINISTRATION :

Les comprimés de LD-NOR, comprimé pelliculé doivent être avalés entiers avec un verre d'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée, avec ou sans aliments. Essayez cependant de prendre votre comprimé tous les jours à la même heure.

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La durée du traitement par LD-NOR, comprimé pelliculé est déterminée par votre médecin.

Si vous pensez que l'effet de LD-NOR, comprimé pelliculé est trop fort ou trop faible parlez-en à votre médecin. Si vous avez pris plus de LD-NOR, comprimé pelliculé qu'il ne faut, contactez immédiatement votre médecin.

### SURDOSAGE

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de LD-NOR, que vous n'auriez dû (plus que votre dose quotidienne habituelle), contactez votre médecin ou l'hôpital le plus proche pour avis.

### Instructions en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez simplement la prochaine dose prévue à l'heure normale. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### Risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé :

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, ou souhaitez arrêter de prendre votre traitement demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### EFFETS SECONDAIRES :

Comme tous les médicaments, LD-NOR, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables graves suivants, arrêtez de prendre vos comprimés et contactez immédiatement votre médecin ou allez au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Rare : affecte 1 à 10 patients sur 10000 :

- Réaction allergique sévère entraînant un gonflement du visage, de la langue et de la gorge pouvant provoquer d'importantes difficultés à respirer.
- Pathologie sévère avec pelade et gonflement grave de la peau, cloques sur la peau, dans la bouche, sur la zone génitale et autour des yeux et une fièvre. Éruption cutanée de taches roses rouges, particulièrement sur la paume des mains ou la plante des pieds qui peuvent former des cloques.
- Faiblesse musculaire, endolorissement ou douleurs musculaires associées à une sensation de malaise ou de fièvre, pouvant être causées par une atteinte musculaire anormale qui peut engager le pronostic vital et entraîner des problèmes de reins.

Très rare : affecte moins de 1 patient sur 10000 :

• La présence inattendue ou inhabituelle de saignements ou d'hématomates peut être le signe d'anomalie du fonctionnement de votre foie. Dans ce cas consultez votre médecin dès que possible.

Autres effets indésirables éventuels LD-NOR, comprimé pelliculé

Effets indésirables fréquents (affectent 1 à 10 patients sur 100) :

• Inflammation des cavités nasales, maux de gorges, saignements de nez.

• Réaction allergiques.

• Augmentation du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique, continuez à surveiller attentivement votre glycémie) augmentation du taux de créatine phosphokinase dans le sang.

• Maux de tête

• Nausée, constipation, flatulence, indigestion.

• Douleurs articulaires, douleurs musculaires et maux de dos.

• Résultat d'analyse de sang montrant l'apparition d'une anomalie de la fonction du foie.

Effets indésirables peu fréquents (affectent 1 à 10 patients sur 1000) :

• Anorexie (d'appétit), prise de poids, diminution du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique,

vous devez continuer à surveiller attentivement votre glycémie).

# LD-NOR®

## 10, 20 & 40 mg, Comprimé pelliculé (DCI : Atorvastatine)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gan  
S

LOT : 201049  
UT AV : 07/2023  
PPV : 57,800H

UT. AV.:

LOT N° :

PPV (DH) :

Le médicament a été enrobé : lactose monohydrate

### LD-NOR 10mg

30 comprimés pelliculés



6 118000 082217

de médicaments appelés statines, qui interviennent dans

le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et associé à des modifications du mode de vie ne sont pas de survenue de maladie du cœur, LD-NOR, comprimé même si votre taux de cholestérol est normal. Vous standard, pauvre en cholestérol pendant toute la durée du

comprimé pelliculé ou à un autre médicament similaire

- Si vous avez ou avez eu une maladie du foie.
- Si vous avez ou des résultats d'analyse des tests de votre fonction hépatique anormaux et inexplicables.
- Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous n'utilisez pas une méthode de contraception fiable.
- Si vous êtes enceinte ou essayez de l'être.
- Si vous allez.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTION D'EMPLOI :

Faites attention avec LD-NOR, comprimé pelliculé :

Si vous présentez l'une des situations suivantes, LD-NOR, comprimé pelliculé peut ne pas être adapté pour VOUS :

- Si vous avez précédemment eu un accident vasculaire cérébral avec saignement dans le cerveau, ou si vous avez de petites poches de liquides dans le cerveau suite à un accident vasculaire cérébral.
- Si vous avez des problèmes aux reins.
- Si l'activité de votre grande thyroïde est insuffisante (hypothyroïdie).
- Si vous avez présenté dans le passé des courbatures ou des douleurs musculaires répétées et inexplicables, ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires.
- Si vous avez eu des problèmes musculaires pendant un traitement avec d'autres médicaments diminuant les lipides du sang (par exemple une autre statine ou un fibrate).
- Si vous buvez régulièrement d'importante quantité d'alcool.
- Si vous avez des antécédents de maladie du foie.
- Si vous êtes âgé de plus de 70 ans.

Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé

Si vous avez une insuffisance respiratoire sévère.

Si vous présentez l'une des situations ci-dessus, votre médecin vous prescrira une analyse de sang avant,

établie. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.  
D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

### CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Ce médicament n'affecte normalement pas votre capacité à conduire ou utiliser des machines. Cependant ne conduisez pas si ce médicament affecte votre aptitude à conduire. N'utilisez pas d'appareils ou de machines si votre capacité à les utiliser est affectée par ce médicament.

### POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION :

Avant que vous ne commencez le traitement, votre médecin vous prescrira un régime pauvre en cholestérol, que vous devez poursuivre pendant toute la durée de votre traitement par LD-NOR, comprimé pelliculé. La posologie initiale habituelle de LD-NOR, comprimé pelliculé est de 10 mg en une prise par jour chez les adultes et enfants âgés de 10 ans ou plus. La posologie peut être augmentée si nécessaire par votre médecin jusqu'à la posologie dont vous avez besoin. La posologie sera adaptée par votre médecin à intervalle d'au moins 4 semaines. La dose maximale de LD-NOR est de 80 mg une fois par jour chez les adultes et est de 20 mg une fois par jour chez les enfants.

### MODE D'ADMINISTRATION :

Les comprimés de LD-NOR, comprimé pelliculé doivent être avalés entiers avec un verre d'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée, avec ou sans aliments. Essayez cependant de prendre votre comprimé tous les jours à la même heure.

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La durée du traitement par LD-NOR, comprimé pelliculé est déterminée par votre médecin.

Si vous pensez que l'effet de LD-NOR, comprimé pelliculé est trop fort ou trop faible parlez-en à votre médecin. Si vous avez pris plus de LD-NOR, comprimé pelliculé qu'il ne faut, contactez immédiatement votre médecin.

### SURDOSAGE

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de LD-NOR, que vous n'auriez dû (plus que votre dose quotidienne habituelle), contactez votre médecin ou l'hôpital le plus proche pour avis.

### Instructions en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez simplement la prochaine dose prévue à l'heure normale. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### Risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé :

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, ou souhaitez arrêter de prendre votre traitement demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### EFFETS SECONDAIRES :

Comme tous les médicaments, LD-NOR, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables graves suivants, arrêtez de prendre vos comprimés et contactez immédiatement votre médecin ou allez au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Rare : affecte 1 à 10 patients sur 10000 :

- Réaction allergique sévère entraînant un gonflement du visage, de la langue et de la gorge pouvant provoquer d'importantes difficultés à respirer.
- Pathologie sévère avec pelade et gonflement grave de la peau, cloques sur la peau, dans la bouche, sur la zone génitale et autour des yeux et une fièvre. Éruption cutanée de taches roses rouges, particulièrement sur la paume des mains ou la plante des pieds qui peuvent former des cloques.
- Faiblesse musculaire, endolorissement ou douleurs musculaires associées à une sensation de malaise ou de fièvre, pouvant être causées par une atteinte musculaire anormale qui peut engager le pronostic vital et entraîner des problèmes de reins.

Très rare : affecte moins de 1 patient sur 10000 :

• La présence inattendue ou inhabituelle de saignements ou d'hématomates peut être le signe d'anomalie du fonctionnement de votre foie. Dans ce cas consultez votre médecin dès que possible.

Autres effets indésirables éventuels LD-NOR, comprimé pelliculé

Effets indésirables fréquents (affectent 1 à 10 patients sur 100) :

• Inflammation des cavités nasales, maux de gorges, saignements de nez.

• Réaction allergiques.

• Augmentation du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique, continuez à surveiller attentivement votre glycémie) augmentation du taux de créatine phosphokinase dans le sang.

• Maux de tête

• Nausée, constipation, flatulence, indigestion.

• Douleurs articulaires, douleurs musculaires et maux de dos.

• Résultat d'analyse de sang montrant l'apparition d'une anomalie de la fonction du foie.

Effets indésirables peu fréquents (affectent 1 à 10 patients sur 1000) :

• Anorexie (d'appétit), prise de poids, diminution du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique,

vous devez continuer à surveiller attentivement votre glycémie).



Lot: 200524  
A consommer  
avant le: 09/2023  
PPC: 79,50 DH

# D3 NORM<sup>®</sup>

## 100 UI

### **INFORMATION:**

Con compte-gouttes de 30 ml.

### **COMPOSITION :**

Huile de soja, Antioxydant : Acétate de vitamine E liquide, Vitamine D3.

### **PROPRIETES ET UTILISATIONS :**

D3 NORM<sup>®</sup> 100 UI gouttes buvables renferme de la vitamine D3 (cholécalciférol), la forme la plus active de vitamine D.

D3 NORM<sup>®</sup> 100 UI gouttes buvables favorise l'absorption du calcium et du phosphore et contribue au maintien d'une ossature normale et au bon fonctionnement du système immunitaire.

### **UTILISATIONS :**

- Carence en vitamine D.
- Fragilité osseuse.



Lot: 200524

A consommer  
avant le: 09/2023

PPC: 79,50 DH

# D3 NORM<sup>®</sup>

## 100 UI



### **TION:**

Con compte-gouttes de 30 ml.

### **COMPOSITION :**

Huile de soja, Antioxydant : Acétate de vitamine E liquide, Vitamine D3.

### **PROPRIETES ET UTILISATIONS :**

D3 NORM<sup>®</sup> 100 UI gouttes buvables renferme de la vitamine D3 (cholécalciférol), la forme la plus active de vitamine D.

D3 NORM<sup>®</sup> 100 UI gouttes buvables favorise l'absorption du calcium et du phosphore et contribue au maintien d'une ossature normale et au bon fonctionnement du système immunitaire.

### **UTILISATIONS :**

- Carence en vitamine D.
- Fragilité osseuse.



Lot: 200524

A consommer  
avant le: 09/2023

PPC: 79,50 DH

# D3 NORM<sup>®</sup>

## 100 UI



### **TION:**

Con compte-gouttes de 30 ml.

### **COMPOSITION :**

Huile de soja, Antioxydant : Acétate de vitamine E liquide, Vitamine D3.

### **PROPRIETES ET UTILISATIONS :**

D3 NORM<sup>®</sup> 100 UI gouttes buvables renferme de la vitamine D3 (cholécalciférol), la forme la plus active de vitamine D.

D3 NORM<sup>®</sup> 100 UI gouttes buvables favorise l'absorption du calcium et du phosphore et contribue au maintien d'une ossature normale et au bon fonctionnement du système immunitaire.

### **UTILISATIONS :**

- Carence en vitamine D.
- Fragilité osseuse.

**BOUHACHOUCHE Saïd**  
 Médecine Générale  
 Lot Riad 1 N° 18 Bir Jdid  
 Tél: 0523 36 07 83  
 INPE : 111242632

# Bilan Biologique

le : ..... 10/11/2006 .....

Nom/Prénom : ABDERRACHID Naiter ..... Sexe : **H O F O**

## Hématologie

- NFS
- Plaquettes
- VS
- CRP
- Hémoculture

## Bilan martial

- Fer sérique
- CTF
- Ferritine
- Transferrine

## Hémostase

- Temps de Prothrombine
- TCK
- Fibrinogène
- INR

## Glucose

- Glycémie à jeun
- Hyperglycémie par VO
- Hémoglobine glyquée

## Ionogramme sanguin

- Na<sup>+</sup>
- K<sup>+</sup>
- Cl<sup>-</sup>
- Ca<sup>++</sup>
- Phosphore
- Mg<sup>++</sup>
- Bicarbonates (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>)
- Urée
- Crétinine
- Acide urique

Autres:

## Bilan lipidique

- Cholestérol total
- Cholestérol HDL
- Cholestérol LDL
- Triglycérides

## Fonction hépatique et enzymologie

- Amylasémie
- Bilirubine libre et conjuguée
- Phosphatases acides
- Phosphatases alcalines
- Lactate déshydrogénase LDH
- Transaminases ASAT, ALAT
- G - GT
- 5' Nucléotidase
- CPK (Créatine PhosphoKinase)
- Troponine
- Électrophorèse des protéines EPP
- BNP

## Ionogramme urinaire

- Ca<sup>++</sup>
- Phosphore
- Na<sup>+</sup>
- K<sup>+</sup>
- Cl<sup>-</sup>
- Urée
- Crétinine

## Examen des urines

- Protéinurie des 24h
- ECBU
- Antibiogramme

## Groupage sanguin

- ABO
- Rhésus
- RAI

## Sérologie et Immunologie

- VDRL - TPHA
- Hépatite B
  - Antigène Hbs
  - Anticorps Anti-Hbs
  - Anticorps Anti-Hbc
  - Anticorps Anti-Hbe
- Hépatite C
  - Anticorps Anti-HVC
- Sérologie Toxoplasmose
- Sérologie Rubéole
- β-hCG Plasmatique

- Facteur Rhumatoïde: (Latex, Waaler Rose)
- Anticorps anti-nucléaire
- Anticorps anti-DNA natif
- ASLO
- Dosage du Complément

**LABORATOIRE BIR J DID**  
 D'ANALYSES MEDICALES  
 Dr. Nesrine BELLAOUI  
 Médecin Biologiste  
 Dr. Mabrouka N° 17 Bir Jdid  
 Tel: 0523 36 03 04  
 Fax : 0523 36 03 04

**BOUHACHOUCHE Saïd**  
 Médecine Générale  
 Lot Riad 1 N° 18 Bir Jdid  
 Tél: 0523 36 07 83  
 INPE : 111242632

# LABORATOIRE BIR JDID D'ANALYSES MEDICALES

Dr. N. BELLAOUI

Lotissement Mabrouka N° 17, Bir Jdid - Téléphone/Fax : 05 23 36 03 04 - Email : labobirjdid@gmail.com

## Facture

Bir Jdid , le 12/11/2020

N° facture 2020-2603

Date 11/11/2020

Mme REDDADI Naima

Code Acte	Designation Acte	Cotation
NFS	HEMOGRAMME	80
VS	VITESSE DE SEDIMENTATION	30
GLY	GLYCEMIE A JEUN	30
HBGLY	HEMOGLOBINE GLYQUEE A1C	100
CRP	CRP : PROTEINE-C REACTIVE	100
CT	CHOLESTEROL TOTAL	30
TRIG	TRIGLYCERIDES	50
VITAD	VITAMINE D	450
S	PRVT SANG VEINEUX	1
Total B		870
Total		970,00


Arrêtée la présente facture à la somme de : Neuf cent soixante-dix dirhams\*\*\*

LABORATOIRE BIR JDID  
D'ANALYSES MEDICALES  
Dr. Naima BELLAOUI  
Médecin Biologiste  
Lot Mabrouka N° 17 Bir Jdid  
Tél / Fax : 05 23 36 03 04

INPE · 113062939

## Rapport de patient

Bio-Rad DATE: 12/11/2020  
D-10 TIMEFR: 15:03  
N°Série: #D181A63705 VersionLogiciel: A.30-2  
ID\_détechamillion: 1111120030  
Date\_d'immécion: 12/11/2020 15:03  
N°d'injection: 4  
Méthode: HBA1c  
Position du portoir: ---  
N°de portoir: ---



TPic	Tps.Réthauter Aire	% Aire
A1a	0.20	3376
A1b	0.28	4347
F	0.45	2959
I.A1c/CTB-1	0.69	2132
A1c	0.89	5218
P3	1.37	18346
AO	1.46	372950
Aire totale:		1349698
Concentration: %		5.8
Alc		



# مختبر بير جديـد للتحاليل الطـبـية

## LABORATOIRE BIR JDID D'ANALYSES MÉDICALES

Dr.Nesrine BELAOUI  
Médecin Biologiste

Mme REDDADI Naima

Dossier N° : 111120-030

Page : 2/2

### ANALYSES DE BIOCHIMIE (SANG)

		Valeurs Usuelles	Antériorité
GLYCEMIE A JEUN	: 0,95 g/l 5,27 mmol/l	( 0,7 - 1,1 ) ( 3,89 - 6,11 )	
HÉMOGLOBINE GLYQUEE (HBA1C)	: 5,80 %	( 4,5 - 6,3 )	
(Technique : HPLC/ D10 BIORAD )			
<p><i>Les valeurs usuelles sont de 4,5 à 6,3 % lorsque les glycémies sont normales.</i>  <i>Le diabète est :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bien équilibré lorsque le taux est inférieur à 6,5 %</li> <li>- moyennement lorsqu'il est entre 6,5 et 7,5 %</li> <li>- mal équilibré au-delà de 8 %</li> <li>- À l'évidence les exigences doivent tenir compte de l'âge, de l'ancienneté du diabète et des autres problèmes.</li> </ul> </p>			
CRP : PROTEINE-C REACTIVE Turbidimétrie	: 2,00 mg/l	( Inférieur à 6 )	
CHOLESTEROL TOTAL	: 2,93 g/l 7,56 mmol/l	( 1,5 - 2 ) ( 3,87 - 5,16 )	
TRIGLYCERIDES	: 2,02 g/l 2,30 mmol/l	( 0,4 - 1,5 ) ( 0,46 - 1,71 )	

### VITAMINES

		Valeurs Usuelles	Antériorité
VITAMINED-25-Hydroxy-vitD ( D2,D3 )	: 10,00 ng/ml	( 30 - 100 )	

#### Interprétation

Carence	< à 20 ng/ml
Insuffisant	20-29 ng/ml
Suffisant	30-100 ng/ml
Toxicité	> à 100 ng/ml

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons bon rétablissement.

*Dr. Nesrine BELAOUI  
Médecin biologiste  
Lot. Mabrouka N° 17 , Bir Jdid  
Tél / Fax : 05 23 36 03 04*



# مختبر بير جديـد للـتحاليل الطـبـية

## LABORATOIRE BIR JDID D'ANALYSES MÉDICALES

Hématologie - Biochimie - Immunologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie

**Dr.Nesrine BELLAOUI**

Médecin Biologiste

الدكتورة نسرين بلاوي

طبيبة اختصاصية في التحاليل الطبية

Bir Jdid , le 12/11/2020

Nom : Mme REDDADI Naima

Dossier N° : 111120-030 Pvt du: 11/11/2020 10:52

Prescripteur Dr : BOUHACHOUCHE Said



### Compte rendu d'analyses

Page : 1 / 2

#### ANALYSES D'HEMATOLOGIE

##### HEMOGRAMME

		Valeurs Usuelles	Antériorité
GLOBULES ROUGES	: 5,11 $10^6/\text{mm}^3$	( 3,8 - 5,5 )	
HEMOGLOBINE	: 15,10 g/dl	( 12 - 16 )	
HEMATOCRITE	: 45 %	( 37 - 47 )	
VGM	: 88 fL	( 80 - 95 )	
TCMH	: 30 pg	( 27 - 32 )	
CCMH	: 34 g/dl	( 32 - 36 )	
GLOBULES BLANCS	: 5390 / $\text{mm}^3$	( 4000 - 10000 )	

##### FORMULE LEUCOCYTAIRE

NEUTROPHILES	: 49 %	2641/ $\text{mm}^3$	( 2000 - 7500 )
EOSINOPHILES	: 2 %	108/ $\text{mm}^3$	( 100 - 400 )
BASOPHILES	: 1 %	54/ $\text{mm}^3$	( Inférieur à 100 )
LYMPHOCYTES	: 41 %	2210/ $\text{mm}^3$	( 1500 - 4000 )
MONOCYTES	: 7 %	377/ $\text{mm}^3$	( 200 - 800 )
CELLULES IMMATURES	: 0 %	0/ $\text{mm}^3$	
PLAQUETTES	: 344 000 / $\text{mm}^3$		( 150000 - 400000 )

##### VITESSE DE SEDIMENTATION

PREMIERE HEURE	: 11 mm	( Inférieur à 20 )
DEUXIEME HEURE	: 40 mm	( Inférieur à 40 )

Valeur de référence sont fonction de l'âge et du sexe  
H: Age/2 F: (Age+10)/2